

un latin hunt ubana

полный и всеобщій домашній лачевникъ,

Сэчиненный как для предохраненія здравія надежньйшими средствами, так и для пользованія бользней всякаго рода, сь показаніемь причинь, признаковь, а наипаче разпознавательных ь,
гньзда, оборотовь, усилія и исхода оных ь; лькарствь как в повсюду предь глазами нашими
находящихся, так и продаваемых в в Алтеках ь; наименованія оных в как в Россійскими,
так и Латинскими словами; доброты, времени,
употребленія, количества пріема, образа пріема, и других в нужных в обстоятельствь, в в
пользу всякаго человька, в каком в бы он в ни
быль состояніи, чинь, родь жизни, и в каких в
бы ни находился бользнях в.

Твореніе Г. Бухана, славн вішаго в в нын вішнем в в в в к в Англинскаго Врача.

TOMBII,

Въ концъ коего приложена mаблица, показывающая Аптенарской въсъ противъ Россійскаго въсу.

MOCKBA.

Вь Университешской Типографіи у В. Окорокова.

1791.

Mid.

12.

ОДОБРЕНІЕ.

По приказанію Императорскаго Московскаго Университета господь Кураторовь я читаль сію книгу, подь заглавіємь: Полный и Всеобщій Домашній Льчебникь, Томь ІІ, и не нашель вы ней ничего противнаго наставленію, данному мнь о разсматриваніи печатаємыхь вы Университетской Типографіи книгь; почему оная и напечатана быть можеть. — Коллежскій Совытникь, Краснорычія Профессорь, Ценсорь печатаємыхь вы Университетской Типографіи книгь и Кавалерь,

АНТОНЪ БАРСОВЪ.

Ualetudo sustentatur notitià sui corporis; & observatione quæ res aut prodesse soleant, aut obesse; & continentia in victu omni arque cultu corporis tuendi caussa; & prætermittendis voluptatibus, & cet. Cicer. de Offic.

Optimum vero medicamentum est opportune cibus datus

Omnes homines artem Medicam nosse oportet: & ex his maxime cos, qui eruditionis ac eloquentiæ cognitionem habent. Nam sapientiæ cognitionem Medicinæ sororem & contubernalem esse puto. Sapientia enim animam ab affectibus liberat: augescit autem intelligentia prasente sanitate, cujus prouidentiam habere honestum est eos, qui recte seniunt. At ubi corporis habitus ægrotat, neque mens ipsa alacritatem habet ad virtutis meditationem. Morbus enim præsens animam vehementer obscurat, intelligentiam ad adsectionem per consensum ducens.

Hippocrates lit. de Nat. bom.





предувъдомление

Оть Г. Дюпланиля, Медицины Доктора, на свою Картину Признаковь и проч. предшествующую сей Второй Части.

Мы представляемь вы началы сей Второй Части Картину Признаковы, знаменующихы и составляющихы общія внутреннія бользни, т. е. ты, кои не имыя опредыленнаго себы гнызда, и не представляя видимымы образомы произведшихы оныя причины, причиняють неизвыстность вы наименованіи оныхы.

Сверькъ сего помъщаемъ изложение признакоев предшествующих в или предобьявляющих в друтія шяжкія бользни, кои хошя и имьющь опредвленное или изввстное гнвздо, какв на пр. вв мозгу, груди, желудкъ, печени, кожъ и проч; но еще пребующь болье или менье дней для обнаруженія себя: потому что опытомь дознано, да и изъ чтенія сего Творенія удобно можно увъришься, что тяжкія болбзии имбють, ежели можно такъ изъясниться, предуготовительные дни, въ шечение коихъ Природа, кажешся, открываеть жарактеристические, знаменовательные и свойственные признаки, имбющие въ послъдствии составить пакимъ или инымъ образомъ болъзнь, и продолжающиеся болбе или менбе времени, изъ коихъ, хотя они сперва кажутся легкими и смутными, можно однако же до нЪкотораго степени узнать и заключить, какого рода имбеть последовать болбзиь.

A

А какъ успъхъ въ пользованіи какъ встхъ бользней вообще, такъ наипаче опасныхъ, большею частію отть началь зависить; притомь же остановка оныхъ на первомъ шагу или пресъченіе перваго оныхъ устремленія можеть иногда отвратить оныя: то всякъ можеть чувствовать, сколько - то нужно собрать въ небольшое число страницъ существенные или неотлучные признаки, показующіе предварительно такую или иную бользнь, или наименующіе оную такимъ или другимъ именемъ, когда она начинаетъ приходить въ силу.

ВЪ самомъ дълъ, при помощи сей Картины весьма не шрудно различить бользнь, которую желашельно вывЪдашь. ВозьмемЪ на прим. одинъ изъ газличныхъ видовъ лихорадохъ, болъзней многочисленнъйшихъ, а по сей причинъ болъе всего смушныхъ и перепушанныхъ; предположимъ, что какой нибудь больной не можеть лихорадкого, такъ называющеюся отступного или отходчивого. ЧеловЪкЪ, пріемлющій участіе вЪ болЪзни сей, котораго мы предполагаемъ уже прочешшимъ сіе Тво-реніе и столько уразумъвшимъ онаго смыслъ, что не можеть обмануться въ признакахъ, различающих в лихорадки отв всякой другой бол взни; сей человъкъ, говоримъ мы, смотритъ въ сію Картину, проходить каждой члень, останавливается на томъ, въ заглавіи коего между прочимъ усматриваеть слово: лихорадка, прочитываеть его, сносить или сравниваеть туть описуемые признаки съ обнаруживающимися на больномъ признаками. Ежели онь не находить сходства, то приступаеть къ другому члену, въ началъ коего также поставлено слово лихорадка; а от сего еще къ третьему, доколь узнаеть, что большая часть πρипризнаковъ какъ на больномъ, такъ и тутъ въ описаніи между собою сходна.

Здъсь говоришся большая часть, потому что никогда не можно найти на одномъ больномъ всъхъ въ цълости признаковъ, описуемыхъ въ каждомъ членъ бользни. Два человъка, хотя бы больны были и тою же бользнію, однако же не представляють въ точности того же числа признаковъ; но они всегда представляють тъ признаки, кои называются существенными или характеристическими той бользни; и какъ сти послълние вообще суть наипоразительнъйште, а притомъ малочисленные, и потому не збивчивые: то, кто хотя мало въ оные вникнетъ, не можеть обмануться.

И такъ по вышеупомянутому предположенію надобно пріємлющему участіє въ той бользни человъку прочитать девять членовъ, написанныхъ на девяти или десяти страницахъ, на чтеніе чего потребно нъсколько только минуть; а напротивъ ежели бы сей Картины не было, то бы надлежало перебирать девять главъ, составляющихъ близь двухъ соть страницъ.

Ежели больной страждеть скорбутомь или цынготного бользніго, то слідунть только прочесть от двадцати пяти до тридцати страниць, а безь помощи сей Картины надлежало бы пройти двадцать осмь главь, составляющих цвлую книгу сь половиною. То же должно сказать о всіхь другихь бользняхь.

Впрочемъ мы не будемъ болъе настоять о пользъ сей Картины; она довольно одобрена тъмъ принятемъ, каковаго удостоена отъ Публики. Мы скажемъ только то, что мы умножили ее многи-

MH

ми членами, наипаче же касающимися до тБх вользней, кои прибавлены нами кв описуемым в завсь во второй Части отв сочинителя, и что распространили каждой таковой члень столько, сколько нужно было для вразумленія читателя о настоящих в признаках вользней и о сужденіи по онымь.

ЗдБсь можно догадаться, что не для чего намъ было въ сей Каршинъ приводишь описание симптоматических бол Взней (т. е. т Бх в, кои не сами по себъ сушь бользни, а шолько слъдсшвія других в болваней), потому что тв болвани, коихъ они сушь слъдсшвіями, здёсь описаны; ни бользней помъстныхъ, какъ-то въ глазахъ, ушахь, носу, рту, горяв, шитькахъ и проч. пошому что сколь ни многочисленны сін бол взни, но занимаемое ими мЪсто не дозволяетъ обманушься. На примъръ нъшь никого, которой бы, видя глаза красные, воспаленные или им вюще пяшна, бъльмо и проч. тотчасъ не узналь, что надобно искапть о каждой изъ сихъ болбзней въ главахь, толкующихь о бользияхь очей и орудія зрънія. То же надобно сказать о жабъ или воспаленіи горла, о кожных вользняхв, какв то о корость, лишаяхь и проч. потому что их в можно узнать съ одного взгляда; да и при исканіи въ оглавленіи каждаго Тома, ихв имя само собою встрвшишся.


Мы не будемъ также описывать въ сей Картинъ признаковъ простуды, различныхъ видовъ кашлей, коликъ, мыта, поноса, рвоты, остановки мочи, различныхъ видовъ кровотеченія, желтухи, водяной бользни, паралича, рака и проч. потому что эти бользни не збивчивы, да и имя ихъ извъстно. что касается до венерической бользни, до бышенства (причиненнаго угрызеніемь взбъсившагося
звъря), то по извъстности произведшихъ сіи бользни причинь не можно въ оныхъ обмануться:
и такь излишно бы было входить въ подробность
о признакахъ оныхъ. Особенныя бользни женщинъ
и младенцевь были бы гораздо збивчивыми, ежели бы
г. Бухань не помъстиль оныхъ въ двухъ главахъ
надписуемыхъ: женскія бользни, младенческія бользни; оть чего весьма легко ихъ найти можно,
такъ какъ и хирургическія или до хирурга касающіяся бользни обыкновенныйнія, помъщенныя въ
трехъ главахъ, надписуемыхъ о хирургіи или бользняхъ хирургическихъ, и о слъдствіяхъ хирургическихъ бользней.

При предспіавленіи сея Каршины наше наміреніе конечно не то, чтобь дать убъжище холодности и лъности; напротивъ того мы объявляемъ, что для довольнаго уразумънія сего Теоренія и для полученія изб онаго существенной пользы надобно его чишать, да и чишать съ непрерывно равно - постоянным вниманием в. Но какъ развъ занимавшемуся уже чрезъ многіе годы человъку исторією бользней можно съ перваго приступа уловлять знаки и свойство оных в; а напротивь от неупражнявшагося нарочно во Врачебной Наукъ человъка, сколько бы ни предполагашь его памяшливымъ, шолько при всъхъ многокрашныхъ прочипываніях в не можно надвяться, чтобы онь всегда въ умъ имъль сходства и различія, представляемыя большею частію бользней: то мы подумали, что сія Картина читателямь нашимь. будеть тъмь, чъмь нъкогда была Аріаднина нишь Тезею; что она поможеть имъ вытти изъ лабиринша, представляемаго не токмо проспымь людимь,

дямъ, но и нарочно учившимся Наукъ дебрями болъзней, удручающихъ человъческій родь; и что сверхъ облегченія ихъ памяти, она будеть нъкоею приманкою, имъющею ихъ къ себъ привлещи, пригвоздить особеннъйшимъ образомъ ихъ вниманіе на предметы величайшей важности: потому что цъль сего Творенія не одно токмо есть любопытство, но храненіе какъ себя самаго, такъ и себъ подобныхъ.

ВЪ сей Картинъ Признаковъ мы будемъ слъдовать порядку главъ.

Двъ первыя главы, не толкующіл о собственно называемых вользнях в, а содержащій сбщіл правила о всьх в бользнях в и мих радках в, должны служить введеніемь вы наждую послыдующую главу. И так в мы увыщеваем в читать оны совокупно съ главою, толкующею о той бользни, которую он хочеть узнать и пользовать.



KAPTUHA

Признакова, извявляющих и составляющих общёх внутреннія и другія тяжкіх бользыи.

Лы предполагаемЪ, что какая нибудь особа, напоен-IVI ная такимъ же духомъ, въ каковомъ сочинено сје Твореніе, т. е. ищущая учинить больному благо, не отваживаясь сдълать ему зло; или желающая примътить подозришельное поведение тьх в повсюду почти встрвчающихся знахарей, которые не иначе упоминають о Врачебной Наукъ, какъ съ похулентемъ ея: мы предполагаемЪ, говорю я, что сія особа вопервыхЪ желаеть узнать имя бользни, коею больной страждеть, дабы почерпнувь вы главь, толкующей о той боавзни, нужныя наставленія, достигла до своей цьли; мы предполагаемь еще, что она вы солпоянии знать большую часть знаковЪ, а наипаче знаковЪ фистономін, дыханія, живоша и пульса: знаніе не иначе получаемое, какЪ посредствомЪ многократнаго чтенія сего Творенія, а наипаче Второй Части.

Jones II.

Б

Пред

Предположивъ все сіе, упомянутая особа прижодить къ больному; она пристально примъчаеть положеніе больнаго на его кровати, его цвъть лица, его глаза, его языкъ, его дыханіе; она щупаеть у него животь и пульсь; вопрошаеть его тихо и надолгь; отбираеть оть него и держить на умъ все важное къ заключенію: по томъ обращается она къ свидътелямь перваго нашествія бользни, или оказавшихся на оной явленій, ежели она существуеть уже съ нъсколькихъ дней, и ихъ вторично вопрошаеть, да и сход о съ тъмь образомъ, каковой мы присовътовали въ примъчаніи і и 2 главы і сего ІІ Тома.

Перемежающілся лихорадки. (Febres intermittentes.)

И такъ ежели сїя особа увъдомится, что бользнь началась болью въ головь, надъ пахами и въ полсницв, слабоство или утомленноство во всъхъ членахъ (что просто называютъ тогда: весь не свой), чувствием в ознобы или холода в в конетностих в, потяготами и позевотами, сопровождаемыми тоского, тогинотою, и иногда рестою; ежели она сверьхъ того извъстится, что къ симъ припадкамо присовокупилась озноба (кожу подираеть), по томъ сильная дрожъ (михорадка трясетв); что вскорв послв того кожа, бывшая прежде холодною и сухою, стала мокра; что потв, которой въсихъ случаяхъ обильно выступаетъ, да еще мога, которая тогда бываеть красновата, кирпитноцевтная, оставляющая на днв полсвяй распущеннаго въ водъ кирпича, окончили приступа бользни; что такой приступо или приходо или припадок в имълъ возвраты болье или менъе частые: то упомянутая особа по сымъ знакамъ узнаетъ, что бользнь есть перемежающаяся лихорадка. И такъ ей надобно справиться съ 3 главою сего II Тома, котюрая ей покажеть пищеупотребление и лекарства, при-

Еже дневная лихора дка.

(Febris quotidiana.)

Ежели сти призкаки, припадки, приступы ежедневно бывають, т. е. каждой день возвращаются, то должно ей заключить, что это есть лихорадка перемежающаяся ежедневная, или просто ежедневная лихорадка.

Гридневная лихорадка.

(Febris tertiana.)

Ежели они возвращаются только чрезъ день или въ третій день, такъ что находится одинъ день совершенно отъ оныхъ свободной, то должно знать, что это тридневная лихорадка.

Сетверодневная лихорадка.

(Febris quartana.)

Ежели же возвращаются чрезъ три дни или въ четвертой день, такъ что цълые два дни проходятъ безъ лихорадки, то надобно ей знать, что это тетверодневная лихорадка; и потому надобно ей искать въ той же 3 главъ образъ пользованія, потребной на сіи три вида перемежающихся лихорадоков.

Лихорадка безпрестанная острая, или лихорадка воспалительная (просто огневица.)

(Febris continua - acuta, ceu febris inflammatoria.)

Ежели больной чувствуеть сперва подиранте по кож и повсемьстную ознобу, за коею вскор в по том в слыдуеть великой жар в съ пульсом полным и очень састым, съ болью головы, сухостю и палентем в 2

кожи, красностію глазь; ежели цвыть лица раветь; ежели есть боль вь спинь и полсииць сь трудностію дышанія, сь тоскою, сь тошнотою; ежели жалуется на великую жажду; ежели отвергаеть лства твердыя; ежели не спить; ежели языкь изь влажнаго мало помалу дылается сухимь, жесткимь, чернымь и проч; ежели еще есть бредв, непомырное ворочаніе, тяжесть вь груди, дышаніе трудное, припрышки вб тендинахв, икота, холодь вь конесностяхв, потв вязкой или клейкой, невольное истеченіе моги и проч: то должно знать, что эта бользнь называется лихорадка беспрерывная острал или воспалительная, пользованіе которой надобно искать вь 4 главьсего ІІ Тома.

Настоящее колотье в боках в.

(Flevritis vera.)

Ежели бользнь обнаружилась ознобою и дрожью; за коими посльдовали жарь, жажда и безсонница; ежели по томъ приключилась боль (ръзъ) сильная и колюсая въ какомъ нибудь боку, и, какъ иногда случается, вдоль спинной кости, или ближе къ серединкъ груди, или къ плечамъ; ежели эта боль остръйтею бываетъ во время вдыханія; ежели пульсо скоро и жестокъ; ежели моса очень цвътна; ежели кровь на тарелкъ покрывается нъкоторою корою; ежели катель, сперва сухой, дълается мало помалу мокрымъ; ежели харкотина отчасу густветъ и становится кровяною: то надобно знать, что это настолисе колотье во бокахо, а о пользованіи онаго надлежитъ читать въ главъ 5 § г сего ІІ Тома.

Ненастоящее или ложное колотье в бокахв.

(Plevritis Spuria.)

Ежели боль въ боку, упомянутая въ предыдущемъ членъ, болъе оказывается наружи и чувствуется наиначе вЪ грудных мышцах , или, хучше сказать, вЪ междуреберных мускулах ; ежели кашель сухЪ; ежели пульс скор , и больной сЪ трудносийю можетъ лечи на больной бокъ (припадок , чаще случающися въ ложном колотъ , нежели въ настоящем): то надобно читать 2 ∫ сей же самой главы, толкующи о ложном колотъ .

Настоящее воспаление грудобрющной перегородки.

(Paraphenesis seu inflammatio diaphragmatis.)

Ежели у больнаго есть горяска очень острая, жгучая, сопровождаемая болью противъ грудобрюшной перегородки (diaphragma): ежели эта боль умножается или нестерпимъе бываетъ при кашляніи, при чиханіи, при вдыханіи въ себя, при приниманіи или проглатываніи лстеб, при испражненіи низомъ, при испусканіи моги и проч; ежели дыханіе или духъ коротокъ, ежели больной дышетъ брюхомъ, т. е, сжавши у себя животъ; ежели у него есть икота, бредъ, такъ называемый Сардскій смъхб, которой не иное что есть, какъ невольное кривлянье и проч: то это есть воспаленіе грудобрющной перегородки, о пользованіи коего надобно искать въ § 3 той же 5 главы.

Настоящее воспаление въ лескихъ.

(Peripnevmonia vera.)

Ежели у больнаго находятся вев припадки пастоящаго во бокахо колотья, окогив выше упомянущо, изключая только то, что пульсо мясте, что боль не столь остра; но за то дышаніе трудные и тяжесть или давленіе во груди большее: то надобно знать, что эта бользнь есть воспаленіе во легкихо, пользованіе коего описываєтся вы главы 6 § 1 сего II Тома.

He-

Уменастоящее или ложное воспаление об легкихв.

(Peripnevmonia spuria.)

Ежели бользнь начинается перемьнами колода и жара; ежели пульсо мало и скоро; ежели больной чувствуеть тяжесть на груди; ежели дыханге трудно; ежели онъ жалуется на головныя боли и купно на головокружентя; ежели мога у него очень была и проч: то эта бользованти коего надобно отнестися къ 2 5 той же 6 главы.

Caxomka. (Phtisis.)

Ежели болёзнь даеть о себъ знать, какь-то обыкновенно случается сухимъ кашлемо, часто продолжающимся чрезъ многіе мысяцы, и послы кушанья влекущимъ за собою шошноту или позывъ на рвоту; ежели больной чувствуеть болье жара, нежели сколько бы надлежало въ естественномъ состояни; ежеаи имъетъ боль и тягость въ груди, а особливо по савланіи какого либо движенія; ежели харкотина на языкв солона и часто смвшана съ кровію; ежели больной пасмурень, сталь меланхолико и весьма похудвлЪ; ежели позывъ у него на вду очень слабъ; ежели пульев вообще таств, мягокв и малв, и иногда довольно полий, а иногда и жестоки; ежели вскорь по томЪ харкотина принимаетъ цвътъ зеленоватой, бълесовой или кровяной; ежели вЪ больномЪ держится внутренняя или иссушительная лихорадка и льеть пото безселзной, почередно следующій одинь за другимЪ, т. е. одинЪ около вечера, а другой около утра; ежели у него есть поносб и обильное тегение урины; ежели онъ чувствуеть жгучги жаръ на ладонъ рукъ; ежели щеки у него посав принятія пищи покрываются цвытомь багровымь; ежели пальцы утончаются, ногти сгибаются, волосы вылезають; ежели наконець на ноги и бедра придеть опухоль, силы совсыть пропадуть, а глаза будуть уходить подьлобь и проч: то по всыть симь признакамо познается тахотка, коем пользование описано вы главь 7 § 1 сего Тома.

Янглинская сахотка, истощание или измождение.

(Confumptio.)

Ежели больной чась отчасу худветь всемь твломь, однако безь нарочитаю степени лихорадки, безь кашлю, безь трудности вы дышаніи; а только что не имбеть позыва на бду, страдаеть частыми непищевареніями, частыми слабостьми и проч: то эта бользны называется истощаніемь, изможденіемь, а болье всего Янглинского тахоткого. О семь надобно читать § 3 той же 7 главы.

Пихорадка внутренняя или нервная.

(Febris lenta ceu nervosa ceu bectica.)

Ежели у больнато были признаками (предвъстниками) упыніе, потеря аппетита, слабость, утомленность посль и мальйшаго движенія, безсопница, глубокіє вздохи, лишеніе бодрости духа и проч; ежели за
сими припадками сльдують пульев малой и тастой, сухость на языкь, но такь, что больной не чувствуеть
нарочитой жажды; ежели онъ испытываеть въ тьль
то небольшой холодь или ознобу, то небольшой
жарь, обнаруживающійся румянцемь на лиць; ежели
по томь жалуется на головок руженія, на боли въ головь, на тошноту и позывы на рвоту; ежели пульев
скорв, и иногда перемежающійся; ежели мога бъла и
похожа на выдожшееся пиво; ежели больной съ трудностію дышеть, ежели у него есть бредв и легкія
отсут-

отсупствія духа; ежели грудь сжата и проч; ежели около девятаго, десятаго, или двенадцатаго дня языкъ увлажняется и таркотина становится обильная; ежели легкія выпоражниванія обнаруживаются или низомЪ, или легкою мокротою на кожѣ; или ежели случится какое нибудь загніеніе вЪ томЪ или другомЪ ухв, или какія широкія прыщи на губахЪ, на носу и проч; ежели напрошивъ у больнаго около сейже поры бользни будеть непомърной поносб; ежели пото безсвязной или прозивной, послъдуемый частыми припадками сильнаго обморока или обмертевлости; ежели языкЪ дрожитЪ; ежели конетности становятся холодными: ежели пулься дрожащь, перебирайщійся, или при ощупъ походитъ на ползущаго червя; ежели у больнаго есть припрышки об тендинахв; ежели зръние и слухъ почти совсъмъ погасли; ежели не хотя извергаеть каль и проч: то надобно заключить, что этоть больной страждеть внутреннего лихорадкого или нервного, пользование которой надобно искать вЪ главъ g cero II Toma.

Пихорадка гнилая, злая, сб пятнами.

(Febris putrida, maligna, purpurata, petechialis.)

Ежели больной испышываеть еще за многіе дни предь бользнію примьшную слабость и внезапныя утомленности безь всякой видимой причины; ежели онь уныль; ежели вздыхаеть; ежели теряеть бодрость; ежели поражается страхомь смерти; ежели спустя ньсколько дней по томь настаеть у него тошнота; ежели иногда блюеть онь желсью; ежели онь чувствуеть сильную боль вь головь, сопровождаемую толканіями или прыганіями висосных артерій; ежели глаза у него становятся красными, распаленными; ежели онь вь нихь чувствуеть боль даже вь глубинь самыхь ямокь; ежели слышить звонь или журчаніе вь ушахь;

ушахЪ; ежели дыхание у него шрудно, и часто прерывается вздохами; ежели онъ жалуется на боли, указывая на желудоко, въ спинъ и полсницъ; ежели языкЪ, сперва бёлой, дёлается по томЪ чернымЪ, испроръзаннымъ или надсъдшимся и проч; ежели зубы покрывающся иломъ чернымъ; ежели больной иногда извергаеть червей ртомь и нижнимо проходомо; ежели береть его озноба; ежели онь дрожить; ежели точить слину; ежели кровь, вышедшая изъ жилы, кажется распустившеюся, или неимьющею связи и тошчась загнивающею; ежели нижній пометв, всегда бывающій крайнъ зловоннымь, иногда выходить зеленоватой, ипогда черноватой, иногда красноватой; ежели кожа покрывается пятнами пурпуровыми, синими, темнокрасными, черными; ежели у больнаго льеть кровь изъ глазъ, изъ носа, изъ рта и проч; ежели пульев малв, скорв и жестокв, иногда мяконекъ и томень, часто перемежливой; ежели кожа суха, безвлажна, жгуча, иногда же студена и клейка; ежели около четвертаго или пятаго дня оказывается легкой поносв, сопровождаемый тихою теплотою и потомв умъреннымЪ, щастливыми признаками сей бользни; но ежели напрошивъ въ эту пору будетъ неумъренной попосо съ животомъ жесткимъ и надупымъ, съ пятнами широкими, черными, синими на кожв, прыщиками во рту, потомб холодным в и клейким в, терного водого ей глазахи, перемъною голоса, помутою зрънія, трудностію глотанія, дрожаніем взыка и невозможностію высунуть его из рта; ежели больной непрестанно усиливается открыть себъ грудь; ежели наконець пото и слина бывають кровавы, а мога черна и проч: то не надобно сомнъваться, что эта боавзнь есшь лихорадка гиилая, злая, или св пятнами, въ разсуждении которой надобно справиться съ 9 главою сего II Тома.

Jone II.

Tu-

Пихорадка съ сыпью или оысыпнал. (Febris miliaris, lenticularis.)

Ежели бользнь начинается сперва небольшею ознобою или подирантемЪ на кожъ, за коимЪ слъдуетъ жарЪ, слабость и вздохи; ежели пульед малд, частЪ, сопровождаемый трудностію вЪ дышаніи, тосками, давленіем в или тяжестію в в груди, небольшим в кашлемб, ворочаниемъ то на ту, то на другую сторону, бредомь; ежели языкъ бълъ; ежели руки дрожатъ, хотя иногда бывають очень горячи; ежели у родильницы кромъ всъхъ сихъ припадково молоко сбивается сЪ пуши, и другія испражненія останавливаются; ежели больной чувствуеть на кожь зуль и боли, полобныя уколоніямь булавокь; ежели около прешьяго или четвертаго дня выступить безчисленное множество маленьких в прыщиковв, красных в или бълых в, за чем в посабдуеть уменьшение преждеупомянутых в припадкоев, пот3, издающій запах в особенной гнилости, и возврать остановленных испражнений; ежели около шестаго или седьмаго дня сін прыщики начинають подсыхать и упадать (что послъдуеть съ непріямнъйшимъ на кожъ свербежемъ); ежели иногда они то появляющся, що пропадающь, или и совстмъ не выходять (что великую предвъщаеть опасность); ежели сверьх всьх всих признаков у родильниць сін прыщики наливающся сперва свёшлою водою, которая тотчась превращается выжелтую, и ежели они перемѣшаны бываюшь иногда другими красненькими прыщиками, и проч: то по этому узнается существенная высыпная лихорадка, пользованія коей надобно искать въ главъ 10 сего II Тома.

Яшхорадка отступная или отходсивая.

(Febris remittens.)

Ежели больной сперва начинаеть зевать, потя-

и то холодь, то жарь; ежели ощущаеть боль противъ желудка, сопровождаемую иногда раздушјемъ, или пучентемъ онаго; ежели языкъ у него бълъ; ежели кожа и глаза показывающся желшыми; ежели его рвешь желтыю; ежели пулься, ръдко случающийся полныма, иногда бываеть нъсколько жесткима; ежели быль непомврной запорв, или нарочитой поносв; ежели всь сін припадки и множество другихЪ, коихЪ не можно описать: потому что они бывають иногда таковыми, каковые оказываются в лихорадкв желтной, иногда въ ликорадки нервной, а иногда въ ликорадки гнилой, и иногда они другь за другояв следують въ томъ же человъкъ; ежели, говорю я, всъ сіи припадки имъють примътные отступы или отходы, т. е. такія поры, такія времена, в вкои они бывают в несравненно безсильныйшими, хотя и не исчезають совсымь; и ежели возврать ихъ силы, ихъ жестокости приходить по часамЪ, или днямЪ пергодитескимв, почти также какЪ приступы или припадки въ лихорадках в перемежающихся: то сія бользнь называется лихорадкою отступного, коея приличное пользование описано вЪ и главь сего II Тома.

Ocna. (Uariolæ.)

Ежели дишя или взрослой из веселаго сдълается печальным в и пасмурным в, или наоборот в из впечальнаго веселым в; ежели его всю ко сну клонит в, хочется пить, а нът в аппетита к в летвам втердым в; ежели жалуется он в на слабость или утомленность; ежели он в пответ в, естьли хоть мало станет в двитаться; ежели это нездоровье (что просто называют в не по себ в продолжается два или три дня, а в в трет или четвертой день послъдовать будут в перемьны то ознобы, то жара, сперва легкія,

но тотчась по томь усиливающіяся, и вскорь сопровождаемыя болью въ поясниць и въ головь, рестою, или по крайней мъръ тошнотого или позывантемъ на реоту; ежели пульсё скоре, кожа горить; ежели больной не спить; ежели, когда онв заснеть, чувствуеть подрагивание, или по кожв подпрание, сопровождаемое внезапнымъ трепетомъ или дрожаніемъ (обыкновенной признака скоро последующей высыпи оспы); и ежели больной, будучи младенецъ или динпя малых в льшв, страждеть кортами и проч: то надобно знать, что на больномъ скоро будеть оспа, коея прыщи или жемчужины обыкновенно начинають выступать или высыпать въ четвертой день. Мы поставили сте описаніе для познанія предварительных в осны знаковь; потому что когда оспа выступила, высыпала, то всякЪ ее знаешЪ. ОбразЪ пользовантя на стю бользнь описанъ въ главъ 12 сего II Тома.

Kops.

(Morbilli, quibusdam roffaliæ.)

Ежели больной чувствуеть перемьны ознобы и жара, сопровождаемыя тягостію и потерею аппетита; ежели языкь у него быль, но обыкновенно влажень; ежели есть у него небольшой кашель сухой и короткой, которой однако же иногда оказывается уже посль высыни; ежели голова тяжела; ежели глаза распалены, слезоточливы и до такой крайности чувствительны, что безь боли на свыть или огонь и взглянуть не могуть; ежели у больнаго льють слезы крайнь вдкія и водяность изь ноздрей; ежели чувствуеть боль вы груди; ежели, какь то иногда случается, онь блюеть, или низомы слабь; ежели, будучи дитятею или младенцемь, сорится онь пометомо зеленоватымь; ежели жалуется на зудь кожи; ежели онь безполоснь, печалень; еже-

ли у него изъ носа кровь идеть; ежели около четь вершаго дня оказывающся маленькія пятнышки, подобныя бываемымь оть укушенія блохь, сперва на лбу, на лиць, а по томь на груди, наконець на конетностяхо; ежели сін пятнышки (корз) остаются поверьхностными и оканчиваются упаденіемь вы видь чешуекь, т. е. не такь, какь вь оспь, вы которой пятны дылаются жемчужинами загнивающимися и проч: то эта бользнь, такь какь почти всь знають, есть корз, коей пользованіе описано вы 13 главь сего ІІ Тома.

Пихорадка багровах кб добру (а). (Febris scarlatina benigna.)

Ежели бользнь начинается перемьнами ознобы и жара безь чувствія нарочитой тягости; ежели кожа покрывается красными, какь бы оть насьченія кропивы, пятнами, широчайшими, густоцвьтньйтими и не столь единообразными, какь вы кори; ежели эти пятны пробывають два и три дни, а по томь пропадають; ежели посль того, какь они пропали, верькняя оболочка кожи отстаеть лепестинками или четуями: то сія бользнь называется лихорадка багросал кь добру.

Яихоралка багровая кв злу.

(Febris scarlatina maligna.)

Но ежели за ознобою, холодомЪ, слабосшію, шагошою по всему шълу и великимЪ давленіемЪ вЪ гру-В 3

⁽а) Сія лихорадна еще названа на Россійском в язын в пропивною; потому что ея пятны походять на пятны, происходящія от устренанія
иропивы. Поселяче наши когда увидять такія пропывных пятны:
то говорять, какь кумачь прасной. — Не можно ли и намъ назвать ее кумачною, такь накь по латынь называется scarlatina, а по
французски scarlatine, esarlatine.

ди последовали непомерной жарь, тошнота, реота и проч; ежели пульсё тасте, но мале и густе; ежели дыхание скоротечно, трудно; ежели кожа горить оть жара, котя и не совсёть суха; ежели языкь быль и влажень; ежели наконець высыть больнаго ни мало не облегчаеть: то она называется багровою злою. Пользование сихь двухь видовь багровой лихорадки описано вь 14 главь сего же II Тома.

Яихорадка желгная.

(Febris biliofa.)

Ежели къ признакамо лихорадки безпрерывной острой, нли къ признакамо лихорадоко перемежающихся, или даже лихорадки отетупной, присоединится обильное выпоражнивание желти верькомъ и низомъ: то эта бользнь называется лихорадкою желтною, въ разсуждении которой надобно справиться съ главою 15 сего II Тома.

P 0 K a.

(Erysipelas.)

Ежели первыми припадками бользни были озноба, жажда, слабость, боль въ головъ и шев, жаръ,
безсонница, пульсъ таетой, иногда реота и часто
бредъ; ежели около втораго, третьяго или четвертаго дня какая нибудь часть тъла раздуется, зардвется, покроется маленькими прыщиками (отъчего вообще проходить огневица); ежели сїя высь пь или выступъ,
бывающій цвътомь сълоскомъ красной, отъ прижатія пальцемь бъльеть, т. е. ежели отъ пригнътенія пальцемь въ
какомь нибудь воспаленномь мъсть знакъ пальца туть
остается изображеннымь въ бълесовомь видь чрезъ нъсколько минуть, посль коихь опять то мъсто становится краснымь, какъ и прежде (существенной знакъ

сей бользни): то надобно заключить, что больной не можеть рожего, пользование коей надобно искать въ главъ 16 сего II Тома.

Сумазбродство или воспаление мозга.

(Phrenesis ceu inflammatio cerebri.)

Ежели бользны начинается сперва болью въ головъ, краснотою въ глазахъ и на лицъ, сномъпрерывающимся или совство потеряннымЪ, великою сухостію на кожв, запоромв, задержаніемь моги, небольшимъ течентемъ крови изъ носа, пищантемъ въ ушахъ и крайнею раздражательностію въ нервной системь; ежели ко всъмъ симъ припадкамв присоединятся припадки лихорадки воспалительной или безпрерывнойострой очень тяжкой (зорятки или огневицы); ежели сверхъ того пулься иногда бываеть слабя, непорядотенб, дрожащій, а иногда жестокб и сжатть; ежели слухь очень нъжень, такь что больной слышить съ особенною тонкостію (существенный признака въ сей бользии, но не долго продолжающійся); ежели біеніе и на шев и на висках весьма ощутительно бывает в (другой признака равно особенной въ сей бользни); ежели языкЪ черенЪ и сухЪ, безЪ жажды и сЪ нехотвніемь питья; ежели духьбольнаго занять только предметами, поразившими его на канунъ его бользни; ежели, погружень булучи въ глубочайшее молчанте, вдругь онъ встаеть, дълается бъщенымь; ежели бредо непрерывной, такъ что онъ то кидается съпостели, то кричить, то ноеть, то плачеть, а вопросы, так в как в и отвыты его суть безалаберные; ежели глаза его вершятся какЪ бурколы; ежели руки у него дрожать; ежели мога нейдеть, или и идеть, да только свышлая и проч: то сія бользнь называется сумазбродством в или воспалением в мозга, пользование коей описано въ главъ 17 сего II Тома.

Воспаление желу дка. (Inflammatio stomachi.)

Ежели у больнаго всю болишь и жжеть вы томы мысть, глы желу доко; ежели у него безсоинила и тоска; ежели пульсо мало, касто и жестоко; ежели оны болюеть, или терпить тошноту и дурноту; ежели жажда у него неутолимая; ежели оны дышеть тяжело; ежели потыеть потоло проливныло, и иногла корчится и падаеть вы слабость; ежели желу доко раздулся и на ощють жестокы кажется; ежели больному крайны больно становится, когда выпьеть или проглошить, а особливо что нибуль или очень теплое, или очень студеное (характеристическій признако сей бользии) и проч: то надобно знать, что больной страждеть воспаленіемо желу дка, коего пользованіе описано вы главь 21 § 1 сего ІІ Тома.

Воспаление по дбрюших, бользых или асеская, мизерере.

(Inflammatio ventriculi inferioris, passio ceu morbus iliacus, miserere.)

Ежели къ припадкама, почти такимъ же, какте въ веръхнемъ членъ нами исчислены, присоединитея боль одномъстнъйшая и остръйшая прямо противъ пупка; ежели животъ перехваченъ какъ бы веревкою; ежели запора упорной, пульса тастой, малой, густой, потерянной, жажда крайняя и жаръ ужасной; ежели когда больной переворотитея хорошо, то и боль становится на другомъ мъстъ; ежели реота бываетъ по промежуткамъ; ежели промывантя назадъ ползутъ; ежели напротивъ, когда эта бользнь не къ добру, больной блюетъ н промывантями и пометома; ежели онъ совсъть ослабъ; ежели пульса мала и дрожащий; ежели дыханте отъ него не пртятно и вонючее; ежели лото у него проливной, помета черной и зловонной

и проч: то эта бользнь называется воспаление по дбрюшія, бользнь иліатеская, мизерере. О семь надобно смотрыть вь § 2 той же 21 главы.

Воспаление посекв, боль об поясниць.

(Inflammatio renum, nephritis, morbus ceu colica nephritica.)

Ежели больной чувствуеть весьма острую боль прошивъ потеко и въ спинъ (въ поясницъ), сопровождяемую лихорадкого, онвивниемь или глухимь болечувствованиемъ въ ляшкъ больнаго бока, и укодомъ ядер въ пахи; ежели боль есть въ томъ мъсть, которое просто называется поясницею; ежели мога, сперва бывающая свытлою или водянистою, становится но том в красною, и в в сильный шем в степени бользни баваною, или кровавою, выходящею съ трудностію, съ жаромъ, и весьма въ маломъ количествъ за разъ, а иногда и совсъмъ удерживаемою; ежели ему очень больно становится, когда он в хочеть пойти и стать прямкомЪ; ежели ему легче лечи на больной бокЪ, нежели на здоровой; ежели у него есть позывы на блевоту; ежели онъ и въ самой вещи блюеть во время припадка, продолжающагося то несколько часовь, то день или два, и кончащагося истечением в моги и выходом в камчя и проч: то сія бользнь называется воспа еніем в потекв или болью ев поясниць, коен пользование описано въ (4 тойже главы 21.

Воспаление мосеваго пузыря.

(Inflammatio vesica urinaria)

Ежели больной чувствуеть крайнь остоую боль вы нижней части живота; ежели испытываеть при мочени трудность, сопровождаемую нъсколько лихоГоль II. Г. рад-

радкою, непрерывными позывами кЪ стулу и уринальнику; ежели при ощюпи около паховЪ попадается что- то похожее на круглую болону, находящуюся вЪ тазъ, болетворную по мъръ, сколь сильно кто щупаетЪ; ежели вскоръ по томЪ случится трудномотенте, мотеудержанте, лихорадка непрерывнам, а послъ безеонница, жажда и бредъ; ежели конетмости становятся холодными; ежели у больнаго всте продолжается запоръ и проч: то стя бользнь называется воспаленте мотеваго пузыря, пользованте коего описано въ § 5 той же главы 21.

Холера-бользив, рветб и низомб и верьхомб.

(Cholera-morbus.)

Ежели больной чувствуеть жгучій жарь въ желудкв и кишкахв, отрыжки кислыя, ввтры, боль вЪ животь; ежели за сими припадками последують непомърная блегопіа или реота и крайняя слабость низомъ, купно съ желсью зеленою, желтою и черноватою, притомъ съ раздирантемъжелудка и резомб въ животь; ежели отв сихв продолжительных выпоражни. ваній больной худієть чась отчасу, такь что чрезъ три или четыре часа не можно его и узнать; ежели пулься очень скога, неровень; ежели есть жажда жгучая; ежели он в чувствует в крайн в острую боль около пупка; ежели послъ того пульеб упадаеть, такъ что иногда дълается непримътнымЪ; ежели конетности становятся холодиыми; ежели льеть по всему тьлу холодной поть; ежели мога останавливается; ежели у больнаго бъется сераце, мучать сильная икота, слабость, корги и проч: то сія бользнь называется хомера-бользив или рогий низомо и верьхомо. О семь смощри гляву 22 6 г сего II Тома.

Сцака или непомврное тегение моги.

(Diabetes.)

Ежели больной болье мочится, болье сцыть, нежели сколько употребиль жидкостей, не чувствуя оты того сперва много тягости; ежели мога у него идеть свытла, былеса, сладима, или вкуса болье или менье пріятнаго; ежели его томить жажда жгучая и безпрерывная, сопровождаемая лихорадкою чась отчасу его сныдающею; ежели во рту у него сухо; ежели безпрестанно оны харкаеть харкотиною пынистою; ежели сила, аппетить, дородность пропадаеть, такь что на больномь остаются только кожа да кости; ежели оны чувствуеть жарь вы кишкахы и вы крестив; ежели мошна и ноги напухли и проч: то сія бользнь называется сцака или непольтрное тегеніе моги. Смотри главу 23 § 1 сего ІІ Тома.

Неудержание моги, тто просто называють: не держится мога.

(Incontinentia urinae.)

Ежели моча течеть такь, что человькь и не слышинь или не чувствуеть, да и капля по капль; однако же не слишкомь много, да и безь большой боли и проч: то сей бользни дано имя неудержание моти, о пользовании коего смотри въ § 2 той же главы 23.

Хрящь, песока.

(Saburra, materies calculofa)

Ежели больной чувствуеть боль вы крестив, вы полсниць и тошноту; ежели оны блюеть; ежели мочится кровью, такы какы иногда вы самой вещи случается и проч: то сій припадки означають пессокы или маленькія зернышки камней, находящіяся вы

могкахд. Но ежели сти припадки усихиваются; ежехи боль подходить ближе къ дътородному уду; ежели нога и ляшка больной стороны онъмъли; ежели ядры ушли въ пахи; ежели мога нейдеть и проч: то это эначить, что песокд вышель изъ потекд, и остановился въ тъхъ канальцахв, кои ведуть могу изъ потекд въ пузырь. (Эти канальцы называются моге-пропускателями, итететея.)

Kamenz. (Calculus.)

Ежели больной чувствуеть боль какв при испущанти моги, шакъ и прежде и послъ; ежели мога идешь только по капелькъ; ежели иногда вдругь она осостанавливается; хотя за минуту перед в тъмв шла очень шибко; ежели больной чувствуеть нестерпимую больвъ корив двтороднаго уда после какого нибудь телодвиженія, а наипаче верьховой взды, или въ каретъ по дорогь неровной; ежели въ мочи остается на днъ подсёда былой, густой, многой, зловонной, сопляной и проч; ежели больной чувствуеть какое-то щекотаніе въ двтородныхъ частяхъ, побуждающее егонепрестанно опускать кЪ онымЪ руку; ежели у него есть позывъ ишти къ спеулу въ ту минуту, какъ онъ помочится; ежели ему легче мочиться лежа, нежели стоя; ежели испущая послъднія капли моти, чувствуеть онь острую боль, сопровождаемую кортмымб движениемъ и проч: то, кажется, онъ страждеть кампенб или каменного бользніго. Смотри главу 24 сего II Тома какъ въ разсуждении сей, такъ м вредыдущей бользни.

Kposacoŭ nonoco.
(Dysenteria)

Ежели бользнь начинается поносомо, сопровожмаемымъ жестокими больми въ киткахо и непрестанними позывами къ стулу; ежели больной порощитель большим в или меньшим в количеством в кроси при испражнени низомъ; ежели у него подираетъ по кожъ, сила пропала, пульей мало, жажда жгучая и тошнота; ежели языкъ у него становится бълымъ, соплянымъ и испроръзаннымъ; ежели у него во рту находятся прыщики; ежели, такъ какъ иногда случается, у него страшная блевота, и иногда кожа покрыта красными пятнами; ежели случается икота, корти и другіе припадки лихорадоко гнилыхо злыхо и проч; ежели помето сперва бываеть связень и пънисть, а по томъ съ дорожками крови, и напоследокъ похожъ на сущую кровь, переплешенную маленькими волошьми, представляющими отдирки мяса; ежели у него выходять, глисты низомъ или верьхомъ; ежели при испражнении низомъ чувствуетъ онъ ніяжесть около последней калоизвергательной кишки (просто называемой гузенною), аки бы всв кишки хош вли вышти вонъ и проч: то налобно заключить, что у него кровавой поносв, ж справиться съ главою 25, § 7, членомъ I Тома III.

Желгетегеніе.

(Fluxus bepaticus.)

Ежели у больнаго съ нъкотораго времени пропаль аппетить на ъду; ежели у него во рту дурно;
ежели онъ пускаеть евтры, и ежели мога наполнена
желтью; ежели въ правомъ боку прямо противъ петеми (В)
бываеть болье или менъе больно, и иногда чувствуетея какъ бы раздиранте въ оной; ежели кожа пожелтъла какъ лимонъ, а иногда и гуще; ежели больной катляетъ; ежели дышетъ тяжело; ежели низомъ идетъ
ньсколько кроеи, и, какъ иногда случается, изъ носу
или съ харкотиною, или другими путями; ежели всъ
ети припадки обнаруживаются наипаче послъ желтухи,
соспалентя или другихъ бользней петени: то они
Т 3

⁽в) Пядени поколо полторы отъ шен-

означають бользнь, называемую желгетениемв, коея нользование описано вы тойже 25 главь, § 7, члень II.

Мезентеритеской флюсб (тегенге изб брыжейника) и терная бользиь.

(Fluxus mesentericus et ater morbus.)

Ежели къ припадкамо проваваго поноса и желгетегеніл, описаннымъ въ предшествующихъ членахъ,
присоединятся провопролитивищія выпоражниванія; ежели эта провь при обильномъ теченіи бываеть еще
чистою, весьма красною или румяною безъ зловонія:
то эта бользнь называется мезентеритескимо флюсомо; а ежели иногда провь будеть черна, испортившаяся, зловонная и проч: то сія бользнь называется.
терною. Смотри тоть же § 7, главы 25 члена ІІІ.

Селезеногница.

(Lienteria.)

Ежели кЪ нѣкоторой части припадково кроваваго помоса присоединятся крайнее отвращение отъ пищи, или нѣкая ненаѣда, утомленность, слабость, мога, болѣе или менѣе нечистая, въ маломъ количествъ; ежели помето не кровавъ, а только что состоитъ изъ почти несварившейся пищи и проч: то сін болѣзнь слыветь селезеноснищею.

Сырь, или целіптеской флюсв.

(Passio ceu fluxus cæliacus.)

И ежели большая часть сих в самых в припадков кроваваго поноса соединится св отвращением в отв пищи, отрыжками кислыми, жаждою, больми, отв больнаго приписуемыми тресламо, и часто лихорадкого; ежели мога мутна и необильна; ежели помето, не так в как в бывает в в кровавом поносв и селезенотни-

ив, есть бълесой, съроватой, хильной, означающий то, что яства выдержали только первую выдълку и проч: то сія бользнь называется сырыю или целі-атескимо флюсомо, о коемь надобно читать, такь какь и о селезенотниць, вь главь 25, § 8.

Trucmbl.

(Uermes.)

Ежели у больнаго лице то бледно, то съ красными пятнами; ежели онъ чувствуеть зудь въ ноздряхъ (признако однако же не всегда справедливой, в наипаче у младенцевъ, которые во всякихъ бользняхъ труть у себя нось или парапають); ежели больной, кстда лежить, скрежещеть зубами; ежели верхняя губа у него распухаеть; ежели иногда ему ничего не хочется всть, а иногда приходить какая-то ненавда; ежели у него полосб, дыханте кислое, вонючее, живошь крыкой, надушой, жажда жгучая; ежели мога пънистая и иногда цвъта бълесаго; ежели у него въ животь резд, боли колитескія, слинотегенія избрта невольныя, а наипаче во время сна, частыя боли въ боку съ кашлемо сухимъ, пульсо неровной, трепетанія сердца, обмороки, потв холодной, паралить, эпилептитеские (падучей бользни) приступы; ежели онъ чувствуетъ нъкое щекотаніе, или раздираніе въ горав, или ему кажешся, булто что-то ползетъ изъ желудка къгорлу и проч: то у него глисты. Смотри Томъ III главу 30, толкующую о различных вилахъ глиств.

Подагря порядотная.

(Podagra regularis.)

Ежели больной терпить непищеваренія; ежели уныль; ежели пускаеть вітры; ежели болень онь головою, слабостью и реэтою; ежели жалуется на утом-

утомленность, на обезсиление, ежели чувствуеть быль въ греслахв, или ему кажется, булто бъгуть вётры, или холодная вода вдоль ляшки и проч: то всъ сіи трипадки предвыщають, что приступв подагры вскоръ откроется; и ежели не подана будетъ помощь за день или за два прежде открынійя упомянутаго приступа или припадка, то аппетин Б умножится весьма чуветвительным в образом в, больной будет в чувствовать легкую боль при испущании моги, и всь припадки, описанные нами вЪ началь сего члена, усиляшся; наконецъ ежели больной около втораго или третьяго часа утра вдругъ пораженъ будетъ болью въ какой нибудь своей конетности; ежели эта боль сопровождаема будеть ознобого и нъкоторымь степенемь лихора дки; ежели часъ отчасу будетъ чувствовать большую боль въбольномъ месть; ежели ему покажется, булто его жгушЪ, будто растерзываютЪ; ежели больная часть сделается крайне чувствительною; ежели сти боли, продолжавшись сушки, будушь уменьшащься часъ етчасу, ослабъвать; ежели больной членъ раздуется, сдълается красным и покроется влажностью: то всь сін припадки означають приступо подагры, которой, будучи повторяемЪ, составляетЪ то, что просто называють страданиемь во подагры. Смотри гла-By 33 § 1 Tona III.

Подагра непорядочная или павшая на голову.

(Podagra, ceu materies morbifica podagræ, irregularis, ad caput appulsa.)

Ежели больной подагрого человькъ, или вышерпьвшій упомянущое страданіе ед подагрь, внезапу
почувствуєть престаніе боли въ больномъ мьсть,
но въ то же время почувствуєть сильную и стращную головную боль, сопровождаемую склонностію ко

1.

ену, головок руженісмі, кортами, бредомі и проч; или ежели придеть къ нему крайняя боль вь ушахі и зубахі; ежели проявится глазная боль, дрожаніе, пострілі, паралить и проч: то эти припадки означають, что подагра или болетворная матерія подагры привалила къ головъ.

Подагра, павшая на грудъ.
(Podagra, ad pectus appulsa.)

Ежели въ семъ же самомъ случав приключится у больнаго тяжесть въ груди непомврная, а притомъ кашель и трудность въ дышаніи, жаба, завалы воспалительные, одышка, тоска, сильной обмороко или обмертвълость: то сій припадки означають, что подагра пала на грудь.

Подагра, павшая на желудок д. (Fodagra, ad stomachum appulsa.)

А ежели больной чувствовать будеть тошноту или дурноту на животь; ежели онь блюеть, ежели тоскуеть, ежели чувствуеть боль противь желудка, ежели падаеть вы величайшую слабость и проч: то эти припадки показывають, что подагра пала на желудоко.

Подагра, павшая на подбрющие или поски.

(Podagra, ad ventriculum inferiorem, aut ad renes appulsa.)

Наконецъ, ежели больной будетъ чувствовать изгагу, жаръ и боль остръйшую въ желудкъ, колику, сумазбродетво, тошноту и проч; ежели онъ блюетъ; ежели его мучитъ поносъ; ежели въ мосъ остается, такъ какъ иногда случается, подсъдъ тъстяной; ежели будетъ ощущать раздражательность въ поскахъ и боль подобную происходящей отъ песку; ежели издавна больные подагрою будутъ чувствовать сжатте надъ пахами, въ бедрахъ и обычайную боль во утробъ и проч:

Jond II. Mo

то сін припадки означають, что подагра перетлавь кишки, вь подбрющіе, или вь поски. Смотри о сихъчетырехь членахь § 2 той же 33 главы.

Помота воспалительная или острая.

(Rheumatisimus inflammatorius ceu acutus.)

Ежели больной начинаеть сперва чувствовать усталость, ознобу, безсоницу, жажду, кратко, большую часть другихь припадково лихорадоко; ежели онь жалуется по томь на боли то туть, то тамь чувствуещия имь, усиливающіяся при мальйшемь движеніи, и становящіяся безмьрно острыми; ежели сій боли останавливаются вь оболочкахь, вь подвижныхь гленосоставахо; ежели сопровождающая сій припадки лихорадка есть отступная, имьющая свой удвоенія, означаемыя вь лихорадкь ежедневной: то по симь знакамь познается лолюта воспалительная или острая, пользованіе коей описано вь главь 34 Тома ІІІ.

Скорбутв или цынготная бользив.

(Scorbutus.)

Ежели бользнь начинается непомърною слабостію, даже по встаніи съ постели, тажестію въ груди, трудностію въ дышаніи, а особливо послъ движенія; ежели у больнаго десны распухли, цвъту віолетовато, точать кровь при мальйтемь треніи, дыханіе вонючее, частыя кровотесенія изъ носа, нъкоторой родь трещанія, слышимаго время оть времени въ составахо сленово, трудность къ ходьбъ; ежели иногда ноги распухають, а иногда худьють, т. е. дълаются с ухощавыми; ежели оказываются пятна синія, желтыя, віолетовыя, черныя на ногахь, а иногда и на рукахь и проч: то сій припадки возвъщають скорбутитескую или цынготную порту, которая причинить великія боли, ежели заблаговременно не положена булеть

деть преграда ел приращенію; потому что ежели у больнаго загніють десны и зубы, будеть течи кровь изь разныхь частей тьла, выступять упорные вереды или чирьи, боль чувствуема будеть по всему тьлу, а наипаче вь груди, откроются высыпи сухія, чешунтыя и проч: то должно знать, что больной имьеть укоренившуюся цыку или скорбуть, часто оканчивающійся снъдающею внутреннею или тахотного лихорадкого, кровавымь поносомь, мытомь, водяною больвыйго, или антоновымь огнемь вь какихь нибудь кишекахь. Смотри главу 35 § 1 Тома III.

Скорбутитеской флюсв. (Fluxio scorbutica.)

Ежели у больнаго рошь болить почти такъже, как Б от в меркуріальной саливаціи; ежели слиныя жельза болье или менье распухли и болетворны; ежели десны и зубы покрыты какою - то бълесою сукровицею; ежели дыханіе зловонно, десны распухли, больны и удобно точать кровь; ежели иногда разсъдаются; ежели, когда это тетение бываеть сильно, то садятся за губами, на щекахЪ, т. е. на внутренности щекЪ, по краямЪ языка прыщи вередные, производяще боль въ этихъ частяхъ такимъже образомъ, какъ бываеть оть меркуріальной саливаціи; ежели эта саливація или слинотегеніе савлается очень обильным в съ нарочитою болью; ежели ко всыв симь припадкамб присоединятся лихорадка и безсоиница, сразмърная обилію слинотегенія: то по симъ знакамъ узнается скорбутитеской или цынготной флюсв, коего пользование описано вЪ § 2 той же 35 главы.

Жаба, свинуха.

(Strumæ.)

Ежели у больнаго начинается бользны тымы, жто жельза поды подбородкомы и за ушми (ежели же-Д 2 льза

льза за ушми распухли, то въ простомъ народъ сія бользнь слыветь еще свиного заушницего) стали засорены или забалены; ежели эти желвза окрыпли; ежели они увеличивающся числомъ и шолщиною, шакъ что наконецъ составляють жесткой желвакь, иногда остающійся на мість нарочито долгое время до открышія; а когда откроется или прочинется, то изЪ него идетъ сукровица бълесая или влажность водянистая; ежели такте же желваки примъчаются подъ мышками (ежели подъ мышками, то простой народъ называеть ихь свиными титьками), въ пахахо, подъ ногами, руками, грудью и проч; ежели брюхо жесшко; ежели чувствуются такія же окрыплости от вавала или засоренія брыжейника, петени, селезенки и проч; ежели носъ и верьхняя губа распухли, а особливо у младенцовь, наппаче подверженных сей бользни и проч: то надобно заключить, что у него жаба или свинуха, о пользованій коей смотри главу 36 Тома III.

0 ды шка. (Asthma.)

Ежели больной дышешь съ трудностію или тажело и скоро, а притомъ при дышаніи обыкновенно издаеть какой то звукь, похожій на свисть (дышаніе сіе иногда толь бываеть трудно, что больной принуждень стоять прямо; а въ противномъ елучав боится, чтобъ не задохнуться); ежели эта трудность въ дышаніи случается обыкновенно посль того, какъ больной стояль противь холоднаго восточнаго вытра, или на воздухь густомъ или засоренномъ, или обмочившись, или пробывъ долгое время на мъсть сыромъ: то этоть больной есть одышлисой; а ежели онъ охрипъ, кашляеть; ежели пускаеть евтры верьхомъ, сопровождаемые тяжестію въ вруди, величайшею трудностію въ дышаніи и проч: то сіи припадки, усиливающіеся къвечеру, возвъщають близкой приходь подступа, которой обнаруживается спустя нъсколько часовъ посль объда, или около втораго часа ночи жаромь, горяского, болью въ головь, тошнотою, позывомь на рвоту, великою тяжестію еб груди, трепетаніемь сердца, пульсомь слабымь, иногда перемежающимся, текущими сами оть себя слезами, желсного рвотого, и кончится въ конць нъсколькихь часовъ теченіемь моси цвытной съ подсьдомь. Смотри 39 главу Тома III.

Япоплексія, пострылд.

(Apoplexia.)

Ежели кто въ совершенныхъ и пожилыхъ лътахъ имъетъ потемнънія въ глазахъ, боль въ головъ постоянную и упорную, оглушенія, онъмънія въ членахь, головокруженія, быстротечное уменьшеніе памяти, минутныя одурвнія, некакія затменія духа, кровотетения изъ носа и проч: тоть долженъ бояться апоплексии или пострела, коего подходъ темъ ближе становится; ежели головокружение всю продолжается; ежели память совстмъ пропадаетъ; ежели чувствуеть заспание, журчание или звонь вь ушахь, тень, непроизвольное течение слезь, дышание пометное, дрожанте губъ и проч; наконецъ ежели у больнаго нъпъ ни чувствованія, ни движенія, такъ что можно бы было его почесть мертвымв, ежели бы сердце и легкія не преставали действовать; ежели онъ сапить; ежели проглошить не можеть: то его удариль пострвав или апоплексія.

Япоплексія кровяная, пострѣлб отб удара крови.

(Apoplexia sanguinea.)

Ежели во время удара у больнаго цветь кожи померкь; ежели лице надулось и распухло; жилы и Д 3 артеартеріи, а особливо шейныя и височныя раздулись и остановились; пульсо силено и жестоко; глаза вертятся и останавливаются; ежели дыханіе тяжело и производится съ храпомъ; ежели мога и помето выходять по неволь; ежели больной иногда блюеть и проч: то его ударила апоплексіл крослиая.

Япоплексія пасотная или мокротная.

(Apoplexia serosa ceu pituitosa.)

Но ежели пульсё будеть малё, не равень и перемежающійся; ежели цвыть кожи на больномь не багрянь, а напротивь бльдень и синь; ежели дыханіє у него, такь какь иногда случается, трудные производится, нежели вь кровяной апоплексій; ежели зываніе бываеть сильные: то больнаго ударила апоплексія пасосная. О сихь трехь членахь смотри главу 40 Тома III.

H. 3 2 A 2 a.

(Cardialgia.)

Ежели больной чувствуеть жгучій жарь и неетерпимую боль около верьхняго отверзтія желудка, сопровождаемыя иногда тоского, тошнотого и реотого и проч: то у него бользнь называемая изгагого.

Сильная или жеугая изгага.

(sod a.)

Но ежели эта боль делается такою, что будто что-то щиплеть, жжеть: то она называется сильного или жеутею изгаеого, которая иногда сопровождзется ужасною реотого, трепетангемо сердца; трудностію въ дышаніи, подираніемь по кожь, потолю холоднымь, ознобою колетностей, останоского моги, кортами, паралитемо и проч. О сихъ двухъ бользняхь смотри главу 44 Тома III.

Вапоры или нереных бользни.

(L'apores ceu morbi nervorum.)

Ежели больной чувствуеть растянуте или разлуте въ желудкв и кишкахв, причиненное вътрами; ежели позывъ на влу и пищеварение обыкновенно бывають худы, хотя иногда и приходить ненасытимый аппетить и пищеваренія весьма скорыя; ежели яства въ желу дкв прокисають; ежели больной блюеть водою прозрачною, мокротами густыми или черноватою жидкостію, подобною подонкамо кофея; ежели онъ часто страдаетъ жестокими болями около пулка, соединенными съ оттрами и бурчаниемъ въ кишкахб; ежели животъ у него слабъ, а чаще того заперть, что причиняеть еттры, нездоровья и проч; ежели мога иногда идетъ въ маломъ количествъ, а иногда очень обильная и весьма свътлая; ежели чувствуеть нъкую тяжесть въ груди, трудность въ дышаніи, трепетаніе сердца, иногда внезапныя вспыхиванія жара во многих в частях в твла, а иногда ознобу, подобную производимой вылитою на эти части водою; ежели онв имветь боли въ спинв и живошь, похожія на происходящія ошь песка; ежели пульс весьма непорядотень, такъ что иногда противъ обыкновеннаго очень медлителенв, а иногда очень скорб; ежели у больнаго есть зъвота, икота, частые вздохи; ежели онъ чувствуеть себя удушаемымь пажестію или какь бы ядромь восходащимъ снизу кверьку и давящимъ грудъ; ежели онъ то плачеть, то смвется; ежели сонъ прерывается нападентемв твии; ежели по мъръ, какъ боавзнь усиливается, больной чувствуеть головныя боли, судороги, неотступныя боли въ различныхъ частях в тьла; ежели глаза темньють; ежели они часто бывають больны; ежели в ушах в звынять звонь;

ежели елуго ослабъваеть; ежели наконець всв душевныя работы разстроились; ежели умъ помешался; ежели больной страшным в образом в кидается; ежели онъ неспокоенъ; ежели устрашается отъ мажыйшаго случая; ежели печалень, вспыльчивь, недовърчивъ и проч; ежели увеселяется странными умоначершаніями ежели мечшанія его весьма несовивсшны; ежели память, такъ какъ и разсудокъ, пропала; ежели онъ всегда боишся смерши; ежели пасмуренъ, неспокоенЪ, нетеривливЪ, бъгаетЪ безпрестанно отъ одного Лъкаря къ другому и проч: то сіи припадки и многіе другіе, почти безчисленные (потому что ихЪ всьхъ не льзя описать) показывають, что больной спраждеть печальною и мучительною бользнію, называемою вапорами или нервного бользніго или вапорного бользніго. Смотри главу 45 Тома III.

Меланхолія, сумазбродство, манія.

(Melancholia , mania.)

Ежели кто страшливъ, невеселъ, бранчивъ, епесивь, нетерпъливь и въ малкишемъ предметь, иногда скупъ, а иногда расточителенъ; ежели подверженъ пустому страху, потемнъніямь зрънія, заглушеніямь; ежели льеть слезы безь всякой причины; ежели сонъ его неспокоенъ и соединенъ съ страшными грезами; ежели онъ жалуется на боль, на тяжесть головы, на звонъ въ ушахъ; ежели онъ имъетъ дрожаніе, корти, усыпленія, дрожаніе сердца, сожатія груди, тоску и намыя болечувствованія вы верыхнемь отверзти желу дка; ежели у него животь обыкновенно запертЪ; ежели лога прозрачная, да и вЪмаломЪ количествъ идетъ; ежели желу доко и килики надушы выпрами, обнаруживающимися посредством в отрыжекЪ и вътропусканія; ежели харкаетъ харкотиною густою; ежели у него цвъть бледной, пульсо малой

и слабой; ежели душевныя работы такъ разстроились, что часто онъ почитаеть себя умершимь, или превращившимся въ какое нибудь другое животное; ежели онъ воображаеть иногда, что тело его превращено въ стекло или другое какое тело ломкое, такъ что не смъеть ни мало поворотиться, опасаясь, чтобъ не разбить его и проч: то онъ подвержень нервной бользии, называемой мелаихолйею. Смотри \$ 2 той же 45 главы.

Эпилепсия, падусая бользиь.

(Epilepsia, morbus, malum caducum.)

Ежели у больнаго крайняя слабость, головныя боли, тяжести, потемнъние очей, соединенное съ звономъ въ ушахъ, слабосийю въ зръни, трепетаниемъ сердца, трудностію въ дышаніи, вітрами въ кишках в проч; ежели мога течеть обильная, но свытлая; ежели онъ блъденъ; ежели конетности его холомны; ежели онъ часто испытываеть чувствія, подобныя тымь, которыя бы произошли оть холоднаго воздуха, идущаго от ногъ къ головъ, или нъкое щекотанте; ежели онъ печаленъ; ежели улобно разсерживается; ежели глаза его слезоточливы, распухли, такъ какъ и подъ бровями; ежели грезы у него страшныя, или весьма безпокойной сонЪ, боль вЪгруди, или разетройки въ желудкъ и проч: то всъ сти принадки суть предвъстниками падутей бользни; и ежели они имьють нькоторой степень напряженности, то изъявляють, что приступо оной тотчась откроется. Сей приступ вобнаруживается следующими припадками: глазавертятся, больной падаеть, кривляется, ломается, точить слину пъною, руки и ноги у него скорючиваются, пальцы сгибаются и прижимаются кЪ ладонямЪ, свмя, мога и помето выходять часто сами собою, безь усилій къ сему больнаго; больной лишается совершенно Jone II. E

намяти и разсулка и проч. а послъ приступа мало помалу приходить въ себя, опамятывается, жалуется на нъкое имъ чувствуемое онъмъніе, на слабосиліе, на головныя боли; а что съ нимъ случилось во время припадка, часто ничего не помнитъ. Смотри § 4 главы 45.

Бъснованіе. (Dæmoniasis.)

Ежели кортные припадки, коими больной страждеть, соединены будутьсь сильными движеніями, коверьканіемь, перебрасываніемь изъ одного мъста на другое, скорыми скочками и смъшными: то надобно заключить, что больной страждеть быспованиемь. О семь смотри 5, той же 45 главы.

Hana zenie minu. (Incubus, ephialtes.)

Ежели больному во время сна кажешся, что какая-то нарочитая тяжесть его давить, или чувствуеть непомърную тяжесть на груди и желудкь, оть коей не можеть онь освободиться; ежели во снъ мычить; ежели иногда кричить громко, хотя и вотще усиливается промольить; ежели ему грезится, будто иногда вступиль вы бой, и оть страха смерти бъжить, но чъмь нибудь остановляется, спотыкается, падаеть; а иногда представляется ему, будто находится вы згараемомы оть пожара домь, или упадающемы вы ръку, и оть страха, чтобы не сгорыть, или не утонуть вы ръкъ, тотчасы пробужается и проч: то стя не реная больные слыветь вы простомы народы нападентемы или давлентемы тъми. Смотри у 8 той же 45 главы.

Momepuna, Mamna. (Affectio ceu passo hysterica.)

Ежели больная (потому что эта бользнь свойственма только женщинамь) падаеть въ частые припадки слабо-

слабости или сильного обморока, различествующаго от в обыкновеннаго сильнаго обморока півмв, что оной обморок в не соединенъ ни съ блъдностію лица, ни съ холоднымъ потолю, а притомъ и долъе продолжается: потому что были примъры, что оной оставался на многіе дни; ежели въ семъ состояніи она терлеть чувства или безпамятна, а дыхание толь слабо, что едва только примътно, такъ что паръ отъ него къ стеклу не прилинаетъ, да и пламя зажженной свъчи ощъ онаго не колебленися, ежели она приставлена будеть къ носу; ежели холодь на тълъ столь сильной, что заставляеть почитать больную мершвою; ежели въ другихъ обстоятельствахъ она впадаеть какь бы вынькое быснование, или чувствуеть жестокія корти, мало различествующія оть эпилептитеских в; ежели сти припадки предначинаемы бывають иногла холодомь вы конетностяхв, потяготами, позевощами, обезсилениемо, тягостію, тоского и проч. а иногла чувствованиемЪ, подобнымЪ причиняемому кантаюцимся въ подбрюши какъ бы ядромъ, восходящимъ къ желудку, въ коемъ причиняетъ раздутте, шошношу, а иногда и *реоту* и проч. а по шомъ къ горлу, въ коемъ мъстъ производить нъкое удушенте, за коимъ послъдуетъ дышание скорое, трепетание сердца, головокружение, притупление зрания, потеря слуха и кортныя движентя в в конетностях в в в других в частях в твла, а наипаче в в мышицах дыханія и подбрюшія, кои иногда ужасным в образом в приподнимающся и проч: то она страждеть нервною бользийо, которая называется истерикого, бользийо матогною. Смотри § 12 той же главы 45.

Ипохондрія.

(Affectio, passio hypochondrica.)

Ежели больной испышываешь почши шакте же припадки, кон означающь истерику, но не споль вы Е 2 силь-

сильномъ степени, и не столь упорные; ежели чувствуеть во время припадка нъкую удавку въ фаринксв и елоткв, препашетвующую проглатыванию, корти, дрожание и онъмъние всъхъ членовъ, препетание мышица, икоту, зевоту, потяготу и проч.; ежели не вЪ бышность сихЪ припадково, кромъ въпровЪ чувствуеть еще жестокую боль въ желудкъ, изгагу, нарочитую опухоль в випохондрах в и во всем во подбрющи съ болью во утробъ; ежели у него бываетъ то ненавда, то о пвращенте от в пищи; ежели его лога бълеса, и имъеть иногда видь пива, или черноту черниль; ежели у него бывають частые позывы кь выпущению оной, и ежели часто выпоражниваеть оную съ жаромь; ежели не можеть заснуть, или сонь его пресъкается непріятнымъ образомъ; ежели этотъ сонъ иногда бываетъ отвратительнымь, такь что больной боится постели; ежели у него пустые страхи; ежели онъ печаленЪ; ежели есть меланхолія и великая боязнь о своемъ состоянии, возмущающая и тревожущая его воображение и проч: то онъ страждеть переною бользнію, называющеюся ипохондрією. Смотри § 13 той же главы 45.

Завалы и сцирритеские желваки во груди и подбрющии.

(Obstructiones & tumores scirrosi in pectore, nec non in ventriculo inferiori)

Ежели больной чувствуеть вы какой нибудь части тела, а особливо вы частяхы, содержащихы жельзныл тереса, какы-то вы груди и подбрющи боль, тяжесть и давление; боль, умножающуюся при щупании того мыста рукою; ежели на томы мысты примычается возвышение, а особливо когда гны до находится вы брюхы сы блы ность сти и одутливости лица, опухолью ногь; ежели есть

кашель, и ежели дыханге производится съ трудностію (что показываеть, что больное мѣсто есть или въ лее-кигд, или петени, или селезенкв); ежели больной имѣ-еть отвращенте оть пищи, трудныя пищеварентя, отрыжки и пучентя желудка; ежели во рту у него сухо и вязко; ежели онь уныль и спать не можеть; далѣе, ежели у него пульсб всегда лихора дотной; ежели примъчаются удвоентя послъ объда; ежели весьма часто бываеть попосб, и ежели испущаеть моту безцвътную: то надобно изь сего заключить, что у него есть завалы или сцирритескте желеаки въ груди, или въ подбрющии.

Завалы вб фаринкой и глоткв.

(Obstructiones in pharynge & ofophago.)

Ежели кЪ нъкоторой части сихЪ припадков присоединится трудность вЪ глотанїи, то это показываетЪ, что больны фаринков и глотка.

Завалы в песких ...

(O'structiones in pulmonibus.)

Ежели съ сими самыми припадками соединится тяжесть или давление въ груди, то это значить, что завало находится въ легкихо.

Завалы вб петени.

(Obstructiones in bepate.)

Ежели къ нъкоторому извъстному числу сикъ самыхъ припадков присоединится желтуха, то она показываетъ завало въ петени.

Завалы в селезенкв.

(Obstructiones in liene.)

Ежели большая часть знаков в скорбута и растятиваніе в в львом в ипохондрь приключатся в сих в обстоятельствах в, то из в того надобно заключить, что засал в сдылался в селезенкь.

Завалы вб брыжейникв.

(Obstructiones in mesenterio.)

Ежели сухотка, да еще поносо унорной, а наипаче у младенцевь, окажутся вы такомы же случаь: то это означаеть закалы вы брыжейникь.

Завалы вб желудкв, вб пилорв и вб панкреасв.

(Obstructiones in stomacho, pyloro & pancreate.)

Ежели всв сій припадки соединены будуть съ обычайною рвотого, то это желудоко, пилоро или нижнее отверзтіе желудка и панкреасо завалены или засорены.

Завалы в кишетном каналь.

(Obstructiones in canali intestinali.)

Ежели къ нъкоторой части вышеуномянутых в припадково присоединится боль иліатеская и неукротимой кровавой поносо, то завалы находятся въ ки-шетномо каналь. Смотри о сихъ различныхъ гнъздахъ завалово и сцирритескихо желваково въ главъ 47 § г. Тома III.

Отрава или ядб, присиненная мышьякомб.

(Arsenicum, intus sumptum.)

Ежели какой нибудь человъкЪ, наслаждающійся впрочемЪ совершеннъйшимЪ здравіемЪ, вдругЪ почувствуетъ

еть великое уныние или тоску, сопровождаемую жаромЪ, глухими болями вЪ желудкв и утробъ, непомърномъ измъненти съ позывами на рвоту; ежели языкъ и горло делаются сухими и жесткими; ежели онъ внадаеть въ неописанную тоску, сопровождаемую икотого, сильными обмороками и чувствительным в холодом в въ конетностяхв; ежели ко всъмъ симъприпа дкамв присоединится ужасная рвота матерією черною, потв холодной, тоска и тошнота; ежели въ первыя сїи минушы брюхо пришискивается и запирается; ежели пулься маль, сжать и сконцентрировань, такь какь случается въ жестокихъ боляхъ утробы; ежели вскоръ по томъ откроются сильныя выпоражнивания низомъ матерією зловонною, сильные облюроки или обмертвілости, грусть, раздирание подбрющия, огонь антоново въ желудкъ, предвъстники смерти: то надобно почишашь сего человъка отравленным в отв мышаяка, и справишься съ главою 48, § 2, членомъ I Тома III.

Отрава, пригиненная мізмою зеленью.

(Arugo anea fossilis, intus sumpta.)

Ежели человькъ, прежде наслаждавшійся наилучшимъ здравіемъ, посль кушанья почувствуеть въ пустоть или въ впадинь желудка боль, весьма острую,
посль которой приходять колики желудка и утробы; ежели выметаеть верьхомъ принятую пищу; ежели по томъ блюеть великимъ количествомъ желти густой и зеленой съ непомърными усиліями и тоскою;
ежели подбрюте осядаеть оть спазмодитескаго сжатія мытицъ сего мъста; ежели конетности, какъ
верьхнія, такъ и нижнія, часто двигаются движеніемъ кортнымъ съостръйшею болью; ежели больной жалуется на шумъ
въ ушахъ и сильныя головныя боли; ежели по томъ
случаются обмороки, пото холодной, кортная икота

и проч: то этоть человькь отравлень мь дного зеленые. Смотри члень III § 2 той же главы 43.

Отрава, пригиненная свинцомо и его вы дълками.

(Plumbum, & quæ ex eo fiunt præparata, intus sumpta.)

Ежели больной чувствуеть большую часть припадково нервной колики или живописиовой, т. е. ежели начинаеть чувствовать переходчивыя боли въ животв, безпокойствія, скаканія кортныя, запорв, боли въ желудкв, рвоту; ежели боль вЪ животь вЪ короткое время усиливается и остановляется противъ пупка. которой уходить внутрь и скрывается; ежели эта боль становится наконецъ столь нестерпимою, что больные катаются на постели, крича весьма громко; ежели въ стю эпоху мога и пометъ задерживается; ежели задній проходо совсьмЪ сталЪ невиденЪ и закупорился герменнически; ежели случились корти, потеря зрънія и голоса, приступы эпилептитескіе и проч; ежели нижнія конетности убиваются паралитель; ежели пальцы скорючились и проч; ежели наконецъ боли становятся толь ужасными, что больной издыхаеть: то онь отравлень сепниом выдылками. Смотри члень IV § 2 той же главы 48.

Отрава, притиненная шпанскими мухами, принятыми внутрь.

(Cantarides , intus sumptæ.)

Ежели больной чувствуеть всь части своего тьла, начиная со рта даже до мочеваго пузыря, снъдаемыми; ежели его дыханте зловонно; ежели съ трудносттю пускаеть могу, перемъщанную съ кровто; ежели
мочится настоящею кровто; ежели онъ низомъ испражняется матертею подобною той, которая выметается
въ кровавомо поносъ; ежели по томъ подпадаеть частымъ

стым в сильны из обморокам в или обмертовлостям в, гологокружению, станих в или приапизму, кровошечению изв нижняго прохода и проч: то онв отравлень шпанскими мухами, принятыми внутрь. Смотри члень V с той же главы 48.

Уязвление от в провитых животныхв.

(Uenenum, a venenatis animalibus communicatum.)

Ядь или уязвление, причиненное угрызениемь животных в бъщеных в или взбъсившихся, как в то ехи дны, гмъй, ужей и ядовитых в насъкомых в, причины имъеть толь явныя, что не для чего бояться, чтобь не обмануться в в свойств их в дъйстви. И пак в мы почитаем в, что можно опустить сего признаки, кои однако же находятся в в з той же главы 48.

Отрава, произведенная растительными ядами.

(Uenenum, a vegetabilibus venenatis productum.)

Ежели сверьх втучаго жара и несносной боли вы желу дкв и кишках вричиняемой мине ральными я дами, больной испытываеть еще головок руженія съ нъкоторымь степенемь одурьнія, усыпленія и проч: то онь отравлень я дом в изъ класса я довитых в растеній. Смотри § 4 той же главы 48.

Ompasa onie M3.
(Uenenum ab opio.)

Ежели больной находится вЪ нарочитомЪ усыпленіи сЪ онъмъніемЪ, безгувствіемъ и всъми другими припадками опоплексіи или постръла; или ежели онЪ непомърно смъется, чувствуетъ слабость въ членахъ, отсутствіе ума; ежели зръніе притупилось, лице красно; ежели есть разслабленіе въ челюстяхъ, опухоль Томъ II.

ма губахЪ, трудность вЪ дышаніи, тошнота, реота, корги, сильные обмороки или обмертвѣлости, потв холодной и проч: то онъ отравленъ опіемв, принятымъ въ излишнемъ количествъ. Смотри членъ I § 4 той же 48 главы.

Отрава отб болиголова и песьих в грибовб.

(Uenenum a cicuta venenatisque boletis.)

Ежели какой нибудь человъкЪ, покушавши въ летвахъ, или въ огородъ, или на дорогъ и проч. растение, листами похожее на петрушку, а корнемъ на пастернакъ, чувствуетъ иногда внезапное онъмъние; ежели вскоръ по томъ окажутся головок ружение, затмъние въ глазахъ, бредъ, обезумление, корги, рвота, икота, жаръ и боль въ утробъ, опухоль подбрюшия, течение кроси изъ ушей, итна у рта и проч: то этотъ человъкъ отравленъ болиголовомъ. Смотри членъ П 5 4 той же 48 главы.



полный и всеобщій ДОМАШНІЙ Л В Ч Е Б Н И К Ъ.

YACTE BTOPAS.

0

TXRHET KO a

TAABA 1.

Общія наблюденія о совденіи и пользованіи бользней.

Свёденіе бользней не столь много зависить оть врачебная умозрительных началь, как в некоторые люди во-основы-ображають: оно есть последствіе наблюденія и вается только на наблюденів и опытв.

Прислуживая больнымъ, примъчая всъ оказывачто надобющіяся въ ихъ бользняхъ проявленія, можно дости- но дълать гнуть до нъкотораго степени познанія, довольно пол- аля узнанія наго, какъ въ разсужденіи свойства признаково, бользней. такъ и въ предписаніи потребныхъ на оныя бользни

X 2

13-

лекарство. По сей-то причинь смысленные приставники или прислужники больных , также люди, непрестанно находящиеся около больных в, часто лучше знають бользни, нежели нарочно учивштеся на тоть конецЪ, чтобЪ быть Лекарями.

Однако мы того и въ мысли не имвемъ, чтобъ До сего иначе достиг- внушить, будто Врачебная Наука безполезна: гръхъ нушь не сомнъващься о еч важности; но умозрвийе или теория можно, ианъ прак- въ сей Наукъ никогда не возможетъ наверстать натиною въ блюдение и опыть, кои не иниче получаются, какъ Медицинъ. пракшикою. DATABLE

Всякая бользнь почесться можеть какъ бы собра-Канъ долнісмь признакова: и такъ развъ изъ однихъ токмо жно взипостоянно и очевиднымъ образомъ представляемыхъ рашь на бользив. признаков должна означащься бользнь.

Причины . побудив--uros Rim нишеля послёдовать шежу въ сей Второй Части.

И такъ вмъсто того, чтобъ бользни поставить классамЪ системанническимЪ методомЪ, гораздо лучше вЪ планъ шаковаго сочинентя, каково есшь сте, почелъ я преподать ясное и точное описание каждой бользни вЪ своему чер. особенности, по мъръ, какъ онъ встръчаются; но притомъ привести и тъ обстоятельства, въ коихъ нъкоторые признаки какой нибуль бользни имъютъ сходство съ признаками другой, и представить туть же признаки особенные и характеристические, по коимъ эта бользнь можеть отличена быть отвесякой другой.

> Ежели кЪ симЪ предметамЪ приложено будетЪ такое внимание, каковаго они достойны: то откроется, что сведение бользней не столь трудно приобрътается, как в кажется св перваго вагляда.

. 30 ож билхата визопрета Se и по Гингенска бежении этем, эт

О общемо пользовании бользней, относительно ко возрасту, полу, телосложению, праву, воздуху, яствамо, упражнениямо и прос. больнаго.

Мы вопервых в примъчаем возрасть, поль, поль, поль пользоважно съ разборчивостію разсматривать возрасть, поль, пользовапівлосложеніе, свойство и нравь больнаго. Сіе разсматіи больтриваніе особенным вобразом в послужить къ откры-наго. тію свойства бользии, и слъдственно къ показанію пристойнаго образа въ пользованіи.

ВЬ младенчествь солоти бывають хилы и слабы, вольям младенмервы крайне раздражательны, жидкія весьма імонки; цевь и
а вы пожилыхы льтахы напротивы солоти ссыхають, стариновы первы почти не чувствительны, и большая часть сосущественнымы судово засорены или завалены. Сій и многія другія образомы особенности дълають бользии младенцовы и старимежду соковь весьма различными: и такы онь требують различнаго способа вы пользованіи.

Женщины подвержены многимь бользнямь, у женкоихь у мущинь не бываеть. Далье, какь нервный родо щинь быу женщинь гораздо раздражательные, нежели у му- нія бользщинь, то ихь бользни должно пользовать съ большею ни, коихь осторожностію. Впрочемь женщины не столь легко у мущинь не бывамогуть выдержать великія сыпоражниванія, и всякое ет, и трераздражающее лькарство не иначе имь можеть пред бують писано быть, какь съ осторожностію.

Различность твлосложений не токмо двласть лю-ности въ дей склоннвишими къ такой или иной болвзни, имъ ніи. свойственной; но еще требуетъ различія въ образь нъжной челользованія таких вользней. На примъръ, нъжной человых провых имъющій нервы слабыя, и обыкновенно живу-пругаго щій въ заперти, не можеть, какую бы онъ бользова-

HIA

мія, неже- ни имъль, пользуемь быть въ точности такимъже обдя плотной и сильной. станно выдерживавшій вліяніе вольнаго воздуха.

должно должно также смотрыть выпользовании бользней наты и на нравы съ величайшимъ рачениемъ. Нравы насмурнаго. Для ной, болзливой, неспокойной или нетерпыливой прочего: изводить бользни и ихъ отягощаетъ.

Півкарства, предписываемыя тілу ві томі наміреній, чтобі уврачевать бользни дука, остаются втуні. Когда страждеті душа, то наилучшее средство состоиті ві томі, чтобі ласкать страсти, удалять оті дука мучительныя мысли, и держать больнаго ві толь спокойномі и пріятномі состояній, ві какомі только возможно.

Надобно также смотрыть на мысто, вы коемы мадобно больной живеть; на воздухв, коимы дышеть; на его пищеупотребление, на упражнения, работы и проч. Ты, духь, но кои живуть вы мыстахы низкихы, сырыхы и болотиный боль стыхы, подвержены многимы бользнямы, кои нагорной дыны жителямы не извыстны; ты, кои дышуть нечень.

чистымы городскимы воздухомы, также многимы подвержены бользнямы, коихы и слыда ныть между щастичными жителями сельскими.

на летва, Люди, питающёеся летвами грубыми, предающёимъ упо- еся питёю крвпкихв напитковв, подвергающея особентребляенымъ бользнямъ, отъ коихъ трезвые и умъренные освобождены.

На его Мы уже дали знать вЪ главъ 2 Тома I, что разийя, на родь жизподъ жизнь. свойственны. И такъ нужно выспрашивать у больнаго
о сихъ различныхъ важныхъ пунктахъ; потому что
край-

крайней глупости было бы дело пользовать находящихея въ непрестанномъ движении людей такимъ же образомЪ, какЪ и сидачихЪ, хотя бы предположить, что они страдають одинаковою бользнію.

6 2.

О томб, тто должно знать прежде приступа ко пользованію какой нибудь бользни.

Весьма нужно извъдать, природная ли то бо-должно неакзнь (о коей идеть дело), или слугайная, простая выдаться ли, или запутанная, существенная ли (от себя од-о свойствя ной существующая), или симптоматитеская (от дру- о времени, гой бользни произшедшая); съ котораго времени она съ котораведется; не произошла ли она от нарочитой и вне-го она прозапной перемъны въ пищеупотреблении, въ поведении ся; о прии проч. (1). чинъ, ее Да-произвед-

(в) Сін наставленія весьма важны: природная или находящаяся въ са- для чего: момъ телосложения человена болезнь съ трудностию вылечивается; а елучанная или происходящая не от причинъ, въ насъ существующихЪ, удобиве уступаетъ лъпарствамъ пригоднымъ и благоразумно употребляемымъ. То же должно сказать о бользни простой: она удобите выпользывается, нежели запутанная одною или многими болтзнями.

Что насается до бользней симптоматических, то их в не можно вначе выпользовать, какъ доходя до источника оныхъ т. е. начиная пользовать ту бользиь, коея они суть последствиями. Можно вообще еще сказать, что ногда каная бользнь не уступаеть пользованію, водимому руководствомъ законевъ здравой Науки: по основательно можно нодозръвать, что она зависить отв накой нибудь тайной порчя, которую надобно отпрыть, изгнать и истребить, ежели можно. Тык увидимъ многіе примъры таковыхъ бользней въ последствін сего шворенія, а особливо въ главъ 20, 5 2, членъ IV, и главъ 23, 5 з и . и проч. сего II Тома.

Впрочемъ сіе последнее наставленіе есть однимъ изъ числа тъхъ, ноему вообще послъдують: его важность дознача всъми людьмя; и почти нъщь ни одного предпринимающаго явчить, ноторой бы о семь не навъдывался оть больн. (жь. Но главное туть дъло состоноражниванілять, о домень выпоражниванти; о способь, по которому продыханіи, изводятся работы жизненныя и душевныя, какъ-то пвидеваре- дыханіе, пищевареніе и проч.

Ha-

ить вы томь, чтобь вывъдать истинну; однако же много ли тажижь людей, которые бы оной не утанвали?

Снолько-мо легио можно обмануться отвътами больчыхъ о своихъ бользняхъ. Скольно танижь, нои бы, будучи въ долговременныхъ или продолжительныхъ бользияхъ, наиначе же причиненныхъ венерическою или французскою бользию, или отъ оной зависящихъ, не отилоняли ее отъ себя всяними усиліями, сворачивая ее въ своихъ словахъ на другую чакую нибуль? Правда, плотоугодіе сольлало сію посльднюю бользиь толь обыкновечною, что нынь въ большей части городовъ въ ней открываются безъ всякаго зазрынія; но люди нъжныхъ чувствій за то тизатся скрыть даже мальйшіе знани, которые бы могли по-

и такъ
надобно
высприивать и выв здывать
не токмо
оть больиыхъ, но
и оть
окружающихъ
ихъ

Но накъ многіє, даже въ большихъ городахъ, скрывають причины своихъ бользией: що мы увъщеваемъ посвящившихъ себя на облегченіе страждущаго человъчества мужей по своему состоянію, или склонности и благосердію, не совсьть довольствоваться отзывами больныхъ, но выспрашивать еще отъ ихъ род твенниковъ, отъ ихъ друзей, отъ всьхъ имъ преданныхъ и знающихъ, дабы отобрать, еколько возможно, болье такихъ дъль, кои могутъ открыть свойство той бользии.

Сін изыснанія весьма много послужать или ив утвержденію того, что больной о себь сказаль, или ив отверженію того, что онь утверждаль вь противность настоящимь проявленіямь и признамать его бользни; потому что есть еще и другой илассь людей, да ихь и не малое число, которые увъряють себя, что имьють непремьную и до смерти пребывающую бользнь, исторую, какь они говорять, наслъдствовали от своихь родителей, или получили давно, и которую почитають они причиною всьхь сь ними случающихся бользней, естьли хотя мало сін послъднія лькарствамь не уступають.

На примъръ: сколько такихъ женщинъ, котерыя доказывають, что всъ ихъ нездоровья, всъ бользии, ими чувствуемыя, происходять отъ разлившагося молока! сколько другихъ, которыя всъхъ ихъ приписывають нервамь! къ большему же нещастію онъ находять повсюду шарлатіновъ, которые укръпляють ихъ въ такомъ мнъніи, подавая на то свое согласіе; которые даже часто выдумывають таНаконець издобно спросить больнаго, какія суть вопросы, бользни, коимь онь наиначе быль подвержень, и ка- нои надобно предла-кія употребляль лекарства, кои ему были спаситель-гать боль- Томб II.

новыя мивнія для полученія довъренности, употребляемой ими во зло жесточайшимъ образомъ; ноторые т. е. подавляють надобьями сихъ нещастныхъ, повергающихся отъ того въ безчисленныя нещастія; потому что они дають ленарства только противныя состоячію ихъ, такъ накъ мы упоманемъ въ главъ в, примъч. з сего Тома, и главъ в, примъчаніи з Гома III.

Мы бы и конца себь не нашли, ежели бы захошьли вступишь въ подробное описание различныхъ людскихъ образовъ мыслей Разные въ состояни ихъ бользчи и о ихъ бользняхъ. Одни, а особливо уче. людские ные люди, не котять быть больными; и котя ихъ здравіе чась от- образы мычасу истощевается, однако ни въ чемъ они не хотять при-слей въ сознашься, или послушаться; другіе напротивъ котять имъть вст при стояніи 60нижъ упоминаемыя бользни, или описываемыя предъ ними спрашнымъ льзней и о и поразительнымъ образомъ. Они отвътствують всегда утвердитель- ихъ бользно на предлагаемые имъ вопросы, такъ что коликократно бы ни няжъ. были они повторены, только Лекарь столь же мало положительнаго занлючить можеть, сколько съ перваго прибытія своего къ больному. Въ томъ и въ другомъ случат, ежели кромт больнаго не можно наведаться от других в людей, одна токмо проникательность и опышность въ состояния извлещи его изъ каоса, въ конторой повергиули его таковыя китросплетенные отвёты. Одни при объявленіи ихъ бользней ньчто утаевають, дабы не подпасть такой - то и такой - то дівть, такому - то и такому - то явкарству и проч: и сія утайна обынновенно водится у молодых в людей, у плотоугодниковъ, и проч; другіе прибавляють оть себя что нибудь къ объявлению или описанию своей бользии, дабы предписане имъ было такое или такое лъкарство и проч; наконецъ, вкусъ человъна и диновинкамъ, его наклонность и притворству и удаленію ощь истинны, кажется, толико ему свойственны, что стракь, чтобъ не подорвать свое здоровье, и даже чтобъ не подвергнуть жизнь свою опасносии, не всегда въ состояни надъ нимъ торжествовать.

И такъ при испытани бользии надобно употреблять всякие способы; не надобно щадить при вопросахъ ни больнаго, ни его окру- Въ разска-жающихъ: но и въ ихъ отвътахъ потребла тольно откровенность и зъ большетинна. Ясное и простое, котя впрочемъ не имъющее прикрасъ, ныхъ о даже порядна и слога, изложение гораздо большее подасть свъдение, своей бонежели си громкия описания, въ коихъ умъ почти всегда пре ращаеть лъзни потрава. Бъшенство описывать бользни поразительнымъ и великользинымъ ребна одна образомъ, есть, скажемъ то мимоходомъ, одною изъ главныхъ при-откровенинъ того, что часть Врачебной Науки совътовательная толь часто ность и исмъняетъ.

нье прочихъ. Еще надобно его спросить, какой видъ лькарство ему наименье отвратителень; не имьетъ ли онъ сильнаго отвращентя въ особенности къ какий нибудь изъ нихъ и проч. (2).

£ 3.

(2) Вошъ почти тоть способь, по которому можно по мижню г. Тиссота предлагать сін вопросы:

Канъ спрашивашь зэрослаго.

Издавна ин ведется у вась эта бользиь, на которую вы жалуетсь? вашь отець и мать не имьли ли ее? не получили ли, не заразились и вы ею оть кого нибудь другаго? тоть человькь, оть котораго
вы заразились, не имьль ли другой какой бользии, явной или тайной?
эдоровы ли вы до того были? какой родь жизни обыкновенно вы провождаете? какія ваши упражненія? ваша бользиь не есть ли сльдствіемь какого нибудь излишества вы питьь, вы кушаньь? накь она
кы вамь пристала? сколько тому времени, какы она у вась ведется? не болить ли у вась горло, грудь, желудовь, вы животь? вы
полениць? не сухы ли у вась наыкь? не морить ли жажда? не дурно ли во рту? не чувствуете ли отвращенія оть пищи, тошноты
пли позыва на рвоту? есть ли нанизь? часто ли? наковы пометь?
мочитесь ли? нанова моча? часто ли она перемынается? идеть ли
поть? кашляетель? харкаетель? свободно ли дышете? есть ли сонь?
какь проходить бульйоть, отварь и проч?

Ежели вольна вудеть женщина, то еще спрашивается:

Женщину.

Порядочно ли у васъ идуть мосячный? прошли ли они? сколько тому времени назадь? ожидаетель ихъ? чрезъ сколько дней? порядочны ли, обильны ли они? сколько времени они у васъ продолжаются? за мужемъ ли вы? или вдовствуете? не беременны ли вы? которой мъсящь? давно ли родили? сами ли кормите? нътъ ли у васъ вълей; или они пропали? давно ли?

Ежели мледенець, то такь:

Когда 60ленъ млаленецъ. Которой ему настоящій годь? сколько у него зувновь? не болень ли онь тьть, что у него они прорызываются? исть ли у него лайнской больни? Ньть ли у него грыми? была ли на немь оста? не перешится ли червями или глистами? не напучился ли у него животь? спокойно ли спить?

Надобно бмотръть на внышность больнаго, на попражнеміл, на заСін вопросы, сколько бы они и еще умножаемы на были, еще не довольны суть для полученія точнаго свъденія о состояніи больнаго. Надобно єверьхъ объявленнаго нами въ предыдущемъ примъчаніи любопытства, подойти къ больному, посмотр'ть на его фисіономію, а начитаче на его глаза, на языкъ, на дытаніе, пощупать брюхо, посмотрьть на пометь, мочу, харкотину, вывъдать, какой запахъ имьють поть.

О пищеупотреблении при пользовании бользней.

Мы уже показали въ Томъ I, главъ 3, что одна важность токмо діэта можеть выполнить большую часть пока-діэты въ заній въ пользованіи бользней; и птакъ діэта есть бользней. первой предметь, на которой должно внимательно смотръть.

Простые люди думають, что все называющееся заблуваелекарстволо имветь нькую сверьх вестественную сито прослу, нькое тайное вліяніе; они мнять, что какь о льнарскоро больной довольно навлея лекарство, то тотчась ствахьдолжень быть здоровымь.

Сте заблужденте влечеть за собою нагубнъйштя Слъдствие слъдствия: оно дълаеть то, что такте люди пола-сего за гають надежду и довъренность на одни только на-блуждения добъя, а опускають изъ рукъ своихъ наилучитя пособтя; далье, оно сбиваеть съ пути и заставляеть оставить больнаго, когда не случится, или по недостати не можно получить лъкарствъ (Смотри въ таблицъ слова дтэта, пищеупотребленте, яство и лъкарство. Для употреблентя сего творентя необходимо пужно имъть правильное и истинное понятте сихъ словъ.)

Пвиарства неоспоримо весьма полезны сущь, ког-лекарства да дельно показуются; и ежели они употребляются только благоразумно, то тогда великое приносять благо: но могуть когда почитають ихъ вмъсто всего, а предписывають быть попослучаю (что очень часто случается), то они мо-лезными, когда предписывають ся и упо-

поть, испарина и проч: потому что больнь тьмь бываеть тагчае, пакь его чьмь видь всько сикь предметовь и запакь оть больнаго болье от нао рту ступаеть оть естественнаго состоянія.

и проч.

Мы постараемся назначить цёну наждому изБ сижЪ знаковЪ, по Для чего? мёрё накЪ болёзни будуть встречаться.

требляют-гуть причинить много зла. И такь мы желаемь, св съблаго чтобь, вмвсто изыскиванія тайныхь или секретныхь лекарство, обращено было вниманіе на то, что касается до пищеупотребленія, съ которымь удобнье можно обойтися: по крайней мврв не можно страшиться, чтобь оно не сдвлалось вреднымь.

ЧЛЕНЪ І.

Какая должна быть діэта ев бользиях вообще.

Вся бользни разслабляють пищеварительныя силы; явыв раз- и такь діэта должна быть во всякихь бользняхь легелабляеть пищевари тельныя быть ногу, естьли захочеть разхаживаться, не умные силы. будеть того, которой, лежа вы лихорадкы, захочеть всть тыже яства и вы такомыже количествы, какь здоровой.

Діэта въ Одна воздержность часто выпользуеть лихорадлихораднь, ку, наиначе когда она произошла от излишества въ произыедшей от пить в или кушань в.

излишества. Въ лихорадкажъ воспали-

шельных в.

Во всвх Б лихорадках Б, соединенных Б съ воспалении лением въ колотъ в боках в въ воспалении въ

(3) Сія истинна, правда, относится вообще но всём'в бользиям'в остранмы; но допуснаєть нёноторыя изключенія вів разсужденіи бользией продолжительных в. Изів числа сихів последних в есть такія, вів коихів больной принужденів бсть много, да и часто приниматься. Мы увидимів, что нівноторая часть бользией нервишків, и происходящіл етів избыточества желам бользии, суть изів сего же числа.

Г. Галлашень, мой другь, прежде бывшій льнарь въ Оспись де шарише при Сенть Сулпицкомъ приходь, сообщиль по случаю сего ельдующее наблюденіе: я знаю, сназаль онь миь, одного человьна на есмлесять четвертомь году, темперамента сухаго и многожелчнаго (холерическаго), которой принужденнымь находился приниматься за влу во всякую ночь. Сіе безпонойство происходило оть очень вдкой желчи, которая, когда этоть старикь лежить горизонтально, темла въ желудовь. Сей голодь выводили изъ него предписаніемь отваря изъ меду и виннаго камия (Стетогія сахагі).

въ легких и проч. легкая овсяная кашица, сыворотка, настойки съ растентями и кориями слизистыми и проч. не токмо могутъ питать больнаго, но еще суть наи-лучт лекарства, кактя токмо можно предписать.

ВЪ лихорадкахо внутреннихо, нервныхо, злыхо и въ лихопроч. которыя не соединены съ воспалениемо, радкахъ
которыя требують, чтобъ силы больнаго были поднихъ, нервдерживаемы кръпительными, всегда можно лучше выполнить намърение природы предписываниемъ диэты злыхъ и
питательной и добрыхо вино, нежели большей части
досель извъстныхъ лъкарство.

Діэта заслуживаеть наше вниманіе не токмо въ прово острыхо, но и вы продолжительныхо бользняхь. должилюди, страдающіе вытрами, слабостію вы нервахо, тельныхь всьми другими припадками ипохондріи, большую найдуть пользу вы употребленіи яство твердыхы и вино добрыхо, нежели всьхы крыпительныхо и всьхы лькарство вытрогонительныхо.

Скорбутв, стя столь упорная бользнь, скорье въ сноруступить ростительной дтэть принаровленной, неже-бутьли всыть противуцынготнымв, славныйшимь въ Аптекахъ.

ВЪ тахоткв, когда соки тела испортились, въ чахова желукодо столь ослабъ, что не можетъ переварить не твердыя волоти животныхъ, или еще превращить въ собственное свое вещество соко растений, дізта, коея основаніемъ есть молоко, не токмо будеть поддерживать и питать больнаго, но часто еще его и выльчитъ, между темъ какъ всъ прочія лекарства были бы безполезными.

ЧЛЕНЪ П.

О воздухь при пользовании бользней.

При пользованіи бользней есть еще много и других в предметовь, кои хотя и не столь необходимо нужны, как в діэта, однако тьм в не менье достойны нашего вниманія.

Важность евъжаго воздука и поновляе- маго въ большей части бо- льзней.

Странная глупость, издавна ведшаяся, чтобъ больнымъ не давать никакого сообщентя съ наружнымъ воздухомо, производила величайштя нещасття не токмо въ лихорадкахо, но и въ большей части другихъ бользней острыхъ. Больной болье получаетъ выгоды отъ свъжаго воздуха, осторожно впускаемаго въ его комнату, нежели отъ всъхъ другихъ лъкарство, кака можно ему дать, такъ какъ мы уже дали знать въ Томъ І, главъ 4.

ЧЛЕНЪ Ш

О тело леижении при пользовании про должительных вользией.

Увлодвижение равно можеть во многих в случа-ТБХОДВИженіе моях в почесться как в лекарствомв, так в как в сказано жеть повЪ главъ 5 Тома I: на прим. верьховая взда и кораблечесться лькаренвомъ плавание полезные будуть въ лычени тахотки, завалово въ жельзахо и проч. нежели большая часть досе-Bo MHOгихЪ пролв извъстных в лекарство; холодная баня и всь дру-AOAKHмельных в гія части Гимнастики также принесуть величайшую бользнахь пользу въ бользняхъ, происходящихъ отъ разслабленін тверлыко.

ЧЛЕНЬ IV.

О систоть при пользовании бользней.

одна чи- Систота весьма нужна, даже при пользованіи етота мо- бользней. Когда больной оставляется въ бъльв и одвжеть выжахъ замаранныхъ, то матерія, испаряющался изъявнить вевхЪ частей его твла, будучи онять втянута или многія 60поглощена, содъйствуеть къпитанію бользни и умно-во веднихъженію опасности. Многія бользни могуть выльчиться бользияхь одною только систотою, такЪ какЪ мы замъщили Томъ полезна I, главу 9. Она можеть спосившествовать къ уто- ному, такъ ленію из вих великаго числа; да и во всьх весьма и пользуюона нужна больному, а пользующимъ его весьма пріжина. щимъ.

члень V.

О превосхо детвъ пищеупотребления на 28 лъкарствами при пользовании бользней.

Ябы могь, ежелибы только нужно было, пред-пащеупоставить многія наблюденія въ доказательство того, требленіе сколько - по свойственное пищеупотребление нужно при выпользопользованіи бользней. ВЬ самой вещи часто оно выль- вать безь чивае тъ больных в безъ всякаго лекарства; а ежели кънаретвъ; пищеупотребление будеть пренебрежено, то лекарства а лекаринкогда не удающся: почему здась при описаніи поль- ли пищезованія бользней всегда говорили мы сперва о пище-употребупотреблении, а по том в уже о лекарствахб. небрежено,

Тъ, кои боятся употреблять лъкарства, могутъ останутся. довольеннованься однимъ только пищеупотреблениемо ми. (4). Чтожь касается до прочихь, вы коихы мы предпода

⁽⁴⁾ Забев не на мысль у Г. Бухана, будию онъ думаеть, что эти какимъ люди могуть выльчить всв бользии безь лькаретвь. Онь то только сбразомы внущаєть, что ежели они довольно не знають силь или дъйствій ло- должны карствь, то гораздо имъ лучше воздержаться отъ предписыванія или поступать подаванія оныхъ, нежели съ опасностію пускаться на случан. Они немогудолжны искать помощи, накъ скоро усмотрать, что бользны жесто- щіе употка, или не уступаеть предписанному пище употревлению. А впрочемь реблять они и тогда довольно исполнять благодыпельные свои виды, ногда бу- лъкарства... душь бодрешвовань надь пріугошовленіемь пищеупотревленія, ношорое есть безь прекословія существенное основаніе пользованія всянихъ бользней

нолагаемъ болъе смысленности, то мы старались въ каждой болъзни предписать рецепты простъйште и одобреннъйште.

Авкарства Однако же лъкарства должны предписываемы быть не могуть только смысленными людьми, да и въ такомъ случав быть всъ- не иначе, какъ съ осторожностю, какъ- то мы поками людь- жемъ.

ГЛАВА 2.

О лихорадках вообще.

Всяной че
лихорадки, по общему мнѣнію, похищають боловѣкь лѣе половины человѣческаго рода; и такь необходимо
должень нужно всякому человѣку знать причины, могущія оныя
чины липроизвести.

жорадонь.
Для чего? Причины, чаще всего случающіяся, лихорадоко, общія при- суть: зараза, ошибки въ пищеупотребленіи, нездорочины ливой воздухо, сильныя волнованія души, остановка какорадонь.

кого нибудь обытайнаго испражненія; все, что можеть вредить тълу совнъ или внутри, непомърной жарь; наконець и излишній холодь.

Какъ мы уже толковали довольно пространно о нъкоторой части сихъ причинъ, и показали ихъ дъйствія, то мы не будемъ повторять то, что сказали въ І Томъ, въ главахъ 3, 4, 10, 11 и 12: мы ограничимъ себя только тъмъ, что всъмъ желающимъ избъгнуть лихорадокъ и другихъ опасныхъ бользней совътуемъ читать и исполнять оныя съ точностію.

Лихорадки не токмо суть чаще всего случающісуть обы- яся бользни, но еще и запутанньйтія. Самая прокновенныйшія и запутанный припадками, изъ коихъ нькоторые равно принадлешія бользжать кь другимь бользнямь.

Харак-

Характеристическіе признаки лихора доко суть: характенепомърный жаръ, тастота пульса, потеря аппетита, ристичеповсемственная слабость и трудность въ отправле-сущестніи н-вкоторых в работ в жизненных в, или душев-венные ных (1).

признаки лихора-

Другіе не столь твердые признаки лихорадокв, локъ. но обыкновенно ихъ сопровождающе, сущь: тошнота или обще припозывъ на рвошу, жажда, тоска, слабость, похудъ-корадонъ. ніе, безсопицца, или прерывающійся сонЪ, недающій покоя.

Когда лихорадка приходишь постепенно, тай-признаки комЪ, образомЪ непримъшнымЪ, то больной чувству-михораешЪ сперва уныніе, разслабленіе, холодность ко все-стаюму его окружающему: онв жалуется на боли вв мы-щихь пошицах вы млененых частяхь, вы костях , выстепенноголовь; аппетить у него пропадаеть; ему становится тошно, а ворту вязко: нъсколько послъ того находить на него непомърной жарь, жажда жгучая, безсонница и проч.

Но когда лихорадка пристаеть вдругь, то она пристанобыкновенно начинается чувствованіем в чрезвычайнаго ших в холо варугъ. Joma II. M

Головная воль, гивздящаяся во ябу, есть столь твердый привиань лихорадии, что Врачи, ненаходящие въ пульев нужныхъ къ изБявленію лиморадии знаковЪ, обыкновенно прибъгаютъ къ сей части, когда подозревающь ликорадку. Ежели больной, присоединдеть онь, не чувствоваль въ голове боли, то надлежить тольно заставить его едълать болбе или менбе сильное шблодвижение, що не умедлишь онъ ее чувствовать.

⁽¹⁾ Сіе изчисленіе признаковь довольно показываеть, что частота пульса не составляеть одна лихорадку, какъ-то обыкновенно думаюшь. Въ самомъ дълъ, кошя бы всъ они совокуплялись къ показанію лиморадии, тольно не можно сказать, что одинъ ей свойственнъе, нежели другой; изключая развъ одинъ только Г. Буханомъ упоминаемый ниже, нотпорой есть воль головы. Воть что Г. ле Роз, старинной Монтпельерской Профессорь, славный Прантикь, намь говариваль по поводу сего въ публичныхъ ленціяхъ на Ипповратовы прогностиви.

холода, слабостію и потерею апнетита. Сей холодь весьма часто соединень бываеть сь ознобою или подираніемь по кожь, медленностію вь кругообращеніи, щемленіемь сердца, болью вь желудкь, тошнотою, рвотою и проч.

S I.

О различных видах длихорадокв.

Лихорадки раздъляющся на безпрерывных, отступныя, перемежающіяся, и на соединенныя съ выступомъ на кожт и помъстнымъ воспаленіемо, какъто оспа, рожа и проч.

Чрезъ безпрерывную лихорадку разумвется та, умвется чрезъ безпрерывную которая не покидаеть, не отступаеть оть больнаторань го чрезъ все время его бользни, или которая во все лихоран сте время то только представляеть или усилте, или ослабленте чувствительное въ своихъ оборотахъ, которое единственно зависитъ отъ ея хода, такъ что дотедти до высочайщаго степени своей силы, по немногу умаляется, а наконецъ и совсвыт пропадаетъ отъ дъйствтя или Натуры, или лъкарство.

Сей видъ ликорадки раздробляется на ликорадку острую, на ликорадку внутреннюю или медленную, и на ликорадку злую.

трезь кнжорадку
сструю.

Пихорадка тогда называется острою, когда ел
корадку
острую.

припадки сильны, а ходъ скороспътенъ, такъ что
она болъе сорока дней не продолжается.

чрезъ ли
Пихорадка тогда называется внутреннею или.

жоргану

медленного, когда усилія и припадки ся умъреннье.

внутрен-

Наконець, когда въ безпрерывной лихорадкѣ ока-ную или зываются пятны синїя, петехіальныя (2), изъявляю медленную щія ощутительную порчу соковъ тѣла, то сія лихо-чрезъ лигорадка называется злого, гнилого, или петехіального (3) хорадку злую.

II 2

Om-

- (2) Пятны петехіальныя или петехіи весьма худое предзначають; и Опасности, ежели они присоединятся къ другимъ пятнамъ синимъ, темнокраснымъ, возвъщае-или чернымъ, то ликорадка почти всегда бываетъ смертельною. Пе-мыя петих различаются отъ высыти, пурпуры и другихъ выступовъ на техіями кожъ не токмо своимъ цвътомъ, но еще и тъмъ, что выходять безъ въ чемъ всянаго жара, безъ зуда, безъ всянаго возвышенія (т. е. отъ кожи они разлине приподнимаются), безъ всянаго на кожъ пораненія, и обынновенно чны отъ высыти, безъ всянаго облегченія больному.
 - (3) Надобно здысь сдылать ныкоторое существенное различие. Мы ви- и прочемить во франціи, а особливо вы полуденных провинціяхь, много ныкогодовь злыхь, съ петехіями; и знаки сих пятень, описанные рыя лихонами во всеобщей таблиць, принадлежать также из сопровождаю- радки щимь сей видь лихорадки: однако мы чаще видимь лихорадки просто сто только петехіальный (имышія только видь петехій), кои суть сто тольсовершенно высыпныя, иногда добрыя или кы добру, какы говорить ко петеговершенно высыпныя, иногда добрыя или кы добру, какы говорить ко петего ле Роа, но чаще опасныя. Вы сихы послыднихы лихорадкахы вы- хіальныя, ступь бываеть вообще на четвертой или пятой день; иногда сы пер- не всегда ваго или втораго дня; иногда также оноло шестаго или седьмаго, такы бывая злывато или втораго дня; иногда также оноло шестаго или седьмаго, такы бывая злываго или втораго дня; иногда также оноло шестаго или седьмаго, такы бывая злывать вы осты и высыпной или сы сыпью лихорадка: по сему вы сихы ми или петехіальныхы лихораднахы выступь часто бываеть присисомы или гнилыми. переломомы, за коимы послыдуеть примытное облегченіе; но часто и ни малой перемыны кы лучшему.

Воть главные пункты, которые различають дихорадки элыя чьть разсъ петехіями оть лихорадовь просто петехіальныхь. Вь просто пемичествумехіальныхь лихорадкахь выступь бываеть въ большей части больются злых
ныхь, какь тьхь, кои освобождаются оть смерти, такь и тьхь, кои
умирають: въ настояще же элыхь или гнилыхь лихорадкахь сін пятны суть довольно ръдкое квленіе, и изъ числа смертельнійшихь примаковь; въ просто петехіальныхь лихорадкахь пурпуровыя пятны
радко выходять далье седьмато дня, чаще всего четвертаго, а иногда и скорье; а въ элыхь или гнилыхь лихорадкахь они обыкновенно
выступають только тогда, когла бользнь клонится къ смерти; въ
лихорапросто петехіальныхь лихорадкахь за выступомь пятень иногда последуеть весьма нарочитое облегченіе: напротизь того въ элыхь или
гнилыхь лихорадкахь пятны бывають постояню симптоматическими, и
ко петеобыкновенно возвещають близкую смерть. — наконець въ элыхь или
гнимыхь

чрезъ имжорадку отступную. Отступная лихорадка различествуеть оть ликорадки безпрерывной единственно своими степенями: какь безпрерывная, такь и отступная лихорадка не покидаеть больнаго чрезь все течение бользни; но сія посльдняя, т. е. отступная имьеть вь сутки частыя усилія, частыя ослабленія или отступленія, или, такь какь говорять Лькари, частыя удеоенія и частыя ослабленія (т. е. такія минуты, вь кои она бываеть сильнье, а вь другія слабье).

трезъ лижорадну жеремежающуюся. Перемежающіяся лихорадки суть тв, кои во время нападенія своего на больнаго дають ему примьтные промежутки, вы кои припадки бользни совсьмы уходять (такь что вы эту пору больной человькы не чувствуеть никакого чувствія лихорадки, и часто кажется будто здоровь; но чрезы нысколько часовь, чрезы нысколько дней, болье или менье продолжающихся, лихорадка приходить опять, а по томы опять уходить, пока наконець совсыть излычена будеть).

5 2.

О общемо пользовании лихорадоко.

настоящее понятіе о михорадий.

Как в лихорадка не иное что есть, как в усили природы для избытия изб себя бользнетворной материи (или лучше сказать, как в-то говорит в новыйшій писатель, для доставленія сей матеріи такого предварительнаго степени выдылки, за которымо имвето

20-

мыхь лихорадиахь пурпуровыя плины изрыма разсываются; они обыкновенно появляются на можь, на груди; они вы самой вещи цвыта пурпуроваго, такь наны красное густое вино; иногда же походять на пюсовой цвыть: напротивы того вы просто петехнальныхы лихогадкахь сіи пятны обыкновенно бывають красно - вишневыя; они многочисленные; обыкновенно много ихь видно на поясницы, на ягодицахь и проч. Смотри melanges de Physique & de Medicine, Tome I, p. 21 последовать извержение ел): то пользующимъ бользни надобно смотрыть со внимантемЪ, какое есть избираемое Природою средство для изгнянія сей болъзнешворной машерїи, и какимъ образомъ должно ей помогать въ сей работь. Устройство человъческаго пъла есть таково, что оно (тъло) постоянно расположено ко извержению и изгнанию изъ себя всего того, что можеть оному вредить; а сте Природа обыкновенно производить чрезь выпоражниванія, как Бто чрезъ могу, потв, пометв, харкотину, рвоту и проч.

Ежели бы съ начала лихорадки люди последо- можно вали, помогали усиліямъ Природы, то можно думать, останочто эта лихорадка не долго бы продолжалась; но вить уенкогда ея (Природы) усилія не познаны, пренебреже-радии, ны или противоборствуемы бывають: то не чему вспомоще. дивишься, что бользнь тянется и делается опасною. ствуя въ Мы повседневные видимъ примъры въ людяхъ, кото- дъйствірые простудившись, показывають всь признаки начи-ямь принающейся лихорадки: но ежели эщи люди будушъ роди. держань себя въ шеплъ; ежели будунъ употреблянь пишія мокротожи дительныя; ежели будуть ноги мыть въ теплой водъ: то признаки лихорадки тотчасъ пройдуть, а имъ не чего будеть болье бояться.

Наше намъренте не то, чтобъ вступить въ какак кришическое изследование о свойстве и непосред-цель сочиспівенных в причинах в лихорадок в: мы ограничим в себя в описаній шъмъ, что покаженъ поразительнъще признаки, и пользования изложимъ наилучшимъ образомъ присподобленной об-михераразЪ пользовантя кЪ больному, относительно кЪ пищеупотреблению, питью, воздуху, теплоть и проч. въ различных в оборошах в бользни; мы не позабудем в в в каждомЪ таковомЪ членъ относиться ко вкусу больнаго: сте будешь однимь изъ числа главных в нашихъ

поступковЪ.

TIO

Какое перство вдожнуто

Почти всв люди, имъюще лихорадку, жалуютвое явкар- ся на великую жажду: они безпрестанно просять пишь, наипаче же напишков в свойсшва прохладительприродою наго. Сте вдохновенте Природы показуеть намь употребление воды и других в питий прохладительных в и мокротожи дительных в (4).

Что

(4) Мы объяснили въ Томъ I, главъ 5, свойства совершенно чистой воды, и доказали, сколько-то употребление ея для сохранения здравія нужно. Она не менте заслуживаеть похваль и въ разсужденій пользованія бользней. ,, Надобно замьтить , говерить знаме-"нишъйшій Г. Ліетодъ (въ precis de la Medecine - pratique, Т. I, p. 36), ,, что обыкновенная вода им веть свойство умврять жарь прови, давать , ходность сонамЪ и гибность орудіямь, сольйствовать изверже-,, ніямь надежное, нежели деконты, юлепы, эмульсін, взварцы и ,, другія пинья, даваемыя больным в шедрою рукою, и получащія , главную свою силу отв входящей вв оныя воды-

Простыя лъкарства должны предпочитапься сложнымЪ и проч. Простота есть естественное состояніе.

,, Простыя локарства, говорить онь по томь, когда дельно , показуются, должны всегда предпочитаемы быть сложнымЪ, есте-"ственныя искуственнымъ. — Хотя жина въ лихорадив триднеоной и въ ликорадив удвонемой тридневной есть наилучшее, наное , покмо можеть упопреблено быть, абкарство: однако я не ръдко , даваль преимущество одной только чистой содь, прісмлемой чрезь , три или четыре дни вмъсто всякой пищи.,,

Первыя изобрътенія людей, первыя художества, первые способы, первыя нужды, первыя пособія вст были простыми: простота есть состояніе Природы. Врачи, ее не узнавшіе, начали прельщать глаза людение пышнымъ показомъ сихъ спранныхъ рецептовъ, сихъ формуль, которыя были только деломъ сущаго невежества, или посм Бянія достойнаго хвастовства.

Мнвнія древнихЪ o chome-HOLK D ABкарешвак В и ихЪ многочисленности.

Хорошіе сочинители не одобряли нак'в сложных в локарствв. такъ и ихъ многочисленности: многіе даже утверждали, что можно выабчить не св толиною опасностію вст острыя бользни однимъ токмо пишьемъ, да діэтою. Иппократь пользоваль своихъ больныхъ шонмо пище у потреблениемь; Этм у ллерь сажаль своих в чрезь многие дни на простое токмо питье; Сиденгамъ мнилъ, что большую часть питчанших в больней надобно приписать недвльно данным в лвиарствамь; Бальней вопиль противь бывшаго въ его время элоупотребления ихъ, и утверждаль, что большая часть ужасных припадновь, приписываемых острымь колбанямь, должна приписана бышь лвиарствамь. Гоффмань, писавшій о семь предметь, сильно востаеть накь противу очень сложиых в лекорствь, шакь и прошиву их в многочисленности.

Что на свътъ способнъе можетъ уменьшить полезных жаръ, утончить соки, разверзти корги и завалы, авиствія содъйствовать испарению, возбудить могу, наконецъ накъ и произвести всь спасительныя действія в лихорадкв мокротоострой, жгугей и воспалительной, как в обильное пи-жидительmie теплоя воды, овсянаго отвара, или другаго михорадкакого напишка легкаго и мокротожидительного, коего кахъ остоснование есть вода?

Нужда въ пиштяхъ мокротожи дительных пока-признани, зывается как в изв сухости языка, горячности кожи и показыважара жгущаго, такъ и неутомимой жажды больнаго.

Великое число прохладительных пишій, кошо-Канимъ рыя больному весьма пріятны в лихорадкв, делают- образомъ ся из в плодов в, как в - то из в декотка, т. е. отвара сін питія. тамриндовъ (вмъсто коихъ у насъ въ Росси могутъ употребляться сливы и терносливы), изъ яблошнаго тая ш. е. отвара из В яблокв) и проч. из В померанцовой

ющіе сін

пишіл.

Свидътельство сикъ велиникъ мужей, сикъ истинныхъ друзей человъчества, да откроетъ глаза Публикъ; да научить ее познавать силы и свойства веществъ простыхъ, которыя всегда подъ руками ея находящея; да наставить ее употреблять ихв: то она не умедлить увъриться въ сихъ истиннахъ, что Врачебная Наука состоить существение въ наблюдения и подражании Природъ; что приеподобленное пищеупотревление ееть единое токмо ею требуемое поеобіе въ бользняхь, въ коихъ силы больнаго находятся въ соотношенін действительности припадновь; что лежорства надлежить только употреблять въ промивныхъ случаяхъ, да и тогда предпочитать простьйшія поддыланнымь, сложнымь.

Мы надвемся, что насъ не булуть укорять за то, что мы что должне собственно присвоимъ имя лекарствъ простыхъ плодамь, растені- но разжмь, зернамь, кореньямь и водь. Мы знаемь, что эти вещества весь- умьть ма сложны; что они суть смеси, происходящія изв ихв составля- подв слотельных в частей, нои суть разнородны и свойства различнаго: но вомъ: лъпо недостатку слова мы пранужденными себя находимъ, согласно со нарства встми вышепоназанными, писателями, со встми правтивами, на- простыя. звать простыми авкаретзами всв тв, кои употребляются отв насъ шановыми, каковыми мы получаемь изв рукь Природы, въ сопрошивоположение шъмъ, кои сушь следствими состава, деласмаго опъ людей.

емеоротки и других в подобных в. Питья склизистыя дълающся изъ корня большаго проскурняка, изъ рожи, изЪ льнянаго съмени, изъ липовыхъ цвътовъ и многихъ другихЪ такого же рода растеній. Сіи питія, наипаче же когда они приквашены или подкислены, особенно нравяшся больнымЪ, да и не должно имЪ ихЪ ошказывашь.

ВЪ началъ лихорадки больной вообще жалуется на Важность покоя, не-великую утомленность, и любить только покой. Сти изется ин-признаки показують намь пользу оть того, чтобь больнаго оставить въ поков, и даже, ежели можно, хорадиа. положить его на постелю.

Спасишельетвія поешели въ лихораднакъ.

Покой на постели разверзаеть корти, умъряеть ныя дъй- быстроту кругообращения, и даеть способность Прикоя на по- родъ употреблять всъ свои силы для изгнанія бользни. Покой на постели часто могъбы одинъ выльчить. вначаль лихорадку; а ежели больной захочеть бороться ев бользнію, то не токмо будеть трудиться попуету вЪ отогнани ея, но еще укоренитъ ее глубже, и сдълаеть ее опаснъйшею. Мы весьма часто имъли елучай примъчать сте надъ путешественниками, захворавшими лихорадкого въ пуши: желанте поскоръе доспигнуть до назначеннаго мъста побуждаетъ ихъпродолжать путь, не смотря на лихорадку; но такой поетупокъ ръдко имъ бываетъ непагубнымъ.

въ лихорадкахъ надобно, сколько можно, искать Спокойетвіе духа средствъ успокоить не токмо тело, но и духъ. Редне менте ко случается, чтобъ компанія больному была пріятнужно въ на. То достовърно извъстно, что все могущее вослихораднакъ, накъ превожишь воображение оплагчаетъ бользнь. По сей и шта. причинъ всякой человъкЪ, занемогшій лихорадкою, долженЪ оставленЪ быть вЪ совершенномЪ поков; да и не надобно ему давашь видеть, ни слышать ни подъ какимЪ видомЪ что либо такое, что хотя мало можеть потревожить или поразить спокойствие его духа,

шак Ъ

такъ какъ дано уже о семъ знать въ Томъ 1, главъ 10 и 11.

Хошя больному въ лихорадкв весьма кочется отвращепишь; однако ръдко случается видъть, чтобъ онъ не отъ имбав позывь на влу. Сте расположенте Природы на- пвердыхъ, учаеть нась, сколь - то противно ея намфрентям' обре- вдыхаемое менять инщею желудоко больных в.

радиакъ. Яства твердыя въ лихорадкв суть настоящія яства тосредства сдвлать бользнь опасньйшею: они налагають гда не пушы на усилія Природы, и вмъсто того, чтобъ пи-больнаго тать больнаго, питають только бользиь. а шолько

бользив. Ежели надобно будеть больному дать яства, то въ чемъ они должны бышь въ маломъ шолько количесшвъ, лег- должны кія и удобоваримыя: они должны взяшы бышь из в состоять класса растений, и состоять въ панадъ, въ петеных гда они нередъ огнемъ яблокахв, въкашичкъ и сему подобныхъ показуют-

Какъ скоро у бъдныхъ захвораетъ кто нибуль желужновъ ихъ семействъ, то топчасъ бъгуть они къ до- кръпиещаточный шимъ сосыдамъ, и просять у нихъ желуд- тельных усугублякокрепительных в. Сін даюшь больному вина, спирт-ють тольных в напитков в (терьяку) и проч, конх в больной, но михобудучи здоровымЪ, можетъ быть и не вкушалъ. Еже-радку, или ли бъднякъ больной имъетъ не малой степень лихо-водять, радки, то еги крипительныя тотчась ее умножать; ногда ее а ежели не имъешъ, то они въ состояни ее произвесши.

Набивать желудоко у больнаго конфекциами, опасности еласшьми, сухарями и другими лакомствами, равно отъ конпагубно. Сти вещеетва всегда труднъе переваривают- фентовъ, сухарей и ся, нежели обыкновенныя яства, и не преминуть проч. въ отяготить желудокв.

лижораднахъ.

Природон

въ лижо-

пишаюшь,

Выгоды оть свы-MATO B03духа въ лихораднахъ. Пагубная проснаго народа прошивъ сего правила..

Больной лихора дкого ничего шак в усильно не желаеть, какъ свъжаго воздуха: онъ не токмо утишаеть жарь и киптийе крови, но еще его и прохлаждаеть, ободряеть духи и доставляеть величайшія выгоды. Великое множество больных в лихорадкою удушаются упорноеть накоторымъ образомъ до смерти по недостатку севжаго воздуха; однако же непонятное упорство большей части людей въ семъ случаъ таково, что какъ скоро увидять они кого нибудь вы лихорадкв, то забирають себь въ голову, что этотъ человькъ долженЪ лежать въ комнать очень скуппанной, въ которуюбы свъжій воздухЪ и заглянушь не могЪ.

Степень. долокенствующій бышь въ номнашь: Вольнаго..

Они не хотять увъриться, что надобно поступать тенлоты, совство прошивным образом ; что надобно содержать безпрерывно вЪ комнатъ больного проходъ седжаго воздуха такой, чтобЪ эта комната находилась вЪ умъренной размърности, и чтобъ теплота вЪ оной не большая была, какЪ которая пріятна человьку вЪ, совершенном в здоровь , так в как в о том в сказано въ Томъ І, главъ 4.

moro mepпъшь, чтобъ въ комнать: **Вольнаго** mero?

не надобно. Ни что такъ не портитъ въ комнатъ воздука, да и не делаеть его вреднейшимь больному, какв дышание многих в людей, в в оной собравшихся. Ежели кровь у больнаго шогда воспалена; ежели всъ соки швнаходилось да его находящся вЪ нъкошоромЪ состояніи гиїснія: много лю- що сей воздухЪ, будучи дышемЪ, ш. е. вдыхаемЪ и дей. Для издыхаемЪ, особенно умножитъ бользнь; потому что воздухв чрезъ то не токмо теряетъ свою упругость, и дълается неспособным в къ дышанію онымв, но еще получаеть качества вредныя, делающія его некоторым в образом в ядом в дольных в, как в - то о семъ дано знашь въ Томь 1, глав. 2 примъч. 1, и плав. 10.

«Semoя» Когда бодрость и силы больнаго вВ лихорадкахбі упали и почти пропали, то не токмо надобно его ОЖИВ-

оживлять криштельными, но еще увеселять и успо-ющія дакоивать его духь всякими возможными средствами.
Однако же есть множество людей, которые изь не-и оживсмысленной ревности распространяють ужась и страхь лять
вь душь бъдствующихь, представляя имь ужасы и надежду
казни адскія, вмъсто того, чтобь ободрить ихь въ больнадъяніями и утьшеніями изь Религіи. Не для чего номъмнъ настоять здъсь о пагубныхь слъдствіяхь таковаго поступка: то по крайней мъръ извъстно, что
онь вредить часто тълу, и не безь причины можно
думать, что ръдко онь бываеть полезнымь и душъ,
такь какь замьнено вь Томъ I, главь 11, \$ 2.

Простой народь и при словь одномы лихорадка на чемь помышляеть о кровопущании и почитаеть ее нужною. Вается Сте мньне, кажется, происходить оты того, по ложное большая часть лихорадоко вы сей земль была сперва мньне свойства воспалительнаго; но и то справедливо, простете на рода, что нынь рыдко оны сопровождаются воспалентемы. Си-стноска дячія работы и образы жизни, совершенно инаковый тельно до оты стариннаго, такы измынили свейство бользней нужды вы Англіи, что можно сказать смыло, что изы десятканія ти лихорадоко ньть ни одной, вы которой бы нужно вы лиховымо пускать кровь (5).

II 2

ВЪ

⁽⁵⁾ Прантинамъ предоставляется рышить, таковы ли же суть наши лижорадии, нанія Англинскія: наши упражненія, равно сидячія, наши излишества въ столахъ, равно умноженныя, нашъ образъ жизни, равно противный видамъ Природы, должны ли произвести въ свойствъ нашихъ бользней такую же разность, какую Сочинитель примыталь въ свойствъ бользней своихъ соотечественниковъ? То правда, что сравнивая описанныя въ книгахъ бользни съ нынышними бользнями, сіл различность оказывается таковою, что въ премногихъ обстоятельствахъ принуждены мы для успъха воспротивиться провопусканію, которую исполнить хотять нъкоторые люди по причинъ системы, пристычки, или предубъжденія къ имени бользни.

Анхорадки, ВЬ большей части лихорадоко снутреннико, вы конхы нервныхо, снилыхо, нынь толико усилившихся, кровоеканіе пусканіе естественно вредно тьмь, что оно разславредно. блясть больнаго и отнимаєть у него силы.

Одни толь- И такъ мы положимъ всеобщимъ закономъ, чтобъ но приз- никогда не пущать крови въ началь лихорадки, естьли нани вос- ивто нених признаково воспаления. Кровопускание есть поназыва- превосходное лекарство, когда дъльно показуется; ютъ крово- но имъ никогда не надобно шутить, или за бездъли- пуснане цу ставить (6).

раднахЪ• Когда и какЪ на• добно воз«

Еще же думають почти вездь, что вы началь ликора дки не меньше нужно возбуждать потв. Какъ

Mu-

Кровопусканіе даже не
нужно во
встх воспалительных в лихорадках в.
Особенныя
бользни,
в в ноих в
хровопусканіе
вмертельже.

Кровопу- (6) Сему закону последовали всё великіе Врачи. Не всё лихорадки, госнаніе даворить Г. Ліетодь, требують кровопусканія; оно въ нихъ часто
же не
бываеть безполезнымь, а иногда и пагубнымь. - - То не сомнительно,
что воспалительныя ликорадки (горкчии) болёе всего имбють въ ономбвсёхь воснужду; однако кровопусканія часто бывають противными въ сихъ
палительбользняхь, какъ-то гукстамь и многіе другіе сочнители замьтили
ныхь ливъ нёноторыхь поваламь. Precis de la Medecine-pratique, Т. І, Р. 32-

Есть шесть особенных в случаевь, говорить Г. Клеркв, въ коихъ кросопускание часто причинаеть потерю больнос: 1) въ пасочной апопленсін, въ коей оно смершельно; 2) въ усыпленін съ шемнымъ вредомь или молочной апоплекси родильниць; з) въ воспаленін легинть (регірпеттонів), въ ноей больной свободно каркаеть, хб. ши бы лихорадка и сильна была; 4) въ бользияхъ послъдующихъ от в неумъречнаго употребления любовнаго сладострастия, наиначе же въ спинной чахотав новобрачных В: боль, бывающая въ сей чакотав, есть поль острі, что бользив сію почищають иногда за ломоту, или за попеничную воспалительную боль; 5) во встк восткв бользикв, происшедшихъ сть распущения или разлития пасочнаго; 6) во всёхъ бользихъ до крайности типлымь, канъ-то въ ликораднамь гиплымь, зашив, въ усилившемся спорбуто и проч; я бы могь, прибавляеть онь, помъстить еще и непищеварение: и такъ развъ одии токма признани воспаленія могупь поназать св мочностію нужду вв провопусканін.

Сін признави суть пульсь частой, полной и жествой, жарь сильной, боли вы головь, сухость кожи, враснота глазь, лице палличее или воспламененное, трудность вы дышаніи, воль вы поменяць и проч: общіг признави лихорадки везпрерывной, поназацные

въ последстви главы 4, 5 2 сего Тома-

Свойство признаковЪ, показуюжихЪ кровопу-

вканіе.

ликора дки часто пристають отвостановленняго испа-буждать ренія, що извъсшно, что это мивніе въ таконъ слу-пошь въ чав до нъкотораго степени основательно. Пусть тог-кахъ. да больной лежить на постели; пусть вымываеть руки и ноги въ водъ теплой; пусть обильно употребляеть кашитки, или другое какое пите легкое мокротожидительное: всв сін средства редко не возбудять свободнаго испарения. Теплота постели и обильно употребляемое пиште истребять всеобщую тувствительность или раздражание, которое вообще въ началъ лихорадки поражаетъ твердыя: они разверзуть поры, возбудять испарение, и чрезь то често могуть прогнать лихорадку.

Но не такъ- то обыкновенно поступають: боль- Опасности маго заваливають одъялами, дають ему вещи только от обыксвойства горятительного, как Б-то элексиры, пряности способа и проч, которыя воспаляють кровь, усугубляють кор-возбужти и бользнь дълають опаснъйшею (7). nomb.

I 3

Bo

И шанъ бользни, въ началь ноихъ надобно всебудить поть, Сін бользвесьма редки. Вообще надобно ев Натурою въ шаком случав по-чи редкисовъщоващься. Ежели она расположена ив поту, по предлагаемыя Г. Опасно ос-БуханомЪ средства довольны суть для побужденія ея нЪ сему выме- шановишь

Но ежели опасно возбуждать поть въ началь большей части гда онъ бользней, то не менье также пагубно останавливать естественной его выходь, а начначе въ концъ болъзней, т. е. когда по обиль. но выхонемъ употреблени питій искоренены оныхъ бользней причины : потому дить, а что сей поть уносить съ собою нъисторую часть бользнетверамкъ напизаче въ соковь, ноихь грубъйція часта вышли сь пометомь и мочею-

пошь, но-

понца бо-

абзней-

⁽⁷⁾ И такъ развъ въ одникъ только бользияхъ, причиненныхъ оста- Единсивекновкою испаренія, можно безопасно возбуждать поть; а во встявныя бодругихъ сей поступокъ стоитъ ежегодно жизни многихъ пысячей абзия, въ людей. Не льзя довольно, говорить Г. Тиссоть, натолковать поселя- ноихъ намъ, что они, ища произвести изъ себя поть въ началъ какой ни- можно возбудь больяни, себя самих в убивають. Я видьяв, прибавляеть онв, буждать шаніе случан, въ ноихъ старанія, приложенныя къ насильному воз. поть. бужденію пота, произвели смерть больнаго такимъ очевиднымъ образомЪ, что вудто вы кто никудь ему выстрванав изв пистолепыа ав ловь.

радках в надобно уважать желанія больных в. Для чего?

Во всёх в лихорадках в надобно прилагать особенное вниманіе к желаніям вольных в: они суть вопли Природы, часто нам в показующіе тот путь, по которому нам внадобно следовать. Правда, не надобно им давать слепо все то, что больной их в аппетит требует но вообще можно им давать не что из втех вещей, которых в св горячностію они желают хотя бы они сперва показались им в неприличными. То, чего больной желает в сильно, его желудок обыкновенно то сваривает и некоторыя из вещей производят в иногда щастливьйтія последствія (3).

¶ 3.

© пользовании встающих били выз доравливающих дей от лихорадок в.

Мервое стараніе при выздоравливаніи отъ При выздоравливаніи ом вкакой нибудь лихорадки надобно наппаче наблюдать то, чтоб она опять не возвратилась. Многіе люди подвержены репи-

Природа часто вдыхаетъ охошу къ яствамъ и лънарсшвамъ приличнымЪ 60инет п Вдожновеніе Природы въ 60**бхинет** тни лаго уюда. Вездъ При-

рода тре-

буетъ то-

(8) Упорно принуждать больнаго принимать противныя ему лекарства, наипаче же не давать желаемыя имъ не прямо противныя бользни, ни очень вредныя по себь, есть дъло нагубной и достойной перицанія строгости. Тоть, кто въдгеть Природу, знаеть, что она намъ вдыхаеть гораздо чаще, нежели наиъ обыкновенно думають, охоту или внусь иъ летвамъ и лекарствамъ, кои пристойны спасительнымъ ел видамъ.

Почти во встхъ бользияхъ типлато рода больные непремъняемое и непреоборимое имъю ть отвращение но встмъ мяснымъ похлебнамъ, нъ веществамъ животнымъ, нъ рыбо, но всему тому, что мясное. Въ сихъ случаяхъ почти вст больные просять лимоновъ, померанцовъ, ястовъ и лъварствъ жисленъвиясь; они съ жадностию за нихъ хватаются: но сіи- що ястова и лъварства супъ пристойнъйтия противъ типлости, и предписываются для ототнания вной просетщеннъйтими Праитиками.

Природа вездъ пребуеть пого, что ей нужно. Съверные народы, нажется, естественную имъють силонность нь горячимь, ношерыя и въ самомъ дълъ имъ пригодны прешивъ водянистаго засоренія, жидивамЪ (возвращамЪ шой же бользни, которая ми-микорановалась), или впадаютъ въдругія бользни отъ того, что слишкомъ скоро почли себя выздоровъвшими (9).

Поелику шело, вышерпевшее лихорадку, есшь выздораслабо и хило, що нацобно выздоравливающимо ощь вливающее оной предохранять себя ощь холода, чтобь какь нибудь не простудиться. Пріящная и увеселищельная кам- гаться нанія, да еще умеренное телодвиженіе на вольномь оть холовоздухи имь будуть весьма полезны; но надобно избеприниматьпать наче всего великой утомленности.

Аства должные быть легкія, но пишательныя утомаяю-Имъ надобно почасту всть, но только по немногу щее ихъ ж прочеза разъ. Для выздоравливающаго опасно всть столько за всякою вдою, сколько желудоко просить. жны быть ихъ яства-

Не то питаеть, что встся, но что перевари-имъ недовается вы желудкь. Тоть, кто всть много, обре-бно веть пен исияеть только желудоко, которой утомлень буду-за развочи діэтого, лекарствами, бользнію, не имъсть доволь-и чано силь переваривать, и не токмо не питается или сто. Для: укрыляется, но мало помалу пропадаеть.

Можно, говоришЪ Г. ТиссошЪ, привесши вЪ ма- правила въ дос число шъ правила во коимъ нужно поступать для ни выздоствершеннаго окончанія острых бользней, и от равлива-

ренія, почти имъ естествечнато; а жители полуденныхъ странъ го, что ей услаждаются оржадомь, мороженымь, конфектами и проч, кои имъ нужно. нужны. Сін разсужденія доназывають, что посльдуя чертежу Приро- Примъромь ды трудно обмінуться, и что снося между собою его представляемыя представляемыя представляемыя, найдется, что она сама собою вся представляется нашимъ вляются глазамь. Г. Клеркъ Ніft. пат. de l'я вотте malade.

⁽⁹⁾ И такъ нужно обращить мысли на то, что разумъется подъ сло-ные наровомъ выздеравливание, и дать понятие, сполько возможно, о знанахъ ды. или свойствъ сего состояна, находящатося посреди бользни и вдрави что долпотому что въ выздоравлявания уже нъть бользни; она миновала: жно разу-

пращентя какЪ возвратовЪ ихЪ, такЪ и бользней томи-

I)

еловомЪ выздоравливаніе. но и здравіє еще не существуєть; потому что выздоравливаніє не можеть еще отправильть равоты съ силою, болростію, порядочностію таною же, накая была въ здравомь состолніи.

Знаки, изъ коихъ ц - знаенся, что больной вступилъ въ эмздоравливание По мивнію Иппократа, больной вступаєть вы выздоравливаніє тогда, ногда не чувствуєть онь никаной боли, ногда легно дышет, ногда спокойно просыпаєть ночи, и когда представляєть на себь всю знани поливищей безопасности. Ресуп. Lib. 5. И такь больной тогда тольно можеть псчесться выздоравливающимь, ногда всь харантеристическіе знани больни пропали; ногда припадли уступили пособілять или Природы, или Врачебной Науни; ногда отделенія и выметанія начались производиться порядочно; кратко, ногда порядонь и равновьсіе нажется мало помалу установившимися между жидними и твердыми. Но для этого цотребно, чтобь причина бользни не существовала болье, и следственно, чтобь бользнет срчая матерія выпорожнена была или разстяна. По сему сыздоравливаніе есть то светолніе, которое непосредственно следуєть за переломомь.

Причины, мо конмЪ вседневно мюди обманывающ - ся въ знакахъ выздоравливанія.

Сиольно удобопримъщными ни нажутся сів знани, однано наще всего случается видъть погръщающихъ въ семъ случат людей грубъйшимъ сбразомъ. Сколько бывало такихъ больныхъ, коихъ сме грубъйшимъ сбразомъ. Сколько бывало такихъ больныхъ, коихъ сме грубъйшимъ сбразомъ, и даже умерли, иъ великому удивленію пользовавнихъ! Таковыя погръшности возобновляться булуть дотоль, доноль тоть, кио выдаетъ себя за иблителя, не будеть знать могущества Природы въ пользовании бользней, и только что полагаться будеть на лънарства; доколь онь не увърится, что Врачь не что иное есть, канъ служитель сей бдящей матери (Природы); что ему остается только познавать ея намъренія, исполнять ея повельнія, быть послушнымъ ея наставленіямъ, итти по поназуемому ею пути, и давать требуемую ею пемещь, какъ-то мы о семъ будемъ говорить вскоръ, въ главъ з, прим. 2, и главъ 4, прим. 7 сего Тома.

настолщаго вь здоровленія не бываещь, ежели еще не было перелома. Ежели онъ не въ состояни увъриться о сихъ истиниахъ, те никогда не достигнетъ до свъденія или предузнанія выздоровленія. Въ сам мъ дълъ, оть такого множества лікарствь, одно за другить принятыхъ, безъ порядка, такъ накъ и безъ рэзбора; отъ сихъ вровопусканій, всегда до излищества умноженныхъ; отъ сихъ чистительныхъ, повтораемыхъ стъ начала бользни даже до ионца, возможно ли примътить и раздълить тъ спасительныя движенія употребляемыя Природою для достиженія до нонца своей работы, или ею замышляемыя для произведенія послъдняго усилія, которое должно

едъ

- т) Чтобъ оыздоравливающие вли мало за разъ, но часто.
- 2) Чтобъ они за кушаньемъ употребляли одинъ видъ яство, и чтобъ не часто его перемъняли.
- 3) Чтобъ они хорошенько разжевывали принятое въ ротъ яство твердое.
- 4) Чтобъ уменьшали количество того питья, кое они употребляли во время своей бользни. Вообще лучшее для нихъ питье есть вода съ третьею долею стараго вина.

Великое количество питья вЪ сїю пору препятствуетЪ желудку воспринять свои силы, вредитЪ пище-Гомб II. К ва-

едълать ее послъдовательницею, уставить переломы и привести вы-

По сей - то причинь приключаются толикократные же или что есть и частьйше возвраты бользей, нежели исцылена, при всемы упор-выздорономы сопротивлени, сею же самою Природою противополагаемомы влене посимы скороспынымы, рыянымы, смертоноснымы и нельпымы способамы слы бользей оправлена больныхы оты бользей, оты коихы хотя бы они избыти, ни, лыно только вмысто всякаго оправлена испытываюты иногда чрезы ченной не цылые годы одну слабость и хворость, которая производить то, что одна нрямо по безавлица ихы трогаеть, что сущій пустякы ихы разстроиваеть, и что лынарски строжайте пище употревленіе едва бываеть довольно для содыланія имы сноснымы того состоянія, которае болье походить на бользиь, нежели на зарагіє.

Но ногда оставлены бывають Природь всь сл правы; когда Выздороупотреблены льнарства только ть, кои истично ею поназаны; и вленіе наногда повторены они столько разь, снолько нужда вь томь ею вдох- ходится
нута: тогда бользиь, протекти всь свои поры или періоды, не бывь вь отнопротивоборствуема, доходить до поры присиса или перелома, а боль- шенія съ
ной еще имьеть великую часть силь своихь, такь что бользнетвор- перелоная матерія, порядочно приготовленная, выпоражнивается удобно, момъ въ
скоро, а больной непосредственно вступаеть вь щастливое выздорав- пользованливаніе; потому что сыздоравливаніе всегда зависить оть перелома ныхь по
Когда переломь скорь и легокь, то и сыздоравливаніе легко и ско- правиламъ
ро; а когда переломь трудень, медлителень или несовершень, то Науки бов сыздоравливаніе такое же бываеть.

варению, питаеть слабость, усугубляеть расположение къ опухоли ногь, иногда даже причиняеть внутренную или медленную лихорадку, и повергаеть выздоравливающаго въ томление.

- 5) Чтобъ они, сколько возможно, почаще прогуливались пьшкомъ, въ кареть, или верькомъ, особливо передъ объдомъ: верхховая взда спасительные изъ всъхъ телодвижений; и ть очень худо дълають, кои находясь въ состояни предпринимать его, да презирають. Мы говоримъ брать тълодвижение передъ объдомъ; потому что оно послъ объда помъщало бы пищеварению.
- 6) Чтобъ за ужиномъ мало принимали яствъ: сонъ ихъ отъ того будетъ спокойнъе.
- 7) Чтобъ они дълали движенте, дабы чрезъ то разбить опухоль ногъ, не очень опасную, случающуюся почти послъ всъхъ тяжкихъ бользней.
- 8) Чтобъ употребляли чрезъ каждые двои или трои сутки промывание (клистирб), ежели животъ очень запертъ. Здъсь не то дается знать, что они должны ежедневно ходить къ стулу, но то, что не надобно имъ пробывать двои или трои сутки, не ходивъ къ стулу, дабы избъгнуть запера, которой причинилъбы пучентя, жаръ въ головъ, боль и проч.

Часто попадаются такте выздоравливающе, коихъ нужно прочистить одинъ или два раза для предупреждентя опасности отъ зброда, которой удобно составляется, когда кто встъ много, а орудтя пищеварентя не воспртяли еще всъхъ своихъ силъ. Въ семъ случав легкое протищенте, какъ-то изъ двухъ драхмъ Ялександртйской шелухи (folliculorum senпа) и двухъ унцти или двухъ унцти съ половиною манны (таппе), довольно.

- 9) Ежели въ нихъ еще остается великая слабость; ежели желу доко разстроенъ; ежели время отъ времени приходитъ на нихъ нъкоторое возчувствованіе лихорадки: то пусть принимають одинъ, два, три раза на день по драхмъ хины въ порошкъ; сте лъкарство возстановитъ пищева рентя, возъратитъ силы и прогонитъ лихорадку.
- то) Да опасаются они очень скоро приниматься за свои упражненія; преждевременной трудь есть причиною томительных вользней (у), коих в начало всегда должно выводить от вользни острой, которая как в не была пощажена при выздоравливаніи, то совершенно и не выльчена. В в сію погрытность впадают в почти всь художники и поселяне. Нам в повседневно встрычаются из вних влюди дряблые и неспособные к воспріятію своих в упражненій св прежнею бодростію и дыятельностію; потому что они не хотыли пообождать на нысколько времени послы бользни приниматься за работу: однако же сіє леткое пожертвованіе избавило бы их в от в таковых в немощей.
- 11) Да избъгають они съ величайшимъ стараніемъ нощиаго создуха и росы; о чемъ мы говорили въ Томъ I, гл. 11, § 3, членъ IV).

K 2

ГЛА-

⁽у) Не всякъ чаятельно разумбеть, что должно понимать подъ словомь томительныя волбани. И такъ я за нужное почитаю вразумить читателя, что подъ словомь томительныя волбани разумбется то состояне, въ ноторомъ человъкъ находится, наиначе послъ острыхъ бользней, ни сильно больнымь, ни совершенно здоровымь, а кворымъ. Хворость сію больные часто приписывають лъкарю, говоря, что де лъчиль онь, да не совсъть выльчиль; но сіи упреки не на лъкаря должно обратить, а на самихъ больныхъ: они не наблюли правиль выздоравливанія; оть сего то и слъявлюсь, что хотя они кодить могуть, пищу принимають съ охотою, да всіо имъ жворается. Заворов и кашель обыкновенными бывають ихъ припаднами.

ГЛАВА 3.

О перемежающихся лихорадкахв.

ИзЪ всъхъ лихорадок в перемежающияся подають наиболье благопріятнъйшіе случан примъчать какЪ свойство и знаки сего класса бользней, такъ и дъйствіе лекарство. Нътъ ни одного человька, которой бы не могъ различить перемежающуюся лихорадку ошЪ всякой другой; да и лекарства, къ оной пригодныя, нынъ почти всьмЪ извъстны (1).

Раздъление перемеж ающихся лижорадокъ.

Различные виды перемежающихся лихорадоко получили имя отв различных в пергодовв, въ кои возвращаются приступы: по сей-то причинв нъкоторыя изъ нихъ называющся ежедневными, тридневными, тетверодневными (двойными-тридневными, двойнымитетверодневными и проч), и по годовым временам в, въ кои онъ наиболье пристають, раздъляются еще на весеннія и осеннія лихорадки.

Что разумъется дневную лихорадку?

вжедневного лихорадкого называется, да и должчрезъ еже- но называть ту, въ которой лихорадочной приступб возвращается ежедневно и почти въ тотъже часъ.

- BB

(1) Мы бы желали по же думать и о наших в соотечественниках в; но опыть научаеть нась ежедневно, что слова: перемежающаяся, тридневная, четверодневная суть неизвъстны большой части изъ оныхъ, и до познанія той ликорадви, которою они больны, едва можно достигнуть многократно повторяемыми вопросами.

4mo maное перемежаюшанся лижорадна?

Однако всего удобите спознать перемежающіяся лихорадии, Сіе имя дается тъмъ лихорадиамь, которыя имъють періодическіе возвраты, т. е. которыя, ушедши совство, возвращаются во многіе пріємы, въ одни, въ двои, въ трои сутки и проч. Сіи возвраты называющей приступами. ВЪ промежущит, находящемся отв одного приступа до другаго, больной бываеть совершенно безь ликорадии, и часто нажется наслаждающимся наилучшимъ здравіемъ. Можно догадашься, для чего названы они перемежающимися; они прошивополагающея лихориднъ безпрерывной, о коей говорено будеть въ слъдующей главъ.

Въ три дневной лихора дкв возвращается онъ въ чрезъ трешти день: тогда больной имъетъ одинъ день слоную: бодной; т. е. одинъ день, въ которой совсъмъ не бываетъ лихора дки.

ВЪ сетверо дневной лихора дкв приступо возвращает- чет- ся въ четвертой день, и такъ больной имъетъ два ную: дни свободные.

ВЪ двойной придневной приступо возвращается чрезъ двойкаждой день, такъ какъ въ ежедневной, съ тъмъ раздневную:
личемъ, что онъ бываетъ недолговременнымъ; что
въ иной день бываетъ легчайшимъ, а въ другой тягчайшимъ, и что тотъ часъ, въ которой онъ обратно
приходчть, не тотъ же бываетъ, какъ что первой
приступо отвътствуетъ часомъ и напряженностию
третьему, второй четвертому и проч; иногда
въ двойной-тридневной лихора дкъ приступо возвращается два раза въ тотъ же день, а слъдующий день
остается свободнымъ.

ВЪ двойной - тетверо дневной иногда два приступа чрезъ двойбывають въ одинъ день, а слъдующе два дни остающея свободными; а иногда одинъ приступъ въ каж-ную? дой день чрезъ двои сутки сряду, такъ что третій день остается свободнымъ.

Есть еще такія лихорадки, кои возвращаются въ пятой, шестой, седьмой, осьмой день; кои возвращаются чрезъ каждой мъсяцъ, чрезъ каждой годъ; но онъ весьма ръдки и почитаются за перемежающияся, такъ какъ выще описанныя нами.

Весений я лихора дки сушь тв, кои свирвиствують чрезь весъ февраля мъсяца до конца Іюня, а осений тв, кои сеннія и свиръпствують съ Іюля до Генваря; ихъ существен- хорядки: ные знаки суть ть же. Онъ не собственно различныя бользни; но различныя обстоятельства, ихъ сопровождающия, заслуживають нъкоторое внимание.

Ha

Свойство весенних в лихора- док в.

На примъръ весений лихорадки иногда бываютъ соединены съ расположениемъ къ воспалению, потому что таково тогда бываетъ расположение тъла; и какъ повседневно сте годовое время дълается благоприятнъйшимъ, то онъ обыкновенно вскоръ прекращаются.

Свойство осеннихЪ лихорадокЪ. Осений в лихора дки напрошив в того весьма часто сопровождаются гнилостію; и как в это время день отв дня становится непріятные, то онь бывают упорный тими. Осений в лихора дки тым упорные, чым нозже начинаются; по сей причины Сентябрскія и Октябрскія долговременные или продолжительные Іюльских и Августских в. Когда осень бывает под исход в то эти лихора дки иногда обнаруживаются как в гнилыя, так в что развы чрез в нысколько уже дней оны устанавливаются по приступам в, и переходять вы лихора дки перемежающіяся. Но ныть опасности вы томы, естьми кто обманется, и станет в употреблять пользованіе, назначенное на гнилыя лихора дки.

SI.

Присины перемежающихся лихорадокв.

Перемежающіяся михорадки происходять оть паровь, поднимающихся изъ водь стоячихь и испортивтихся. Сія истинна доказана тьть, что примьчено, что онь наиболье свирьпствують вы дождливыя погоды; что чаще случаются вы странахы, вы коихы грунть земли болотной, какы-то вы Голландіи, вы болотахы Камбриджской провинціи, вы графствы Ессекскомы и проч.

Яства неудобоваримыя, излишнее количество плодовь съ косточками не очень зрълыхъ, пищеупотребление водянистое и непрочное, сырь домовъ, роса, сонъ на влажной землъ, бдънія, трудности пути, огор-

огорчительныя страсти, какЪ-то печаль, сътованіе и проч. могуть также причинить перемежающіяся лихорадки.

Когда нагорные жители приходять для житья на мъста низкія, то ръдко избътають сихь лихорадоко; и когда онъ оть сей причины происходять, то становятся иногда губительными.

Крашко, все то, что можетъ разслабить твердыя, уменьшить испарение, остановить кругообращение жидкостей въ власоподобных сосудцах , т. е. въ малъйшихъ сосудцах втъла, располагаетъ къ перемежающимся лихорадкам .

\$ 2.

Перизнаки перемежающихся лихорадокв.

Перемежающаяся лихорадка вообще начинается признакь, болью въ головь, въ треслахо, въ полсниць, слабостью извъщаю- во всъхъ членахъ, чувствовантемъ холода въ конетно ступъ стяхо, потяготами, позевотами, сопровождаемыми тоскою, тошнотою, и иногда рестою.

За всемъ симъ слъдуетъ озноба, по томъ силь-признанъ ное трясенте или дрожанте; но вскоръ кожа отсыръ-приступа. ваетъ, пото льетъ обильно и оканчиваетъ приступо.

Однако иногда случается, что эта лихорадка пристаеть внезапно въ ту минуту, въ кою больной починаеть себя совершение здоровымъ; не она обыкновенно предвозвъщеется унылостию, потерею аппетита и выпеупомянутыми признаками.

(Признака, особенные означающій сін лихоралки, характеесть цвыть моги, испускаемой больнымь во время присту-ристичепа посль пота сія красновата, кирпитноцевтная, ской или сущет. е. оставляющая на дны судна подовав, которой по-ственной ходить на разбитой и размоченной кирпичь.

ВЪ началъ приступа пульсв скорв, славв и малв, жажда довольно сильная. Во время жара пульсё гораздо сильные, болые и жажда безмырная; тотчась послы ознобы больной чувствуеть жарь сухой, за коимь сльдуеть потв (2).

63.

Пищеупотребление для больных длихора дкого.

Пищеупотребление во время приступа.

Во время приступа больному надобно пишь обильно воды ятной или овсяной, померанцовой сыворотки или жиденькаго настоя ромашковаго. Ежели чувствуеть онь унылость, то пусть принимаеть сыворотки въ виноградномъ винв, поощренномъ посредствомъ лимоннаго сока.

Mamba должиы быть теп-MMM.

Всъ сіи пишія должны бышь шеплыми, дабы пособить чрезъ то выходу пота, и следственно уменьшить напряженность приступа (а).

Яства и жду приещупами.

Между приступами, т. е. въ тъ промежутки, питія ме- вЪ кои лихорадки уходять, надобно больнаго поддерживать яствами питательными, но легкими и удобоваримыми, какЪ - то телячьими или цыплячьими бульюнами, кашитками съ малымъ количествомъ вина, легонь-

КИ-

⁽²⁾ Мы усильно просимъ чишателя, чтобъ онъ, не простираясь далье, прочель и и 2 главы сего Тома, нои, накъ мы уже сназали въ нонпъ предуебдомленія на картину признановь, должны служить введеніємь въ пользованіе каждой бользни. Мы почитаємь чтеніе сихь главъ толь нужнымъ, что за долгъ будемъ почитать отсылать чинашеля во встхъ жестокихъ бользидхъ; и по важности сихъ повтореній, чаятельно, простять намъ.

Лаудавумъ ликвидумъ предиагается какъ могущимъ умвришь приступъ.

⁽а) Замъчено, что дватцать или дватцать пять напель лаудана ликвида сиденгами (laudanum liquidum Sydenbami), данныя больному въ рюмит въ томъ или другомъ изъ сихъ питій, спустя полчаса, нанъ онъ вступилъ въ жаръ приступа, возбуждали потъ, уменьшали длинность припадка, облегчали голову, и оссбеннымъ сбразомъ содъйсивовали нъ выпользованию ликорадам.

кими похлебками и проч: пишье его должно быть растворенное въ водъ вино, подкисленное сокомо лимоннымо или померанцовымо, а иногда и слабинькой пуншо.
Еще же надобно ему пить настои съ горькими растеніями, какъ-то съ цвътами ромашки, полыни или водянаго трилиственника, что просто называють трифолью (trifolium aquaticum). Онъ можеть тогда и во всякое время пить по нъскольку вина винограднаго, настоеннаго съ корнемъ травы стародубки (gentiana),
золототысятникомо (септантит тіпиз), или другою какою
нибудь горькою.

Какъ главный предметь въ пользовани перемежа-выгода ющейся лихорадки долженъ состоять въ томъ, чтобъ отъ умъ-укръпить твердыя и содъйствовать испарению: то боль-реннаго тьюдвиному предпринимать надобно столько тьюдвижения, женія межсколько силы могуть ему позволить. Ежели онъ въ со-ду пристояни вытти, състь на лошадь, прокататься въ кареть, то отъ того выдеть еще большая польза. Ни отъ чего столько не длится перемежающаяся лихораджа, какъ отъ неподвижности, недъйственности и унынія.

Пристойное пищеупотребление, благоразумно пред- Сія лихопринимаемое, почасту выльчиваеть перемежающуюся ли
корадку безь всякаго лькарства. Ежели бользнь не дять безь
худаго своиства, а мьсто, больнымь обитаемое, сухо льнарствь
и хорошо провоздушиваемое: то всегда върно можно
падъяться на успьхь оть одного только пищеупотрепищеупобленія (3).

Jone II.

A

Ho

⁽⁵⁾ Это правда въ разсуждения весенняхь лихорадоль; но не можно сего же сказать въ разсуждения осеннихь, нои весьма долго тянутся, и часто даже до слъдующей весны, ежели оставляются безълбкарствъ, и ежели не лъчатся пристойнымъ образомъ, такъ накъмы всноръ о семъ говорить будемъ.

Когда на- Но ежели силы больнаго кажутся уменьшающимися; добно при- ежели приступы дойдуть до шакого степени жесто- бъгать нь кости, что заставять опасаться о жизни больнаго: то лензре безь замедлентя надобно прибъгнуть къ лекарствамо; однако не надобно иначе къ сему приступать, какъ когда уже бользнь совершенно открылась, т. е. когда больной выдержаль многте приступы (по крайней мъръ три).

\$ 4,

Пользование перемежающихся лихорадокв.

члень 1.

Образ пользования для взрослых.

Первое дёло при пользованіи перемежающейся линачэть со хорадки есть то, чтобь очистить первые пути: порестных слё сего действія не токмо употребленіе лекарство
надежнёе бываеть, но и они сами действительные бывають.

ВЪ сей бользни желу доко обыкновенно заваленъ бываешъ мокротами влакими, и весьма часто случаетел, что больной блюетъ великимъ количествомъ желти. Сти усилтя Природы довольно показываютъ нужду въ рвотныхо; и такъ рвотных суть первыми лекарствами, кои больному лихора дкою надобно предписывать.

Предпочи
мать навствуеть сему показанію: дватцать или тритцать градсбно иненовь сего корня, данных ва разы вы порошкв, для
взрослаго довольно будеть. Пртемы надобно уменьшать
но сразмврности возраста больнаго (4). Когда рвотное

⁽⁴⁾ Сей совъть безъ прекословія весьма мудрь: но пріємь, предлагаемый сочинителемь для взрослаго, можеть показаться слишкомь сильнымь; потому что и плинатицать грановь вообще производять рвоту, а са-

начнеть дъйствовать, то больной должень больше нишь легкаго настоя съ ромашковыми цвъшами.

ВЪ перемежающейся лихорадкв надобно давать рвотное за два или за три часа передъ возвратомъ приступа. Можно его повторять, ежели нужно, на другой день вЪ разсуждении лихорадки ежедневной, а вЪ разсуждении других в перемежающихся лихорадокв, спустя два или три дни.

Реотныя не токмо очищають желу докв, но еще Важноеть возбуждають испарину и умножають всь другія выме-рыстыхь танія. Сін действія делають ихь толь важными, что жающихся 1 2

они ликорад-

мой сильной пріем'в состоить из дватичти грановь. Къ щастію, замъчено, что ть, кои дають его до сорока грановь, не большее оть шого получающь дъйсшые, какъ и шь, коморые дающь шолько по пящнащияти. Причина сего явленія, говорить Г. Венель, весьма проста: нанъ скоро желудочные соми довольно распустили ипекакуанговой смолы для возбужденія реоты, що больной топась баюеть, а остатокь извергаеть. Ежели реота продолжается, не это по тому, что смола распустившись пристала къ сторонамъ желудко и оныя раздражаеть. Нъть ни одного прантина, которой бы не оправдаль истинны сего умствованія. Однако мы почитаемь благоразумные довольствоваться только пятнатцатью или дващатью гранами; ношому чно весьма радко случается, чпоб в инелакуанга не оказала своего дъйствія по сему пріему.

При даваніи ипенанувний въ порошить, и вообще всткъ Канимъ абкарствь въ порошкъ, принимаемыхъ въ накой нибудь жидкости, на- образомъ добно смотрёть, чтобъ она совершенно смешалась съ водою, или давать се? отваромь: на сей конецъ порошокъ опускается на дно рюмки; по томъ на него выливается нъсколько напель воды, и совершенно распускается и растирается пальцомъ или ложечкою; вода еще приливается и лвжарство растирается, пока рюмка будеть полна. Когда больной выпиль сіе лькарство, то надобно ему быть спокойну, пока почувствуеть позывь на рвоту: тогда должно ему давать разь за разомъ по дву или по три рюмки воды или отвара легно-теплаго; послу щого, какъ его въ первой разъ вырвало, должно впорично давать ему по рюмит того же рвожнаго питья чрезъ полчаса, пока не будеть чувствовать позыва на рвоту: послъ сего дается ему бульюнь, только чтобы эта минута по крайней мере эз чась была предв имеющимъ последовать приступомь; помому что поэже больному исть нужды ии въ чемъ.

они часто безъвсякаго аругаго лекарства лечать пере-

Слабитель Слабительныя иногда бывають полезны вы сихы ныя вы лихорадкахо, да часто даже и нужны. Быль примърь, что сильное отищенте выпользовало лихорадку, не устоть по- тупавшую ни хиль, ни другимы лихорадкопрогонятельновными иымо лекарствамо.

Признани, (Наипаче должно прочищать слабительными томоназывающіе
слабительныя во треслахд, безпокойствія и проч: признаки, всегда показывающіе слабительный, въ какихъбы больняхъ и
въ какихъбы больныхъ они ни встрътились.)

Однако же какЪ рвотиыя несравненно лучше пока-Они не зуются въ перемежающихся лихорадкахв, то тистистолько нужны, тельныя или слабительныя становятся менъе нужными, сколько естьли только больной не имветь отвращения къ реотрзошныя. время, въ ны мб. Естьли же имветь отвращение къ симъ послъдное надобнимЪ, то надобно ему очистить себъ кишки вЪ тотЪ но его дадень, въ которой не бываетъ къ нему приступа, или вашь. за семь часовъ предъ приступомо, въ перемежающихся лихорадкахв, посредствомъ одного пріема или двухъ глауберовой соли, ялапа и ревеню, составляемых в слъдующимъ образомъ:

Возьми истолченнаго ялапа дватцать четыре такого яв-грана, отборнаго истолченнаго ресеню драхму. пристойной въ Вскипяти эти двъ вещи въ количествъ воды, сихъ помъщающемся въ рюмкъ, чрезъ нъсколько минутъ; случаяхъ. процъди.

Прибавь глауберовой соли - - двъ драхмы. Сей рецентъ на Латинскомъ языкъ пишется слъдующимъ образомъ (б).

> Recipe jalapæ contusæ, viginti quatuor grana. Rei contusi optimi - - drachmam unam, Adde salis glauberi - - - drachmas duas.

Сте лъкарство выпивается изъ рюмки, и повто-

Жровопускание можеть иногда пригодно быть въ кровопуначаль перемежающейся лихорадки, наиначе когда непомьрной жарь, бредь и проч. подають подозрвние о
воспалении; но какь въ семь видь лихорадоко кровь но въ переръдко бываеть въ воспалительномо состоянии: то и
кровопускание ръдко находится нужнымь; и ежели оно
корадкажьбудеть повторено много разь, то служить къ продолжению только бользни (5).

A 3

Послъ

⁽д) Правда, сочинитель настоить сильно на то, чтобь лъкарскія предписанія, просто называемыя рецептами, пишемы были на отечественномь языкь; но какь сего не вдругь ожидать можно: то я за нужное почель, переведши рецепты сіи на Россійской языкь, написать оные на Латинскомь, дабы, ежели кто по Россійскимъ рецептамь самь не можеть лъкарствь составлять, или ихь не имъсть, то бы, или самь списавь Латинскіе, или давь списать другому, относиль оные для полученія лъкарствь вь Аптеку, изь коей они и отпущены будуть, естьли по себь не опасны.

⁽⁵⁾ Мы просимъ Читателя опять прочитать то, что писано выше Для чего? сего въ главъ 2, въ примъчани 6 и въ тенстъ, и никогда не терять изъ виду, что одни токмо признани, описанные въ концъ 6 примъчанія, должны ръшить на правопуснаніе. Я не могу, говоритъ Г. Клеркъ, не дать знать, что надобно крайнъ быть осторожну въ употребленіи провопуснанія въ перемежающихся лихораднахь: ихъ Его губипричина обыкновенно кроется въ перемежающихся лихораднахь: ихъ Его губипричина обыкновенно кроется въ перемежающихся лихораднахь: ихъ Его губипричина обыкновенно кроется въ перемежающихся лихорадни не слъдствія сопражены съ необыкновенными припаднами. Слабость больнаго, длин- въ сихъ ность лихорадии, раздутіе и водяная больнь обыкновенными быва- лихорадноть послъдствіями сихъ неумъстныхъ провопуснаній.

Время, въ Послъ пристойных выпоражниванти (6) больной которое без всякой опасности может впринимать хину; ее должно надобно ему давать под видом в, которой ему кажетиу; под ся пріятнье. Но никакое пріуготовленіе хины столь наким хорошо не бывает в в перемежающихся лихорадках видом в, и как в под видом видом видом в видом в простьйшим видом видом в разумью, в в по-образом в рошк в.

Возьми наилучшей хины двъ унціи, Истолки въ мълчайшій порошокъ, Раздъли на дватцать четыре равные пріема.

Каждой шакой пріемь должно принимащь вы рюмкъ краснаго вина, или вы чайной чашкь ромашковаго настоя, или вы чайной чашкь овсяной воды, или сдълать изы сихы пріемовы толикое же число болюсово, т. е. катышковы посредствомы довольнаго количества лимоннаго сиропа.

ВЪ лихо. радиъ ежедневной. ВЪ лихорадкв ежедневной, т. е. вЪ которой приступы возвращаются каждой день, больной долженЪ принимать чрезЪ каждые два часа (но не во время приступово, т. е. когда лихорадка мучитъ) по одному изъ вышеозначенныхъ пртемовъ; симъ способомъ можетъ принимать онъ между промежутками приступово но пяти или по шести пртемовъ.

ВЪ пъри-

ВЪ тридневной лихорадкъ довольно принимать но одному такому пріему чрезъ каждые три часа.

ВЪ

⁽б) Т. е. послѣ ростнаго, или славительнаго, или вробопусканія, ежели оно дѣльно поназано. Вообще благоразуміе требуеть, чтобь всегда начинать съ ростнаго, или со славительнаго. Хина тогда дѣйствуеть гораздо съ большею силою. Но когда уже начало употребленіе мины, то надобно остерегаться оть даванія больному ростнаго или славительнаго: сіи выпоражниванія будуть тольно питать бользьь, или се возвратять, ежели она прошла.

ВЪ тетверодневной лихорадкѣ чрезЪ каждые чешыре часа, но всегда не во время приступа (7).

Ежели бы больной не мотъ рышиться принять за въ четверазъ толь большой пртемъ хины, то можно ему разды родневной лить надвое или натрое: тогда надобно ему примимать еги раздылы пртемовъ чрезъ каждой часъ для лихорадки ежедневной, чрезъ каждые два часа для лихорадки тридневной, чрезъ каждые при часа для лихорадки тридневной, чрезъ каждые три часа для лихорадки тетверодневной.

Для молодых в людей потребно гораздо меньшее количество (т. е. отв пятнатцати, дв внатцати и ниже, даже до седьми льтв: мы вскор в увидим в начень П сего параграфа, как в надобно пользовать младенцев возрасту, тълосложенто, жестокости припадков и проч (8):

Жина, употребляемая таким в образом в, как в мы Сколько предписываем в, ръдко не вылычивает в перемежающейся времени надобно лихорадки. Но больному не надобно оставлять упо-принимать треблентя ея вдругв, как в скоро приступы нокажут-хину? ся утедшими; а напротив в того надобно ему упо-треблять ее дотоль, доколь он в будет в из-

ВБ- зование

ветх в сихв

видовъ ли пользование относится но всёмъ видамъ перемежающимся ликорадовъ, должно нои мы исчислили выше сего; поелику, нанъ всё сіи ликорадии субыть теременно суть то же, такъ мы уже сказали, то и требуково жемотъ тъхъ же лекарствъ, однано съ назначенными перемънами.

⁽в) не надобно думать, будто двъ унціи мины, предписываемыя добно приздъсь сочинителемъ, составляли слишномъ велиное качество для нимать по
взрослато. Есть такіе люди, коимъ сего прієма будеть мало, и кои большому
по тому принуждены будуть оной удвоить. Ежели толь часто быва- прієму,
еть неудача въ пользованіи перемежающихся лихородовь, то это ежели жепроисходить оть малыхь пріємовь мины. Люди часто охуждають лательно
лольно по ощибнь употребляющихь егоед-

высить, что больные совсыть вылычена. Часто неудача вы пользовании большей части сихы лихорадокы зависить только оты того, что бельные очень рано перестали употреблять хину. Вообще они ее принимають дотоль, доколь увидять, что приступы прошли; тогда они ее покидають, хотя подвергаются опасности возврата бользни. Оты сего бользны получаеть силы и возвращается часто сы большею жестокость, нежели прежде.

Средство предупреждать возвраты. Единое средство предупреждать возвраты сихъ бользней состоить въ томъ, чтобъ, какъ пройдутъ припадки, продолжать чрезъ нъкоторое время употребление хины по малому приему.

Таковъ есть надежный и дыйствительный и способъ лычить перемежающимся лихорадки.

Во время употребленія хины можно пить слъду-

Горьной настой, ноторой должно пить во время употребленія жины. Возьми корня стародубки — унціго одну; Яроматитескаго каламуса; Померанцовой корки — В по полуунцій, Ромашковых двітово три или теты ре щепоти, Сімени кишнеца — одну щепоть.

Ежели кому угодно получить изъ Аптеки сіи спеціи, то можеть написать Латинскими словами сльдующій билетець:

Recipe: radicis gentianæ - - - unciam unam,

Calami aromatici ana unciam femis,

Corticis aurantiorum ana unciam femis,

Florum chamomillæ - - tres aut quatuor pugillos,

Seminis coriandri - - pugillum vnum.

Истолки слегка все это въ иготи; возьми полщепоти всъхъ сихъ ингредјенцій; положи въ чайникъ, настоится какЪ чай).

Чайная чашка сего настоя, выпиваемая по три или по четыре раза на день, укръпить желудоко и особеннымь образомь ускорить вылъчентемь.

Какъ нъкоторые больные не могуть стерпъть мастовой, сдъланныхъ изъ воды: то для нихъ надобно ихъ дълать изъ вина, полагая для настоянія двъ щепоти сихъ спецій въ два фунта бълаго вина на четыре или пять дней; сего вина имъ должно пить два или три раза въ день по рюмкъ.

Ежели больной обильно будеть нишь водянаго вышеписаннаго, или виннаго иастол, теперь описаннато: то ему не столь великое количество нужно будеть хины для достижентя до исцълентя (b).

Toma II.

M

Люди,

⁽b) Можно не безб основанія лумать, что великое мложество наших могія растеній или корокь горькихь и внательныхь удачны бы были вь туземных пользованіи перемежающихся лихорадовь, а особливо когда бы соеди-растенія нены были сь влаговонными растеніями. Но накъ жила съ давняго могли бы гремени призтана совственнодбиствующимь противу сихь бользией, выльчим накъ приписуемое ей достоинство или сила по всьмь отношеніямь вать пересправедлива; що мы не столько прибытаемь къ другимь лькарствамь, межающія-Однако мы не можемь утинть, что жила часто поддыльнается, и ся лихочто надобно употребить великую разборчивость для распознанія ложрадки, ной оть истинаю. Я помещаю сіе примьчаніе для того, чтобь имбющіе нужду въ сей коркь осторожны были противь торгующихь оною (9).

⁽⁹⁾ По симъ - то весьма важнымъ причинамъ, а особливо относительно иъ поселянамъ, которые едва могутъ доставить себъ обыкновеннъйшіл надосья, да и туть всегда поддъланныя или испорченимя, покажемъ мы теперь находящіяся у насъ растенія, которыя, булуши превосходными лиморадиопрогонятельными, могутъ заступить мъсто мины всякой разъ, когда можно сомнъваться о добротъ сей послъдней корки, или когда достатокъ не позволлеть оную получить.

Другой Люди, немогущёе глотать хину въ самомъ ен веепособъ ществъ, т. е. въ порошкъ, должны оную принимать предписывать хину. въ настов, или въ отваръ. Настой дълается слъдующимъ образомъ:

Возь-

Канія суть сін растенія? Три рода нв в пособъ употреблять нор-

Сіи расшенія сушь: і) ветла, верка и ива; 2) каштанникъ съ большими каштанами; 3) калина; 4) ясень; 5) тернь или терновникъ.

1) Хотя всь виды мев, нажется, имъють ть же свойства; однако надобно довольствоваться вышеисчисленными, какъ такими, коихъ силы опытомъ дознаны.

Давно уже дъланы были опышы надъ ивовою корною въ перемежающимся ликорадкакъ, и сіи попышки не оставались безь успеха. Но съ
достовърностію утвердить пользу оной предоставлено было Г. Косту, Лъкарю военныхъ Королевскихъ гофшпиталей и проч. и Г. Вильману, Аптекарю, Нансійскому Демонстратору Химіи и проч. Вотъ
накъ они изъясняются въ нъкоторомъ увънчанномъ отъ ліонской Академіи 1776 года сочиненіи, подъ названіемъ: Еffais Botaniques, Chymiques & pharmaceuriques fur quelques plantes indigenes, fubstitudes avec fuccès à
des v getaux exoriques, & cet. т. е. Ботаническіе, Химическіе и лъчебные опыты о нъкоторыхъ у насъ растушихъ растеніяхъ, съ пользою употребленныхъ вмъсто иностранныхъ растеній и проч-

"Мы давали въ перемежающихся лихарадкахъ ивовой норки, "мълко намълко истолченной, по драхмъ, черезъ четыре часа въ "легкомъ разводъ лофея. Сте лъпарство весьма ръдко не оказывало "своего лъйствія, а наиначе ногда пріуготовляли мы больныхъ къ "прочищенные напередъ молочаемъ (rithymalus), принали во время "промежутка, продолжавшагося отъ четвертиго до плито приступа, "по шести драхмъ сей же самой норки въ такомъ же разводъ пофея. "У двухъ изъ нахъ прито приступа не было; а двухъ другихъ "котя и быль, но только гораздо легче. Они приняли еще ея по "полуущи въ промежутит отъ пятаго и шестаго приступа, кото-"раго не было, и мы совершенно увърены о коренномъ отъ нее исцъ-"леніи, безъ возврата и безъ припадка.,

Ивовая корка, предписанная вышеупомянушым образом , применж глазах выльчила четверодневную ликорадку, бывшую у одной пожилой женщины св шесть меслиов ; ликорадку ея сынальть девяти или десяти, ведшуюся у него споль же давно; и еще ликорадку у одной брюхатой женщины, которая седьмаго приступа не видала.

Возьми наилучшей хипы вЪ порошкѣ упцёю; положи вЪ два фунта бѣлаго вина; пусть настаивается чрезЪ четыре или пять дней, во время которыхЪ почаще взбалтывай трясеніемЪ бутылку; слеи влажность.

M 2

Сего

2) Большой каштанникь, т. е. съ большими наштанами, Большой столь нынь учинившійся извъстнымь по производимой имь красоть въ на- наштаншихь садахь, даеть корку, которая, по увъренію многихь Брачей, при- никь: споводимыхь въ упомянутомъ сочиненіи, не менье сильна противь пересобъ употмежающимся ликорадокь, какь и кина. Сія корка дается по пріему реблять въ двъ драхмы, истолченная и настоенная въ четырехь унціяхь въ его. водь клагословеннаго волчца, передь приступомь; или въ отварь сльдующимь образомь:

Возьми норки тольшаго каштанника, крупно Истолченной - - - унцію, Солодковаго корня молкаго - - щепоть;

Вари сію норну въ двужъ функтахъ воды, пона останется только претья доля; прибавь въ нонцъ солодку; процъди все-

Сей отварь выпивается въ четырехъ рюмкахъ, чрезъ четыре часа внъ приступа. Ежели это пите противно, то надобно давать эту же самую корку слъдующимъ образомъ:

Возьми корки кольшаго каштанника, въ весьма мблкой порошокъ истолченной - - - унцію, Дикаго аврана пріуготовленнаго - - сорокъ восемь грановь, Постоянной соли зиччьяго корня - - дражму, Сиропа персыковыхъ цебтовъ, сколько и требно, для составленія изъ всего опіата.

По Латынъ:

Recipe corticis hippocastani, in puluerem subtilissimum

Contusse - - - - unciam,

Gratiolæ præparatæ - - quadraginta octo grana,

Salis sixi asari - - - drachmam,

Syrusi storum pers. quantum sussicit ad constituendum electuarium.

Больной долженъ принимать сего состава величиною съ мушкатной оръхъ, завернутате въ кусочкъ бълаге хлъба, чрезъ три часа, выпивая наверьхъ по станану настоя съ дикимъ цикореемъ.

"Одиннат учть фабрикантовь, различных в льть и твло-"сложеній, говорять Кость и Вильмань, выльчены были оть лих ра-"докь тридневных и четверодневных посредством сей корки, "нотоСего настоя выпивается по четыре рюмки въ день, болье или менье, по напряженности лихорадки, но всегда въ бывающе между приступали промежутки.

ВотЪ

"которую они принимали почти по такому же количеству, по ка-"кому дается жина. Они выльчились безъ возврата бользни въ во-"семь или десять дней, считая съ того дня, съ ноего начали они "употреблять сте лъкарство."

КалиниякЪ: способЪ употреблять егоноркуз) Тому прошло около двашцати льть, какь корка калининка извъстна стала въ Лошарингіи по свойствамь своимь, сходнымь съ жиною. Калининовой норки дается пріємь въ одну драхму въ порошит; или ежели этоть порошокь противень, то дълаєтся электуарій слёдующимь образомь:

> Возьми калиниковой корки, истолченной Весьма въ мёлкой порошекь, унцію, Нашатыря - - дражму, Сиропа изъ калиновыхъ цвётовъ, или, но недостатку его, полыннаго сиропа, довольное количество для составленія Электурія.

Болькой долженъ принимать сіе вещество по величинъ мушкатнаго оръха внъ приступа, а наверькъ онаго вскоръ пить по рюмкъ декокта, сдъланнаго изъ дражмы той же корки, изръзанной въ мълніе кусочки, да еще изъ солодки.

Вышеупомянущой рецепть на Латинскомъ язынь пишется сль-

Recipe corticis cerasi sylvestris, linnæo pruni padi, in pulverem tenuissimum
Contusæ - - - unciam unam,
Salis ammoniaci - - drachmum,
Surupi, storum cerasi sylvestris, aut,
Si d sit, sirupi absyntii, quantum
Susti it ad conficiendum electuarium.

Три тридневныя ликорадии, одна четверодневная, одна ежедневная и одна двойная-тридневная выхъчены были согершенно, безъ возврата и безъ всякаго другаго нещаетнаго случия.

Ясень: способь упошреблять его корку. 4) Корна ясеня уже названа была Европейскою жиною от В Гельвига, Медицины Профессора вы Грипевальцы, вы изданной 1712 года запискы. Корка сія дается вы пріемы лвукы дражы, недавно истоличенная вы мынкой порошокы, вы чайной чашечкы декоята най изы ясенныхы листовы, подслащеннаго небольшимы количествомы сажара или меда. Сей пріемы повтораєтся чрезы каждые четыре часа вы продолжени трехы дней, вны приступа. По томы больной принимаеть

Вошь какимь образомь готовится декокть, т. отварь водяной м е. по Руски отвара: винной.

Возьми наилучшей истолченной хины унцію, Корня виргинійской серпентаріи, у каждой по двъ **У** драхмы. Полынной соли

Вари это все въ двухъ фунтахъ воды, пока останется одинъ только фунть; пропъди; прибавь равное количество краснаго вина: сего отвара принимается часто по рюмкъ въ течени дня.

M 3

ВЪ

маеть сего явкарства только по два раза въ день, т. е. поутру и въ пяшь часовъ повечеру въ шечение шрехъ или четырехъ только дней.

" Жы принуждены признаться, говорять Гг. Кость и Виль-, манъ, что изъ двънатцати больныхъ, сте лъкарство употребляв-,, шихъ, были только четыре страдавшие ликорадною четверодневною, э, моихъ мы не вылъчили посредствомъ его, хотя умножили обычно-, везное количество болбе, нежели третьею долею, и настояли на у, употребление его болье мьсяца. Для двочив мы прибыти нь жинь. э, коихъ она весьма хорошо выпользовала. Третій выльчился коркою тер-, новника, а четвертой умерь оть водяной волбани въ концъ чет-"вершаго мвсяца.,

(5) Наконецъ терновникъ дзетъ корку, которая полезчоство не уступаеть вышеупомянутымъ нами. Она вылъчила двъ тридневныя лико-Терчоврадии, въ ноихъ шестаго приступа не было; одну ежедневную лико- нинъ: спорадку, и одного больного, которого не выльчила ясенияя корка, какъ собъ предто выше сназано.

Она дается въ пріемъ двухъ драхмъ въ деконтв, на примъръ его норку. въ кофев, и повторлется по два раза въ день; наи по драхмя съ половиною весьма въ мёлкомъ порошкъ распускается въ етоловой хочив настоя съ тернования цветимя, и длетоя эт получен предъ приступомь; или наконець по одной дражив вы порошив подъ образомь пилюль, дължемых в съ помощию небольшаго количества сиропа, или меда, чрезъ шесть часовь.

Сіл-то суть забев растущія растенія, кон опытом в дозна- Сін различны ликораднопрогонпшельными, могущими заменить жану. Колико ныя корки сіе отпришіе важно! потому что, какъ-то замьчаеть г. Бухань, надобно да и въ таблиц в повторается, весьма трудно подъ словомъ мана най- употребта хорошую жину; а хорошая жина продается толь высокою цётою, я ть то. что бъдные при у клены безъ оной обходиться, или покинуть ея гда, когда употребление прежде времени и почти всегда прежде совершеннаго вы- не можно им вша хиздоровленія!

что должно прибавишь кЪ жинъ во время упорныхЪ перемежающихся лихорадокЪ?

ВЪ пользовании упорныхъ перемежающихся лихотадок в хина двиствительные булеть, ежели къ ней прибавлены будушь крвпительныя, нежели когда бы она одна только принимаема была; что часто я имълЪ случай примъчать въ такой землъ, въ которой сіи лихорадки наболье свиръпствують. Хина ръдко была въ ней дъйствительною, ежели не соединена была съ корнемъ виргинийской серпентарии, инбиремв, былою корицею, или другимъ какимъ ароматическимъ растеніемЪ.

Когда приступы бывають весьма часты и весьма еильны, то лихорадка часто походить на состояние воспалительное: вЪ семЪ случав и приличнъе и безопаенъе давать вмъсто инбиря соли виннаго камня (falis tartari). Но вълихорадках в триднесных в, тетееродневных упорных в, пристающих в в осени и в в началь зимы, вещества горячія и крепительных бывають необходимо нужными (с):

КакЪ

ны, или она и есшь, да только худа.

(с) ВЪ сихъ видахъ упорныхъ ликорадовь для пожилыхъ людей, темперамента флегматического, а особливо когда погода дождливая, когда домы монры или сыры, и во всякомъ другомъ подобномъ обстоятельству, нужно присоединить къ двумъ унціямъ жины полунцію виргинійской серпентаріи и двъ дражмы инвирю, или другаго наного ароматического вещества. Но когда признаки извявляють лихорадку свойства соспалительнаго, то надобно смъщать съ хиною вмъсто встхъ сихъ веществъ полунцію полынной соли (salis absynthii) или соли виннаго камия (falis tartari) (10).

добчо присоединать другія лькарства къ хинъ. Что надобно шогда дълапъ,

Ръдне на- (10) Вообще вст вещества, присовокупляемыя ив жинт, ослабляють лихораднопрогонятельную ея сику; и такъ нодобно внимательно разсматривать от в случаи, въ ноихъ Г. Буханъ совътуетъ присоединять ее ив првимельнымь, ив умбрятельнымь: въ сихъ польно однихъ случанкъ позволищельно сіе совокупленіе жины съ другими веществами.

Примъшимъ здъсь мимоходомъ, что иногда первой пріемъ, или первые пріемы жины слабять: туть ньть ничего худяго; однано ежели она въ то время, въ ное слабить, не останавливаеть ликорадви, то должно почитать сін пріємы въ семь случат пропащими. То-

КакЪ осения и зимня лихорадки вообще упор-внимание. ите бывають весенних и летних, какв-то и выше каковое сего сказано: то по сему нужно продолжать должайшее время упошребление лъкарсшвъ въ первыхъ, не-осеннихъ жели вЪ последнихЪ. Тъ, кои выдержали перемежаю-михораящуюся лихорадку вЪ началъ зимы, должны, а наиначе кахъ. когда погода бываеть дождливая, для предупреждентя возврата, принимать по маленькому пріему хины до весны, хошябы бользнь казалась совсьмЪ пропавшею; должны также избътать сыраго воздуха, наппаче когда дують холодные выпры восточные.

Когда перемежающияся лихорадки не совершенно вользян, выльчены, то перераждаются часто въ продолжитель- въ кои ныя упорныя бользни, каковы сушь водяная бользив, перераж. желтуха и проч: почему надобно употреблять всё кудовых ввозможныя средства для совершеннаго опых в искоре-ченныя пененія, прежде нежели соки повредящся и твлосложеніе ремежающілся лисовсъмЪ испоршится. жорадки.

Хотя нать простае и основательные того спо- смышное соба пользовань перемежающияся лихорадки, которой яюденое иы предложили выше: однако по непонятной стран-мивне въ ности люди повседневно унотребляють вы сихы наи- на польпаче бользняхь, нежели въ другихъ, средства таин-зованія ственнъйшія, нельпьйшія. Ньть старухи, которая бы сихь боне знала какого нибудь секрета на пользование перемежающихся лихорадокв; а простаки охотно тому въряшь. Больные съ радостію оказывають довърен-

носшь

гда: на добно давать другіе, нои бы перестали слабить и нои бы оста- носда жина: навливали приступы. Ежели понось всто продолжиется, по надоб о слабить, на день ошложить жину, и дать въ тоть день драхму резеки въ или припорошев, или въ катышкв, или въ настов, или въ декоктв, а по чиниетъ томъ приняться опять за жину; ежели и тогда булетъ продолжать- поносъся понось, що надобно съ каждымъ пріемомъ жины прам'яшланы пятнатулть или дватулть грановъ теріака, пона поновъ уймется.

ность ко всъмЪ людямЪ, объщающимЪ скоропостижное выльчение; но вЪ пользовании бользней кратсайший путь не всегда бываето лугшимо.

Единственный способъ къ достиженію до извъственный стнаго и прочнаго выпользованія состоить въ томъ, епособь чтобъ постепенно помогать Природъ въ употреблястользовать мыхъ ею средствахъ для изгнанія и для истребленія бользовать причины причины причины причины бользовать причины п

Опасности

ВЪ самомЪ дълъ нъкоторые покущаются на опыотъ употребленія
праводнія себя от в перемежающихся лихорадокЗ, какънапитковъ то напиваются кръпкихЗ напитковЗ, опускаются въръвъ намъреку и проч: таковыя средства, правда, могутъ иногда
ніи вылъчить еебя
удасться; но они всегда остаются опасными, да могутъ
отъ пере-

щихся лихорадокъ. Природа или натура исц вляетъ цълыя шри четверти болъзней. Что должно разумъть подъ словомъ болъзнь?

межаю-

Авкарства не иначе надобно предписывать, какв по показанію Природы-

(11) И такъ никогда не надобно выпускать изъ виду сей истинны, что Натура производить три четверти дъла въ цълени мносихъ бользней. Добрые Врачи въ томъ согласны съ Иппекратомъ. Бользны не иное что есть, накъ необходимое послёдстве Попроды, дъйствующей на тъло, коего орудія находятся въ страданіи. Устройство человъческаго тъла такъ мулро расположено, что зависящія ств того движенія пособляють безпорядку, выгоняя вредные соки изъ центра къ поверьхности частными и сбщими путями. Morbus est сопате Natura, qua materia morbisia exterminationem, in agris samo molitur. Бользнь есть усиліе природы, старающейся изгнать бользнетворную матерію изъ вольныхъ на поть нонець, чтобь имь спасти. Изъ сего надобно заключить, что во многихъ случаяхъ знавіе находящихся при больныхъ и ихъ пользующихъ должно паче состоять въ мудромъ смотръ, нежели въ сямомъ дъйстви.

И такъ не иначе надобно пускать кровь, не иначе давать реотное, потовое и проч. какъ когда Природа поластъ явные знани, что
она устремляетъ свои усилія нъ произведенію сихъ выпоражниваній;
потому что лькарства по приличному только употребленію опыхъ
бывають полезными; ежели они не умъста, не ко времени прилагающея,
то дълаются причиною бользней. Сіи знаки называются признанами,
кои нами описаны въ печеніи сего Тома, накъ то въ разсужденіи
кровопусканія выше сего въ главь 2 въ нонць 6 замьчанія; въ
разсужденіи пота въ главь 2, въ примьчаніи 7; въ разсужденіи
славительныхь въ главь 3; въ разсужденіи реотнымь, здъсь внизу, въ главь 4, въ примьчаніи 7 при конць.

савлаться и пагубными, а наипаче когда в В больном В есть воспаление, или можно подозръвать, что есть. Я помию одного только больнаго, на моихъ рукахъ бывшаго, но погубившаго самаго себя явно шемъ, что напивался крвпких в напитково, въря словамъ нъкоторыхъ, что это есть неизмънное средство.

Есть некоторые отвратительные предметы, ОтвратикакЪ- то паутина, огарки свёть и проч, кои прослав- тельные аяющся за чудодъйственные въпользовании сихъбольз-предлагаеней. Хошя они и могуть иногда имъть сію выгоду; но при-мые вивсто чиняемое ими отвращение должно вообще довольною явкарствы быть причиною къ отвержению оныхъ, а особливо ко- бользнакъ. гда есть лекарства не столь омерзительныя, да и неложивишія.

Единое авкарство, которое можно почесть за хина есть собственно двиствующее, могущее совершенно выльчить настоящее сін виды лихорадокв, есть хина. Она всегда благона- нодъйдежна, безопасна, и я могу по исшиннъ увъришь, что ствующее я въ моей практикъ никогда не видалъ ее измъняю- въ перещею, когда она предписываема была съ нужными пред- щихся лиосторожностями, и принимаема чрезъ приличное вре- хорганахъ-MA (12).

Jomo II.

H

ЧЛЕНЪ

⁽¹²⁾ Хина, говоришъ Г. Тиссотъ, есть единое надежное и безвредное Предразво встхъ перемежающимся ликорадиамъ лекарство : вст прочія лекар- сужденіе етва, исключая исчисленныя въ примъчании сея главы, не должны простаго иначе почишаемы бышь, какъ помогашельными, кошорыя одни не вы- народа о лечить сихъ ликорадонь, ежели оне сущь свойства таковаго, что жинв. пребують авкарствь. Люди напосны были въ разсуждени еего противными мабніями: они думали, что жина портить желудовь; но она не токмо не портить желудка, но есть наилучшее въ свъть локарство въ возетановлению и укръплению его. Думали также, что она оставляна завалы или засоренія; что доводила до водяной волбяни; не мынь энають, что сін бользии одолжены бытіемь своимь долговременности лихорадии, и что жина ихъ исцаляеть, когла произошли онв от того, что ее не употребляли: кратко, когда ликорадна только одил, то жина производная всегда и будеть производить все возмож-MOE 6 ARTO.

члень п.

Способб пользовать младенцевб страждущих перемежающимися лихорадками.

ВЪ техъ земляхъ, въ коихъ перемежающияся лихорадки сушь тународныя, и иладенцы часто страждуть оными. Весьма трудно выльчивать сихь былнячковъ; потому что трудно дойти до того, чтобъ дашь имъ хину, или другое какое лекарство, которое они находять всегда непріятнымь.

Средство делать сте лекарство для нихъ сно-СпособЪ давать жи- снейшимъ состоить въ томъ, чтобъ имъ его давать ну младенвъ смъси перегнанной воды и сиропа (in mixtura aquæ Hamb. distillate & syrupi); а чтобъ оно было еще пріятньйшимЪ, то прибавить вЪ оную нѣсколько капель эликсира или купороснаго спирта (elixirii aut spiritus vitrioli): и то и другое средство улучшають лекарство и отнимають у него противной вкусь (13).

Ежели

прогонятельная минстура, приличная младенцамъ.

Ликорадно. (15) жину можно им в предписывать следующим в образом в: Возьми перегнанной мятной воды - - - двв унціи, Лимоннаго сиропа - - - - унцію, Наилучшей жины въ порошит - - драхму. По Лашынъ:

> Recipe aqua menta distillata - - vncias duas, Syrupi limonum - - - - vnciam . Optimæ chinæ - - - - drachmam-

Положи жину въ ступку, или въ другое накое судно; налей нъсколько напель енропа; смъщай хорошенько пестикомъ или ложною; прибавляй мало помалу оставшагося спропа, всегда мъщая; вылей наверых в сего мятную воду для составленія смоси, въ Аптекахъ называемой минетурою (тіхгига): сей смвся должно давать младенцамъ по кофейной ложечий чрезъ наждой часъ.

Можно, какъ говоритъ Г. Буханъ, прибавить туда же нъеколько напель купоросного спирта (spiritus vitrioli); но въ разсужденін сего последняго вещества надобно быть весьма осторожнымь: трехь ман чешырекъ капель довольно на всю вію микстуру.

Keras

Ежели не можно достать хины и дать оную Соляную жладенцу, то выбото оной хорошо давать соленой смв- минетуеи (mixturæ falinæ).

Сыворотка въ винь есть особенно приличное питье. интье страждущимъ перемежающимися лихорадками младенцамъ. Можно туда же прибавить кофейную ложечку спирта оленьяго рога (fpiritus cornu cervi) на полфунта сей сыворотки.

Не надобно опускать и того, чтобъ младенцамътълодиидоставлять тело движенте, которое можеть для нихъжение. быть весьма полезнымъ.

Ежели лихорадка становится упорною, то надо-воздухъ в бно перенести младенца на воздухъ сущайтй и теп-яства. льйшій, а яства давать питательныя и иногда немнож-ко суна.

Тымы младенцамы, которые не могуты глотать промывахины, или коихы желудочекы не можеть оной тер-ніе изы пыть, надобно ее давать вы промываніи (вы клистиры). жины для воть способы, по которому Докторы Линды пріуготовляєть сте промываніе для взрослаго:

Возьми экстракта хины - - полунцій; Разведи ее въ чешырежь унціякь горячей воды; Прибавь масла сладкаго миндаля - - полунцій, Яиквида лаудана - - шесть или восемь капель.

По Лашынь:

Recipe extracti chinæ - - - vnciam semis;
Dilue in vnciis quatuor aquæ tepidæ;
Adde olei amygdalarum dulcium vnciam semis,
Laudani liquidi sex vel octo guttas.

H 2

Cře

Когда младенецъ всю се употребить, то нодобно савлать другую, а послъ сей третью, и даже четвертую, естьли нужно. Должно знать, что сего лъхарства не ниче должно давать, изкъ по прочищени его славительнымь или реотнымь, ежели у младенца есть признави, показующие сін выпоражниванія: но ниногда не надобно ему да-

Сте промыванте повторяется чрезъ каждые четыре часа, болье или менье, какъ лихорадка того потребуеть.

Что касается до младенцевъ, то надобно уба-AAR MARденцевъ. вить пріємь экстракта хины и лаудана по сразміврности ихъ возраста и силъ.

Другія гредства айчишь младенвевъ, больныхЪ неремеся лихораднами.

Нъкоторые младенцы были выпользованы сще и тъмъ, что на нихъ надъвали поясы или черезы, наполненные хиною; другіе тъмЪ, что ихЪ мыли кръпкимъ декоктомб изъ хины и спинки ихъ натирали кръпкими спиртны ни напишками, или микстурого состоящею изъ равныхъ частей лаудана ликвида, да жающими- мыльной мази.

> (Смотри способЪ пользовать выздоравливающихЪ больных в в в з предыдущей главы).

6 5.

Не надобно самаго себя летить еб перемежающихся лихорадкахв, когда опъ непорядосны, или соединены св опасными признаками.

Мы тымь болье распространились о перемежающихся лихорадкахв, что онв весьма часто случаются, и что мало больных в сими бользнями призывають Лькарей, по крайнъй мъръ, естьли они не потеряли всей надежды выльчишься собою.

Однако есть случаи, въ коихъ сін лихорадки бывають весьма непорядочны, будучи перспутаны съ другими бользнями, или сопровождаемы признаками, которые делають ихъ весьма опасными и трудными на вывъданте. Мы о нихъ умолчали, но съ намърентемЪ;

давать сего явнарства во время приступовь; а когда минеть лихорадка, то продолжать употребление его трезъ многие дия, но шакъ, чтобъ сперва давать чрезъ наждые два часа, по томъ чрезъ наждые шри, наконецъ чрезъ каждые чешыре.

емЪ; потому что иначе бы большая часть читателей пришла бы вЪ сбивчивость.

Когда бользнь бываеть совсыть непорядочною, а признаки ся суть опасны, то не для чего мышкать: больному надобно тотчась призвать Лыкаря и всего себя предать его наставленію.

\$ 6.

Средства предупреждать перемежающіяся лихорадки. Предокра-

Средство предохранять себя от перемежающих- авнарства ся лихорадоко состоить вы томы, чтобы не подвер. от перетаться причинамы, могущимы оныя произвести. Мы межающихся ли исчислили выше сего вы главь 3, у и сти причины; мы хорадскы позволимы только себы прибавить предписанте предохранительного лыкорства, коимы живуще вы мыстахы мокрыхы, болотныхы, нездоровыхы, или уже испытавте ныкоторыя нападентя сихы лихорадоко, должных пользоваться.

Возьми наилучшей хины - - унцію, Кория виргинійской серпентаріи з по полу-Померанцовой корки - - - з унцін.

По Лапынь:

Recipe optimæ chinæ - - - vnciam,

Radicis serpentariæ virginianæ } ana vnciam semis.

Corticis aurantiorum - -

Истолки все это вмѣстѣ, и настаивай чрезъ пять или шесть дней въ двухъ фунтахъ содки обыкновенной, или въ межжевеловой Голландской водкѣ, или въ другомъ какомъ напиткѣ крѣпкомъ; слей жидкость потихоньку; употребляй ее по двѣ или по три рюмки въ день.

Я знаю, что иные будуть меня обвинять вы томь, что я предписываю водку; но горькія вещества разрушають большею частію пагубных дъйствія сихь Н 3 видовь

видовъ напитково. Тъ, кои не имъютъ, или не котятъ употреблять водки, могутъ сдълать сей настой въ винъ. (Весьма справедливо, что настой хины въ водке или въ винномо спирть можетъ быть приличнымъ мялому только числу людей. Вообще, гораздо лучте дълать настой просто въ виноградномъ винъ.) А люди, могуще привыкнуть къ жеванію хины, найдутъ, что сія практика весьма удачлива.

Можно также поперемённо и съ тёмъже намёреніемъ жевать корня стародубки (gentianæ), или ароматитескаго каламуса (саваті aromatici) и проч. Всё вещества горькія, наипаче же горячія и вязательныя, кажутся быть антидотами противъ перемежающихся лихорадоко (14).

5 7-

Везпреетанное употребленіе тьхь же **ж**вкаремвЪ не производить никакихъ дъйствій: и макъ **ж**адобно вкъ перемвняшь, жогда при-**Кашоными** витето ирелохра» нительиыхъ, да и въ про-AOAKHтельныхъ

бользыяхь.

(14) Подаваемый Г. Буханомъ совыть перемынымь сін предокранительныя лонорства есть весьма мудрь. Непрерывное употребленіе одного того же лонорства не тонмо причиняеть нь оному ствращеніе, но еще привычна нь оному дълаеть дъйствія его не столь примытными, а часто и нинаними. Сіе видно повседневно вы бользняхь долговременныхь, извыстныхь поды именемь хроническихь, т. е. продолжительныхь: и такь надобно жевать хины и горькихь веществь, или поперемыно употреблять два имь предлагаемые настоя; даже можно, гладя по обстоятельетвамь, ихь употреблять, наи еще простыйшій, на примыть сей:

Возьми наилучшей жины въ порошив унцію; настанвай онув на холодъ чрезъ шесть или восемь дней въ двухъ фунтахъ вълаго емна; слей потихоньку, храни для употребленія; или сложнъйшій: какъ-то сей:

Возьми нория аромапическаго каламуса дав унців,

Лиснъевъ золотопысячника - гороть, желбзиых опилиовъ, не изъ ржаваго желбза - - деб унц. Насіпливай это на холодъ чрезь столько же времени въ четырехъ фунтахъ вблаго вина.

Ежели и по захочеть саблать сего настоя поскорые, то можне восшавить судно съ онымъ на горачій пепель или на песочную ва-

\$ 7.

Періодитескія, т. е. во извъстное время возвращающіяся бользии, кои требуюто такого же пользованія, какого перемежающіяся лихорадки.

(Пользованіе, выше сего описанное для перемежающихся лихорадоко, прилично еще для некоторых в періодитескихо бользней, возвращающихся вы обыкновенные дни, или часы. Изы числа сихы бользней наипаче суть: сильныя головныя боли, непомерныя боли зубово, реота, тажесть во груди, жестокія колики, трепетанія сердца, неслыханныя боли вы глазу, вы рёснице, вы брови и виске того же бока сы краснотою и слезотеченіемы и проч.

Примътно, что сіи бользни начинаются весьма порядочно въ извъстной часъ, продолжаются почти столько же времени, сколько приступо перемежающейся лихорадки, и оканчиваются безъ примътнаго выпоражниванія; а по томъ на другой день или на третій возвращаются точно въ тоть же часъ; потому что дознано, что онъ слъдують почти всегда поряд-

ку

ню на сушки. Но примъчено, что настой на колодъ столько же вби- Винные раль въ себя извлеченныхъ началь, сколько и на огнъ, и что въ или съ вивиныхъ настояхъ, огонь, дъйствуя на жидкость, вынималь силу номъ на- оныхъ, заквашиваль и располагаль къ мислому мисенію.

стои дол-

Кромъ сихъ есть еще и другія средства, ноими должны поль- жны назоваться живущіе люди въ мъстахь, въ ноихъ свойство воздуха стаиватьпроизводить часто сіи лихорадки. А имянно, танъ говорить Г. Тис. ся на хосоть: часто нурить въ понояхъ, а наипаче въ спальняхъ нанія нибудь лодъароматичеснія травы или дерева, жевать наждой день межжевеловыя Другія
ягоды, и употреблять вмъсто питья занвашенной съ сими же самыми средства,
ягодами настой: сіи два средства весьма дъйствительны нъ поправле- ноими доль
нію ослабшихъ желудковъ, нъ предупреждечію заваловъ и нъ содъй- жны польетвію испаренія. Канъ вышеупоманутыя причины весьма упорно пизоваться
таютъ сін лихорадки, то ни что танъ дъйствительно не предохра- подверженнитъ отъ оныхъ, накъ сін пособія, ноя толь дегки и толь мало- ные перевтоющи.

ку лихорадокв еже дневных в или три дневныхв, а ръже того лихорадоко тетверодневныхо.

Во время приступа ничто не помогаеть, и одна токмо хина можетъ предупредить; ее давать надобно такЪ, какЪ мы предписали вЪ § 6 сей главы).

TAABA 4.

О лихорадкъ безпрерывной - острой.

Сія лихорадка названа острого, горящего или вос-Какіе люди подвер палительного (1); она болье всего пристаеть къ молобользни? **ДЫМЪ**

щимся ли- (1) Люди, имъющие уже наисторое свадение о бользияхъ, непреманно удиватся, что Г. Бухинъ подъ словомъ ликорадии везпрерывной-острой сливаеть лихорадку горящую и лихорадку воспалительную. Древніе, енажуть они, почитайи ихь за весьма различныя бользни; Галень и Иппократь, и всъ онымъ подражавшие писатели особенно описали лимерадку горящую подъ именемъ горячия или огневины и проч.

Но нъть практика, которой бы не сказаль согласно съ г. ле что дол-Роз, что слово саиби, кайбос (горячка или огневица), переведенное жно разликорадкою горящею или палящею, иногда употребляемо было умъть Иппократомъ къ означению ликорадии сильной, ликорадии жесподъ слотокой; еднимъ словомъ, къ означению не вида, а степени лихорад--OXNX GMOE жи; и что обыкновенно дренніе употребляли оное вообще къ изъявлерадки безнію лихорадонь острымь, опасных и смертоносных в. Смотри тетоїпрерывнойres sur les fievres, ou melange de I hysique & de Medicine. T. I, p. 232 острой ? & fuiv. Пустое раздъление

Лиморадна везпрерывная сстрая, о коей ндеть завсь дело, заключаеть въ себь всь сіи знаки или свойства. По сей - то причинь разные признаки, ее сопровождающие, обманули писателей, которые изъ ложной ревности сдълали стольно видовъ ликорадовъ, скольно усмотртан они наиболте поразившихъ ихъ признаковъ. Отсюда - то апроизошли вев сін пустыя лихорадки, упоминаемыя въ их в сочинені хв жакъ-то: горящая, когда жаръ жгучій господствоваль; эпіальная, когда сей господетвующій жарь смешань быль съ чувствіемь озноба въ конечностямъ; липирійная, когда сей самой жаръ назался внутреннъйшимъ, а холодъ оназывался въ конечностяжь; сонливая, ногда жаходилась сонливость; икотная, когда икота; одышливая, когда дыха-

хорадкамъ.

сей лихор дки.

дымЪ людямЪ, или находящимся вЪ цвътъ возраста, а особливо кЪ тъмЪ, кои живутъ въ обили, кои много имъютъ кроси, у коихъ солоти кръпкія и эластитескія.

Сїя лихорадка бываеть во всякое годовое вре- въ какое им; но чаще случается въ весну и въ началь льта.

годовое время она чаще бываешЪ ?

9 1

Пригины лихорадки безпрерывной-острой.

Пихорадка безпрерывная - острая можеть причинена быть всемь тьмь, что можеть разгорячить ть-Гомо II.

дыханіе трудно; тоскливая, ногда больной терпъль тоску; обмертоблая, ногда были сильные обморови; потливая, ногда много потъль; желчная, ногда она сопровождена обильнымъ истеченіемъ желчи и проч.

Мы бы и конца не нашли, естьли бы захопьли упомянуть только имена всьхъ видовь ликорадоль везпрерыенымь острымь, выдуманных суещою и тщеславіемь; но оставимь всь сіи пустяки, которыя только что затемняють практику. Благоразуміе не хочеть того, чтобь по одному только пустому имени уставлять образь пользованія: онь должень утверждень быть на прочныйшемь основаніи.

Почему скажемъ только то, что Природа представляеть намъ два толька два только вида лихорадовь везпрерыеныхъ острыжь: одну къ добру, ко вида а другую къ злу (benignam & malignam). Сіе раздъленіе осковывает лихорася по сношенію съ опасностію и призновами, ноторые, будучи обы-докъ безмайными въ сей послъдней, не примъчаются въ первой; но и оно не всегда прерывнримътно бываеть наиболье упражнявшимся въ примъчаніи глазамъ, ныхъ-оститьть паче, что лихорадка везпрерывная острая къ добру удаляется рыхъ иногда отъ извъстнаго пути, дълается опасною и принимаеть худой обороть, т. е. видъ лихорадия но злу отъ худаго пищеупотревленія, или худаго пользованія, какъ-то сочинитель говорить здъсь внизу, и будеть еще говорить въ главъ в, толиующей о лихоради в злой или гнилой (є).

(г) Лънари, накъ изъ всего опослъ писаннаго разумъть можно, обыкновенно разумътотъ подъ словомъ лихорадии воспалительной то,
что у насъ просто называютъ горячкою. Причина лихорадии и горячим одна: порча ирови и нъкоторыя другія обстоятельства. — Но
главное дъло состоитъ въ томъ, что тогда только надобно отворять ировь, когда есть воспаленіе, т. е. жаръ въ головъ, въ боку (въ колотьт), въ ушибъ и проч. кратко: гдъ случается жаръ,
мамъ можно отворять кровь, щолько бы покаланіе было дъльно.

излишества; и такъ непомърное тълодвижение, спанье противъ солнца, питье напитково кръпкихо, кушание пряностей, роскоть въ столъ безъ довольнаго тълодвижения и проч. могутъ причинить си лихорадку. Все, что можетъ остановить испарение, какъ- то лежание на землъ мокрой, питие напитковъ холодныхъ сгоряча, ходьба ночью, также могутъ подать къ оной поводъ.

\$ 2.

Признаки лихорадки безпрерывной - острой.

Признаки предшесшвующіе.

Пихорадка безпрерывная-острая обыкновенно возвъщается запоромъ или всеобщею, т. е. повсемъстною ознобою, за которою вскоръ послъдують великой жарь, пульсо полной и тастой, боль въ головъ, сухость кожи, краснота въ глазахъ, цвътъ лица раъющій, боль въ спинъ, поясницъ и проч.

признание. сущеЗа всъми сими припадками слъдують трудность въ дышаніи, тоска и позывы на рвоту; больной жалуется на великую жажду, отвергаеть яства твердыя, не спить: языкъ обыкновенно бываеть черень и твердь.

Признани

Бредд, непомврное ворогание, тяжесть вд еруди до высокаго степени, трудное дыхание, припрышки тендиновд, икота, холодь въ конетностяхд, клейкой потд, невольное истечение моги, суть всв весьма опасные признаки.

надобно КакЪ сїя бользнь всегда сопровождается опаснодавать по- стію, то надобно, какЪ скоро окажется, употребить мощь больпому, какъ всь наилучшія средства Врачебной Науки: потому скоро ока- что въ началь Лькарь удобно можеть быть полезнымъ жется бо- больному; но ежели бользнь запущена будеть, то все все все его знаніе останется часто безполезнымЪ: почему неизъяснимъе всего поведеніе тьхъ, которые имъя способность подать вст возможныя пособія, какъ скоро бользнь открылась, дожидаются однакоже, пока больной дойдетъ до крайности.

ВЪ самомЪ дълъ, вотще будутЪ ожидать облегченія отъ Медицины, когда бользнь сдълается неизльчимою по причинъ отсрочекъ и худаго пользованія, а силы больнаго будутъ истощены. Лькари, правда, могутъ помочи природъ, но ихъ усилія останутся всегда излишними, когда не возмогутъ болье ей помогать (2).

(Прежде, нежели поступишь далье, читай глав. 1 и 2 сего Тома).

0 2

\$ 3-

(2) И такъ весьма нужно больнымъ призывать къ себъ безъ всякихъ отсрочекъ просвъщеннаго Лъкаря, наипаче когда они подпадають бо- лъзнямъ толь тяжкимъ, и пользование коихъ толь затруднительно.

Почти вст люди по пагубной и непростительной привычит почитають за бездълину начала своихь бользней. Даже мы видимь, что они силятся побъдить зло; видимь, что продолжають свои упражненія и образь жизни, пока угнътены будучи бременемь, падуть, по собетвенному ихъ выраженію, какъ дубь.

Но бользив пютда нарочито усилилась; и та бользив, коей ходь весьма быстрь, которая крайнь остра, какова есть почти всегда здёсь упоминаемая, находится въ эрелости, которую еще и не начали согласно съ Природою изгонять. Когда приходитъ Лекарь, що взлыжаеть только, что потеряны первые дни, оть коихь всегда зависить въ сихъ случаяхъ успъхъ. Онъ предписываеть пищеупотрев. леніе и лъкарства, относительныя къ настоящему состоянію бользии: но напередъ еще вначаль не даваемы были обильныя питія, провонусканія, и другія приличныя средства, и больной, искавшій напротивъ только презирать эло, часто набивавшій себя пищею, виномь, напитками, эликсирами, теріякомь и другими надобьями, которыя тольно что распространяють въ немъ горящій огонь, только что причиняють большую остроту въ сокахъ, умножають окреплость и сжатие сосудцевь, при всткъ стараніяхъ Лекаря умираеть; или, ежели живь остается, яства, горячительныя вещи, вначаль имъ причаныя, оставляють въ немъ съмя какой нибудь томительной колбани, которая мало помалу усиливансь, чрезъ нъснольно времени выходить наружу и заставляеть его купить долговременными страдамими смерть, коей онь желаеть кань конца своихь золь.

6 3.

Пищеупотребление, которое должно предписывать стрыждущим в лихорадкого безпрерывного - острого.

Какія надобно иснолнишь поназанія авзни?

ИзЪ признаково сей бользни видно, что соки слишком в вязки, слишком в остры; что испарение, мога и слина идуть въ маломъ количеснивъ; что въ въ сей 60-сосудцах в находится окрвплость и сжатие, и что жаръ во всемъ тъль слишкомъ силенъ: и такъ все начь доказываеть нужду въ пищеупотреблении, могущемЪ разжидить кровь, выгнашь остроту соковЪ, умьришь непомърной жарЪ, истребить спазмодитеское состояние сосудцево и чрезъ то возбудить от деления.

Монрошокым пишія MbIR.

Для выполнения всъх всих важных в показаный жидишель- больной долженъ обильно употреблять мокротожи диподкислен- тельныя питія, каковы суть грешневая или овсяная вода, т. е. въ которой варена была грета или овест, или процъженная сыворотка, ясменная вода, втварз изъ яблокв и проч: всъ сіи воды или птизаны надобно подкисливать лимонным в соколь, или померанцовымь, или смородиннымь, малиновымь желеемв и проч.

Померанцовая сыворошка: способъ пригошов-.99 diller

Сыворотка, савланная съ помощію померанцоваго сока, есть превосходное питье въ сихъ случаяхъ. Для приготовленія оной варится в равных в частях в молока и воды горгкой померанецв, изръзанной ломшиками, пока творогъ осядеть. Ежели померанца имъть не можно, то лимонд. Шепоть виннаго калия, или ложка уксуса произведенть то же дъйствте. Когда сыворотка отварилась и творогь осъль, то можно прибавить, глядя по обстоятельствамЪ, двъ или три ложки бълаго вина. (Обстоятельства, требующія вина, весьма ръдки вЪ началъ острых болъзней. Вообще сте превосходное крвпительное показуется только въ случаяхЪ слабосилія посль выпоражниваній и проч.)

Ежели

Ежели у больнаго запорв, то надобно дать ему Славительотварв, сдъланный из унціи тамариндовв, двух вой отунцій изгома, двух вили трех винных ягодв. Всь
еї вещества варятся в трех фунтах воды дотоль, доколь останется только четвертая доля. Сей
отварв особенно нравится больному, и он может в
его пить, сколько сам похочет в. Общая грудная птизана (ptifana pectoralis communis), равно в сих случаях в
прилична. Сего дается больному по чайной чашк в чрез в
каждые два часа, и даже чаще, естьли жар в и жажда сильны.

Всвей отвары должны выпиваемы быть несколько всвей горячими. Вы началь бользни даются они вы маломы питія дол-количествь; но по мерь, какт она продолжается, на-несколько добно ихы давать по большему пріему, да и почаще, теплыми. дабы пособить Натурь вы изгнаніи бользнетворной какты упо- треблять матеріи чрезы различныя выметанія.

Мы показали немалое число питій на тоть ко- для чего нець, дабы больной быль въ состояніи избрать то, предписы, которое ему покажется пріятиве, и когда наскучить многія тасоднимь, прибъгнуть къ другому.

Яства больнаго должны бышь въ маломъ количе- канія дол. етвъ и весьма легкія: ему надобно запрешишь веякой жны бышь видъ пищи, въ кою входишъ мясо, даже цыплячьи буль- вства больнаго? боны; а позволишь шолько кашицу, пинадз, или ле- гонькой хльбъ свареной въ водъ. Въ сіи яства можно прикинуть нъсколько грановъ обыкновенной соли, или немного сахара, дабы сдълать ихъ сноспъйшими. Больной можетъ еще всть нъсколько петеных яблох въба съ смородинным желеем , съ испетенными или сваренными сливами и проч. (3).

0 3

HI:-

⁽в) Надобно быть весьма осторожну въ предписывани яствъ. Извъ-Благоразстно, что въ сей бользии надобно запрешины ведкую пищу, въ ною уміе, съ кавходить новымъ на-

Ничего столь пріятнаго больному не можно до-

еть свыжаго возжаго возмуха. преТомь I, гл. 4. Сей воздухь надобно впущать вы его
досторож- комнату, а особливо вы теплыя погоды: но это надомость, сы бно дылать сы нужными предосторожностями, чтобы
кановою
надобно его больному не было холодно, и чтобы оны не простудился.
больному
доставлять. одыялами, поды предлогомы возбудить пота и защиопасности тить его оты холода. Сте обыкновенте безы худа не
оты нутанья оды проходиты: оно умножаеты жары вы тыль, утомляеть

добно предписывать яства въ сей болъэни-

SHARKS.

входить мясо; но и другія Г. Буханомь предлагаемыя яства не должны даваемы быть безь разбора. Сколько ни просты, сколь ни удобоваримы они суть, однако они были бы опасны въ весьма тяккой больни. Больному надобно тогда ихъ совсьмь оставить. Лихорадна воспалительная-острая тяжкая есть одна изъ числа тъхъ бользней, въ которой больные остаются семь, девять, одиннатцать, четырнатцать дней на одномъ только отварь, не ощущая способности ни къ какому виду яствь.

боль-

Каной тототь путеводитель, коему надобно слъдовать въ тредписаніи детвъ? Вообще аппетить должень нась руноводительствовать; но чьть сильные бользиь, тымы аппетить менье ощущается. Больной, увыренной о опасности неты, вы острыхы бользияхы должень отвергать всь ть, кои ему поданы будуть, всякой разы, когда желудовыего ихы не просить, которой и вы самой вещи не будеть просить никогда, или почти никогда вы началь, вы приращении и вы эрылости бользии, ежели однакожы исключить ликорадки желуныя, нереным и прочь вы коихы натура требуеть подкрытленія какими нибудь яствами, которыя бы кромы того служили вы сихы бользияхы, а начивае вы послыдней, кы отвращенію наклонности соковы кы гиплости, какы то мы показали выше сего вы примычаніи з главы і сего тома, и какы мы скажемы вы главахы в и 9 сего же тома.

И такъ когда уже натура избыла бользнетворную матерію чрезъ выпоражниванія, то тогда только желудокъ начинаеть чувествовать иужду, которой надобно удовлетворить, какъ - то сказано будеть ниже, предписывая яства силовозставительныя и удобоваримыя.

Однако же въ бользиять не столь шяжкихъ можно позволить сін яства два раза въ день; а въ шъхъ, кои не предвъщають никаной опасности, можно ихъ давать чрезъ каждые восемь часовъ, или три раза въ день. больчаго, и не токмо не пособляеть испарению, но еще ему и сопротивляется. Смотри вЪ главъ 2, § 2, и въ 7 примъчании той же главы.

Когда у больнаго есть еще силы, то онъ время вольному от времени может в посидъть. Стя перемъна положе- хорошо вія часто производить весьма хорошія следствія: она время оть облегчаеть голову, удерживая быстроту, съ каковою дъть, нак кровь стремится кЪ мозгу. Однако сте положенте дол- возвышать жно не на долгое время бышь, и ежели у больнаго голову. есть расположение къ поту, то лучше оставить его лежащаго, только чтобы голова нъсколько приподнята была посредствомъ подушекъ.

Для прохлажденія комнашы надобно ее опрыски- способъ вашь уксусомв и лимоннымв сокомв, или уксусомв и прожмарозового водого, въ коей распущено несколько селитря- ждать номой соли, такъ какъ предписано въ Томъ I, глав. 4. Сте опрыскиванте надобно почасту повторять вЪ день, а особливо ежели погода жаркая.

РошЪ больнаго можно прохлаждать, давая больно- и рошъ ну часто по глотку смвси изв воды и меда, вв кою больнагоприбавлено нъсколько уксуса. Отварб винных в ягодо въ ятной водь произведеть такое же дъйствие.

(Больной долженъ принимать сіи жидкости холодными; он В должен в перекатывать глоток во рту, пока согрвется, а по томъ выкинуть; повторять то же чрезЪ каждые полчаса, чрезЪ каждой часЪ, чаще или ръже, какъ ему лучше покажется. Онъ можетъ жевать вЪ томЪже намърении мякоть облупленнаго померанца, коего жилки долженъ онъ выбрасывать. Нъсколько смородиниаго желе, яблогнаго, равно прилично; но чемь больной болье будеть пить, темь менье ему будуть нужны сти пособтя.)

Ваня ная Надобно еще опускать руки и ноги больнаго въ омовение рукь и ногъ болить голова.

Надобно еще опускать руки и ноги больнаго въ день, а наипаче, когда болить голова.

Ежели жарЪ великЪ, то надобно вЪ стю воду при-Обстоятельства, бавить уксуса; его должно положить полфунта, бокои покалве или менве, на каждую баню, глядя по обстоязываюшь, что надоб- тельствамЪ. ВЪ промежутки сихЪ бана, потворяемыхЪ по крайней мъръ два раза въ день, полезно прикладыно прибавишь уквать салфетки, или холста, или фланели, опущенеуса вЪ ной въ шеплую волу къ бедрамъ, къ ляшкамъ, къ брюсін бани. ху больнаго; а когда высохнушЪ, то перемънять другими.

Больнону надобно быть совершенно покойну, сонадобно вершенно на своей воль. Компанія, шумь, все, что поков; можеть причинить возмущеніе вь душь, или духь, чтобь онь вредно: даже сильное сіяніе свыта и все, что сильно не видьль норажаєть чувства, со всякимь стараніємь должно поражаєть чувства, со всякимь стараніємь должно выть избытаемо.

> Число прислуживающих в ему людей, сколько возможно, должно быть менте. Когда они ему любы, то не надобно их в часто перемънять, так в как в замъчено в в Томъ I, гл. 10.

надобно, но Благоразумнъе удовлешворять его прихотямъ, тольно остемерожно, нежели противиться онымъ. Даже часто случится, поблажать что объщание требуемой имъ вещи польстить его вкусу и столько же, сколько самая вещь, такъ какъ мы уже желаніямъ показали въ гл. 2, въ прим. 8 сего Тома.

6 6.

Пъкарства, кои на добно предписывать больным всккаго возраста лихора дкого безпрерывного-острого.

Въ сей лихорадкъ, такъ какъ и во всъхъ тъхъ, провопусизнія

во всъхъ тъхъ, такъ какъ и во всъхъ тъхъ, кровопунымв, провопускание крайне важно: оно должно всегда въ сей вопроизводимо быть съ минуты, какъ скоро окажутся взни. признаки воспаления. Количество выпускаемой крови сразмърно должно бышь силамъ больнаго и жестокости бользни.

Естьми бы послъ перваго кровопусканія ликора дки когда и усиливалась, и пульев становился жесточайщимъ, то сколько бы нужно было приступить ко второму кровопускантю, Разъ наможеть быть къ третьему, и даже къ четвертому, ворьть что можно делать чрезъ денатцать, осьмнатцать кровы: часовъ, а иногда чрезъсутки, и даже далъе, сжели признаки то дозволять. Но ежели пульсь становится мягкимЪ, а больной по немногу чувствуетъ облегчение послъ перваго кровопускания, то оно не должно быть повторяемо (4).

Jones II.

11

Еже-

(4) Промежущокъ, полагаемый здъсь сочинищелемъ межлу наждымъ кровопусканіемЪ, можетЪ быть очень долговременнымЪ во многихЪ сбстоятельствахь. Есть такіе случан, въ конхъ посль перваго просспусканія, долженствующего быть обильнымЪ, однако же всегда относительнымъ нъ силамъ больного, спустя четыре или шесть часовъ надобно еще пускать прось: сіе надобно наблюданть велкой разъ, когда пульсь остается жестимь и сильнымь, а напиаче, накь говоришъ весьма основащельно Г. Бужанъ, когда онъ получаетъ большую жестность, большую силу посль перваго кровопусканія, такъ накъ иногда въ самой вещи случается.

Естьми посль втораго провопусканія пульсь всю еще сохра- рымо скуняеть свои начества, то надобно чрезь десять или двенатцать часовь чается, приступинь къ препьему, которое часто, да почти и всегда, дол-чтобъ пожно быть последнимъ, когда три кровопусканія учинены въ сутки; требно быпошому что Инпократь не для того пускаль просв, чтобь погасить по болье совствы ликорадку, но тольно чтобъ умерить оной излишество трекъ Анхорадна столь нужна для произведения соэрвния и разрышения больз- провопунешворной мащеріи, что часто мы въ прантинъ принуждены возбу сканій; пождать ее искуственную, или для того, чтобъ поддержать и укръ- тому что пишь силы природы въ бользняхъ острымь, или для шого, чтобъ не надобно дать или произвесть движение соковъ, кои застаиваются и портятся пуснащь въ продолжительнымъ бользнакъ, накъ - що мы понажемъ въ следую- кровь дощемъ примъчании.

Ежели жаръ и ликорадка очень сильны, то надо-Прожиздибно больному дашь микстуры или смвси, составляетельная минетура, пой савдующим в образом в:

которую онжаль предписывашь, когда жарЪ и **хик**орад ка очень силь-

Возьми розовой воды - - унцію, Обыкновенной воды - - двъ унціп, Уксусного сиропа, въ коемъ примъшено Малиннаго соку, - полунцій;

Смъщай: вмъсто сиропа можно положить нъсколь-

Ko caxapy.

Прибавь купоросного спирта услащенного (Spiritus vitrioli edulcorati) сорокъ ихи плипресянь капель.

Сего пишья надобно давашь чрезЪ каждые шри или четыре часа; по томъ довольно будетъ давать его чрезъ каждые пяшь или шесть часовь (5).

Exe-

more, Aoколь погаснеть лижорадна. I A TEFO?

Пагубная

м шанъ правильность и умеренность, нои были правилами Иппекрата, должны быть также и нашими. Онъ отворыть просы только въ нуждъ, да и сполько, сколько попребно было; онъ опасался предписывань сіе дъйснівіе людямъ слабымъ и истощеннымъ даже въ самыхъ острыять бользилув, такъ накъ и практики знають от онаго воздерживаться въ обывносеннымъ оспамъ, въ коихъ силы природы не превышающь силь бользии, болся, чтобь чрезы то не воспрошивиться извержению бользнетворной материи.

Сте Иппанрашово благоразумие, такъ говоритъ Г. Клеркъ, естъ преизрядная зашира на поседене швкъ кровожаждущихъ лектрей, кошорые безумно исполнають кровь больныхь. Никогда не можно выпуенишь всей бользнешворной влажности съ просто, естьли шолько вся она не будень испъщена. Сей выходь бользненьюрной матеріл есть дъло единой природы.

И такъ просопускание не иначе должны мы почитать (на кое мы бываемъ или слишкомъ скупы, или безсчадны, когда предписываемъ его тольно по системъ, или привычит), накъ лапретвомъ палліативнымь, утоляющимь и разрвшающимь.

влажность. (5) Г. Буханъ по всему разумбеть, что не надобно пускать кровь дотоль, доколь лихорадка совсьмъ погаснеть; потому что онъ предписываеть прокладительное питіе для умъренія оной, ногда она посль трехъ провопусканий всю остается сильною. И такъ надобно непрестанно внущать, чио ниногда не должно покушаться совстмъ

мысль въхъ, кои пущающъ RPOBE . чтобЪ изгна шь болтэнев ворную что должно ду-

машь о

кровопу-

CHANIN?

Ежели больной чувствуеть тотноту и позывьчто долна рвоту, то надобно пособлять усиліямь Природы, жно дадавая ему легонькаго настоя ромашковых в цвытовь, или тда убольпросто теплой воды; но ежели онь оть сего одного наго есть
не блюеть, а тотнота вей есть, то надобно будеть но
ему дать пятнатцать грановь ипекакуанги вы порощкъ вы рюмкъ воды, такы жакы мы предписали выше секо вы примъч. 4, глав. 3 сего Тома.

II 2

Еже-

погасить ликорадку. Ликорадка, такъ канъ мы выше сего сназали въ гл. 2, § 2 сего Тома, не иное что есть, какъ усиле натуры, старающейся освободиться отъ бользиетворной матеріи.

И такъ наши странія должны ограничиться тъть, чтобъ въ чемъ утишать ея усилія, когда они превосходять силы вольнаго; чтобъ состоить оставить дбиствовать природу, когда ея усилія сразмбоны сь сопротивленіемь со стороны кольнаго; наконець чтобь придавать силы природь, когда сів сопротивленіе превосходить ее. Воть въ кратких в тря при словахъ все то, въ чемъ состоить все врачеванія въ лихорадкахь тез. пользованій прерывныхь острыхь; въ лихорадкахь, приключающихся въ пострь. большей ль, параличь, въ воковомь колотьв, въ воспаленіи легкихь, въ жазъ, части освь ость и проч. воть все то, что сказано въ тысли в книгь, писан- трыхь бонько о сей части нашей Науки: но и воть то, что о семъ научаеть льзней? нась простое наблюденіе, помогаемое разсужденіемь.

Весьма нужно замътить, чио мы означаемъ завсь родъ больз. Бользии, ней, въ коихъ ликорадка есть первымъ орудіемъ нецьленія; потому въ коихъ что есть другія, въ коихъ она не токмо была бы на то пренят нужно поствіемъ, но еще бы была и смертоносною, ежели бы не была остано- гашать ливлена; потому что она одна только составляеть бользаь, на примъръ: хорадку. ликорадки перемежающінся простыя, а кольми паче непорядочныя, и коихъ признаки суть опасны, ликорадки нереныя, злын, тимлын и проч. Можно догадаться, что въ сихъ случілкь больной не можеть иначе выздоровьть, какъ совершеннымъ изгнаність ликорадии.

То же должно сизать о ликорадий, ссединенной съ нефритическою, т. е. почечною колиною. Сін ликорадиа не токмо не помогаєть выходу песка или хряща, но еще чаще всего етремится остановить или задержать его въ почкакъ воспаленіемь. Ликорадка, причиняемая камиемь въ мочевомь пузырь, также последующая за жиру гическими операціями, за вывихами, переломами, ранама, упавленіями, за растерзаніями кожи тендинось свячей, первы и прочне менье также опасна и не менье требуеть поспыте іл вы пользованіи, какь то видно будеть вы каждомы члень, толкующемь ю енхы бользняхь. Ежели животъ или брюхо кръпко, занерто, то же- больной должень употреблять ежедневно промывание . составленное из в половины воды и лолока, небользаперть. шаго количества соли и ложки деревяннаго ласла, или малаго количества свёжаго коровьяго масла.

> Ежели еїе промываніе не булеть имъть желаннаго дъйствія, то надобно прибавлять время от времени вЪ пишье больнаго по кофейной ложичкъ бълой магнезіи, или виннаго камия. Можно шакже въ сихъ елучаяхь ему давашь тамариндово, сливо, печеныхъ яблоко и проч (6).

День, вв которой бываеть переломЪ знаки жоpomie-

Ежели около десящаго, одиннатидатато, или двънатцатаго дня бользии, пульев становится мягчайшимЪ; ежели языкЪ начинаешЪ увлажнящься; ежели михорідни: мога опускаєть на дно судна подсёдо красноватой: то по всему можно надъяться добраго конца, такъ какЪ мы дадимъ о семъ знашь ниже сего, въпримъчания 7 и следующих в сего Тома.

Exer

И такъ мы за долгъ почитаемъ отчести сей совъть къ вопой моднезін, къ винном у камню, тамариндамъ, нов прибавляются къ импзань, или лучше вы подсыченной сыворотев; въ сыворотев, въ ком прибавлено, по чутствительности больнаго, фольтоваго спрота, или спроиз персиковь цавтовь, или цыпорейнаго съ ресенемъ. Мы даже думаемь, что можно бы было сбойшись безь встхв сихв пособій, ежели бы вмітсью одного промыванія вів день длагемы были дея или три. Первое променение налобно давать такъ, канъ сочнижель совъщуеть; а другія на водъ простой.

^(6) Но мы дали энать въ з примъчани сей главы, что яствамъ надобно сразмърнымъ бышь съ напраженностию бользии; что въ бользняжь счень шлжкихь должно ошь оныхь совствы воздерживашься; что въ больникъ не столь тажинкъ позволительно давать икъ полько два раза въ день, и что въ техъ, кои не опасны, въ сутки давать только три раза. Ежели кто кочеть отверить, т. е. послабить поереденном в черносливв, печеным язлокв, тотв и самв знаетв, что шушь будешь попребно сихь веществь кемалос количество; но оки по такому приму савлають тыть болье зла, чыть больнь будеть острые.

Ежели вывето всвх сих в признаково больной кудые уныль; ежели пульео слабветь болье и болье; ежели дышате становится труднымы или тяжкимы ев онвымытемы членовы, ев дрожаниемы перео, ев припрышками тендиново и проч: то не безы причины можно онасаться нещастнаго последствия.

Тогда-то надлежить прикладывать нарыеныя, время прит. е. шнанскія мухи кь затылку, или кь икрамь, или наадывать кь лядзьямь, или кь чему другому и проч. по обстоятельствамь.

Возьми мякиша бълаго искрошеннаго хлъба четыре унціи, истолченнаго горчичнаго съмени двъ унціи, укоуса довольное количество, едълай какъбы пластырь.

ВЪ тоже время надобно поддерживать силы боль-давать наго, какЪ-то сывороткого, съ добрымъ виномо смъ пранительныхъ шанною, негусомо, катиского изъ сагу, въ которую кладется нъсколько добраго вина и проч.

\$ 5.

Пользование выз доравливающих ботб лихора дки безпре-

Пищеупотребление, о коемъ мы говорили въ § 3 сей главы, нужно не токмо во все течение лихорадки и бользни, но еще и при выздоравливании. Ежели оно пренебрежено будетъ въ семъ послъднемъ пергодъ, то больной чрезъ то подвергается рецидивамъ, т. е. возвратамъ бользни, или другимъ бользнямъ, которыя сдълаютъ его хворымъ.

Хошя больной посль сей бользни бывает в слабъ, однако яства его должны быть болье послаблятвленыя, не-

пежели питательныя. Онъ долженъ избъгать съ величайшимъ рачентемъ всякихъ излишествъ: излишняя пища, излишнее питье, излишнее тълодвиженте сдълаются ему вредными. Духу его надобно быть совершенно спокойну; онъ не долженъ налегать ни на ученте, ни на что другое требующее великаго размышлентя.

Ежели пищеварение медленно; ежели больной вретельства, мя от времени чувствует в накоторыя небольшия показующих хину. отрыжки лихорадки: то он должен в употреблять хину, настоенную на холода в в вода сладующим вобразом в:

> Возьми наилучшей хины истолченной одну унцію, положи ее въ бутылку, налей наверькъ фунтъ холодной воды, заткни, настаивай шесть или восемь дней на холодъ, взбалтывая ее почаще: слей потихоньку, и храни для употребленія. Какъ передъ объдомъ, такъ и передъ ужиномъ сей жидкости прининается по полурюмкъ. Симъ образомъ приготовленная хина, укръпляя желудокъ, выгоняетъ остатки лихорадки.

время про- Когда выздоравливающій начинаеть возвращать чицінь накоторую часть своих в силь, то надобно принять ему какое нибудь легкое слабительное, как в на прим. сіе:

Пристойное лькарство въ семъ слуВозьми тамариндово - - унцію, Ялександрійскаго листу - - драхму.

По Лашыць:

Rec. tamarindorum - - unciam vnam, Follicul. fennæ - - dra hmam vnam.

Вари эти вещества чрезъ нъсколько времени въ

Прибавь манны (mannæ) - - унцїю; Пусть распустится; процъли.

Cero

Сего тистительного чась оптасу дается по рюмкв, пока начнеть дъйствовать; послъ чего остатокъ выбрасывается.

Сте самое лекарство повторительно принимается два или три раза по прошествій пяти или шести дней (7). Работники, художники, всъ занимающиеся шаж-

(т) Разумные люди, бывшіе свидъщенями поведенія штхв знахарей, тьхь площильных в лекарей, которые не знають инаго способа пользоветь больныхъ, канъ подавляя ихъ лъкарствами, безъ сомнънія удивания, что Г. Буханъ въ больями сей, часто двлающейся весьма шажною, предписываеть ихъ толь мало. Они равно удивятся порядку и времени, въ коикъ наждому авкарству надобно быть предписывае-MOM Y ..

" Но не шакъ - то поступаетъ управляющий нами, скажутъ "опи: онъ начинаетъ съ провопускания, и повторяетъ сте провопуска. Обыкновень » ніе дошоль, доноль лиморадна совсьмъ пропадешь. На другой день ный об-,, дзеть онь проносное; спустя два дни опять проносное дзеть, и разь, поз чрезъ каждые два дни всю даеть проносное до совершеннаго выль- коему , ченія; между шьмъ реотное, порошин, опісты, отвары, пишія и поль-"проч. ничего не забывается, ничего не пулдится. Ежели ему не зують, со-"удается, що это по тому, что бользав сильаве лекарствв. Укорять противоу его за то было бы несправедливость; потому что онъ пускаеть положен-" кровь, дзеть проносное, абчить столько, даеть лекарствь столько, ный съ обу сколько можетъ.,,

Бухана.

, Но ежели мы будемъ лечинь по швоему способу, по, Бо-"же милоепивой! мы вев погиблемь. Ты боишься поэволипь намъ у одно только кровопускание и запрещаещь, чтобъ никогда не доходить ,, далье шрекь въ воспалашельных в лихорадиахъ. Послъ сего пшизаны, у промыванія, умовеніе ногь, припарки супь единыя твои подмоги у чрезъ все почение бользим. Ежели пы предписываещь какое нибудь упишіе, то до мълкости п казываешь ть обстоятельства, въ ко-» ихъ надобно его даващь; послъ того ты говоришь намъ о нарывныхъ, у лъкарешвахъ, употребляемыхъ нами развъ при крайности; в не эт упоминаены напередь объочащении посредсивомъ проносныхъ, конторыя у шы в ошиладываешь ив концу бользаи, да еще, чтобъ и больной » возвращиль себь наконорую часть своих в силь. Право, или Врачебу ная Наука много премънилась, или бъщететво вводиять новости де-26 конца обладало людьми; потому что оно побуждаеть ихв шупишь » даже самою жизнію себѣ подданныхЪ.,

тажкими трудами, не должны по выдержанти сей же бользни очень рано приниматься за свою работу; имъ надобно забыть свои дъла, пока возвратять большую часть своихъ силъ и свою бодрость, такъ какъ мы уже дали знать въ главъ 2 сего Тома.

TAA-

Его правила сушь правила Иппокрашовы, Сіи слова, сіи упреки повседневно повторяются даже тьми, коижь чинь и свёденія долженетвовали бы поставить выше проетонародія. Ежели бы, какь-то желаєть сочинитель Патріоть, Врачебная Наука содблавась отраслію нашего воспитанія; ежели бы творенія
превосходньйшихь нашихь писателей во Врачебной Наукь, какь древнихь, такь и новышихь, намь были извыстве: то бы мы узнали, что наставленія Г. Бухана суть наставленія самаго Отца Врачебной Науки, божественнаго Иппократа; мы бы увидыли, что онь
созываєть только воергавовь, фонь-Швитеновь, Розеновь, Пренглевь,
лістодовь, Дегаеновь, де бордевь, Клерковь и проч. и всёхь друзей человычества для приведенія Врачебной Науки вь первобытную
простоту, для содбланія ее Наукою, кося твердыя и извыстныя начала могли бы проовытить всёхь людей, имьющихь болье или менье
нужды вь ея пособіяхь.

Для выведенія же сел истинны из сомнівня, посмотримь, каковь быль плань, по коему послідоваль Иппократь вь острыхь бользилкь, и по коему просвіщеннішіє Врачи, отметнувь предразсудки и поправь системы, послідують єдинственно сь намітреніемь выпользовать больнаго.

Способь, по коему слёдоваль Отець Врачебной Науки въ острыхъ до различныхъ сщеменей больэнахъ. Въ болёзняхъ до ирайности
острыхъ,

Воть собственныя слова прорицалища Врачебной Науни: "въ "ликорадит просто острой надобно давать теплой воды, паромеля, "или оксимеля. Больной, ежели будеть пить велиное количество "сихъ существъ, никакой не подвергается опасности: потому что "ежели ему даваемы будуть сіи питья несколько теплыми, то они "будуть гнать испортивнеся соки уриною или потомь, или содер"жать будуть дышаніе на свободь, что весьма спасительно. Въ ли"хорадить острыйшей надобно давать больному столько воды или "идромеля, сколько того можеть пить.,

ВЪ бользняхъ, до крайности острыхъ, до крайности опасныхъ, онъ не довольствовался вышеупомянутыми пособілми. Сначала онъ пусналь врояв, повторяль промыванія, обильно даваль пить услаждающихъ и прохлаждающихъ птивань, кановыя поназаны въ § з и 4 сей главы. Когда онъ доводиль лихорадну до умърениаго степени, то оставляль натурь трудь созрвийя и перелома.

ГЛАВА 5.

О колоть в в боках в настоящем в и ненастоящем в, и о воспалении грудоврющной перегородки, называемой диафрагмою.

S I.

О настоящем в колоты в в боках в, или о воспалении внутренней грудной обологки.

Настоящее колотье есть воспаление той оболот- опредълеки, которая собою покрываеть внутренную часть гру-ніе настоящаго коди (1).

Tong II.

Но ежели около сего времени бользни помутившаяся или по- Когда немъшавшаяся натура казалась неръшимою, или хотящею отступить порядочной
оть легчайшаго пути относительно къ выпоражниванию бользне- ходъ натворной матеріи: то онъ употребляль другія средства. Въ шестой туры возкнигь его Эпидеміевъ пишется, что ежели соки хотять пасть на въщ лъ
неприличное мъсто, то надобно ихъ оть того отвращать; что ежели опасностьнапротивъ они примутъ цълебное теченіе, то надобно
имъ помогать, отворяя проходы, къ ксторымъ они стремятся. Къ наставленію присовокупллеть опъ примъръ, употребляя въ
сихъ случаяхъ чистительныя, припарки, пары, торчицеприкладыванія и проч. по состоянію бользни и больнаго мъста-

Онъ замъщиль, что острая бользнь обынновенно кончится Обынновено однимь или многими выпоражниваніями, т. е. мочею, потомь, кар- ной конець жаніемь, нарывомь или скопомь жритической матеріи, реотою, острыхь кровотеченіемь и проч. Плань его поведенія, основанный на сихь на- бользней. блюденіяхь, имъль цъль твердую и порядочную; его способь быль сообразень съ законами Природы. Когда начала основаны на наблюденіяхь, то и показанія тановы же.

ВЪ бользияхъ онъ рвотное тольно тога даваль, когда у признаки, больнаго во рту было горько, на языкъ иль, отрыжки, ворочина по кото-желудка, какъ-то случается често въ лихорадкахь желуныхь и гнирымъ; но даваль только сначаля. Воть какъ онъ изъясняется: "Дай даваль "рвотнаго въ началь бользии, естьли нужно. Больной тогда еще нарвотное, слаждается всеми своими силами; ежели ты упустить сей благо-и въ и тороном, прідтной случай, то принуждень будеть отложить до исхода; но рее время, та бользиь находится на высочайщемь степени своихь силь, то даваль, лучше быть спокойну.,

Что касается до прочищений, то онъ насъ увъдомияеть, что онь не во есть такія бользни, въ коихъ они не нужны. Въ лихорадках ост- всъхъ бо-

Какъ оно Настоящее колотье раздъляется на мокрое и сураздълнет-хое: въ первомъ больной удобно харкаетъ; а во внося:

абэнях в острых в дава л в славптельное. Для чего? рыхъ, оканчивающихся разръшеніемъ, т. е. безъ всякаго примътнато выпоражниванія, какъ то случаєтся въ большей части лихорадовъ иъ добру, и часто въ лихорадов везпрерыной острой, о коей заъсь идеть дъло, Иппократь воздерживался от очищенія; потому что, какъ соки тогда саълались однородными и совмъстными иъ совершенному пріугот вленію презъ разръшеніе, то не для чего болться возврата. Онь еще воздерживался от очищенія въ тъхъ бользияхъ, ноихъ переломь есть совершень, т. е. ноихъ полныя выпоражниванія уновять съ собою всю бользиетворную матерію, такъ что не остается ничего, сть чего бы можно было болться послъдствій; что узнается изъ благосостоянія, чувствуетаго тотчась больнымъ, изъ силь, изъ аппетита, возвращающихся всисръ, наконець изъ выздоровленія щастливаго и удобнаго, въ ноторое вступаеть немедленно больной.

ВЪ нанихъ бользинхъ прочищалъ онъ и въ накое время?
Исключение на сие всеобщее правило»

И пакъ прочищать онъ полько въ бользиять пъхъ, нои кончата несовершенными переломами или неполными выпоражниванами, дабы ничего не оставить инороднаго въ составъ крови; но прочищать уже въ концъ бользии.

Единственное исилючение на сте правило есть пученые соковтовь семъ одномь случать онъ прачищаль, даже въ началь бользни: но сте случалось ръдко; потому что, капъ онъ самъ же говорить, бользнетворная матерія ръдко бываеть въ пучены въ началь какой нибуды бользни. Надобно читать въ тіблиць слово пученые.

Таковыя то повседневно чинимыя опибки заставили Гофмана сназать: ежели мы котимы жертвовать истинны, то часто лучше положиться на единую Природу вы пользовании бользией, нежели повырить предпріятільный лінаря невыжи. Тоть, кто не знасть путей, по которымы Природа слыдуєть вы цылени бользией, унотребллеть противныя ся дыйствільный средства, а гредныя тылу; что сбратиться можеть тольно вы предосужденіе больному.

Пагубным сабдетым невбденым Иппонратовых в правиль. Такова была Иппократова практик: такова есть и та, которую Г. Вухань употребляеть вы ликораднахы везпрерщеныхы-острыхы, и которую оны употребляеть, такы маны увидимы, во всыхы острыхы больныхы. Нерады не или презрыне сихы правилы о употребления питый, провопускания, реотныхы, чистительныхы и проч. суть, говорить Г. Клеркы, настоящия причины неудачей большаго числа Врачей. Простая больные дылается чрезы по запутанною, долговременнымы и продолжительною; больные чахнувы, т. е. хворавы быдственнымы осразомы, впадають вы сухотку, неизмыную желтуку, которыя оканчиваютя вы слыную весну водяною вольныю, или гиплымы поносомы, коимы все человыческое знаніе не вы состояни подать но-

ромъ или мало, или и совсъмъ не харкаетъ. Есть еще нъкоторой видъ колотья, которой называють ложным или ненастоящим въ вы которомъ боль бываетъ болъ вывшная, и особенно поражаетъ междуреберныя мышим. О семъ послъднемъ говорить мы будемъ послъ въ \$ 2 сей главы.

Работники и поденьщики болье всъх водвержены кто наинастоящему колотью. Оно схватываеть наиначе тьх вержень кои трудятся на вольномы воздух , и кои суть темнолотью : перамента сангвинитескаго. Сія бользнь случается во всякомы возрасть и во всякомы поль. Целій Авреліаны замытиль, что она чаще поражаеть мущинь, нежели женщинь.

Между мущинами болье всьх подвержены колотью люди посиные и сухощавые, желчно- шемпераментиме, полнокровные, наиначе поселяне; наконець
тв, конмъ природа или трудъ далъ волоти твердыя
и эластитеския. Изъ сего числа суть егери, солдаты,
скороходы, драгели, надуватели охотничьих роговъ,
флейщики и проч.

P 2

Воз-

⁽¹⁾ Надобно знать, что всё жерева, всё мышицы, всё кости покры- Всё части ты и облечены кожицами болёе или менёе толет ими, обыкновенно тёла подвойными, кои вообще называются оболочками. Сін оболочки въ раз- прыты сужденіи сихъ частей сунь то же, что кожа въ разсужденіи виёш- оболочканности тёла. Многія изъ сихъ оболочекъ имѣютъ собственныя себё ми. Имена имена, а другія просто только называются оболочками.

Симъ - то образомъ покрывающая непосредственно кости ово- Періостілочка называется періостіумъ; покрывающая черепъ, перикраніумь; умъ или
покрывающія мозгъ менингами именами котя просто означающими околокостоволочки, но собственно употребляемыми вмъсто піа матерь и лура
ная оболочматерь; покрывающая печень, селезенку, почти осб черева подврющія, перитоніумъ; наконецъ устилающая собою внутренную часть
груди, приподнявщуюся часть грудоврюшной перегородочки (діафрагмы)
и обоихъ легкиют, называется плеорою: отъ чего и называется воспаленів сей части на Латинскомъ языкъ рестігі.

въ накомъ Возрастъ, наиболье подверженный сей бользии, возрасть? начинается съ осмаго и продолжается до сороковаго год . Однако же и старики от оной не совство освобождены, но они, кажется, скорве избавляются отЪ нее, нежели взрослые; сте происходить отв того, что какъ ихъ волоти гораздо суще, то и не столь удобно уступають сильному воспалению.

кто стъ божденъ?

Тъ, кои обыкновенно слабы низомЪ и кои нонего сево- сять прижигания, редко подпадають колотью. Вся обычайныя истеченія, а особливо кровлеыя, освобождають от сей бользни. Воть по сей-то причинь, безЪ сомнънія, женщины менье оному подвергаются, нежели мущины, которые и сами от в онаго освобождаются, когда имвють обычайные потетуи.

Возвраны •наго.

Тъ, кои испышали уже на себъ стю бользны, получають такое расположение, которое въ послъдствін ділаеть их къ оному весьма подверженными, такъ что безъ сомнънія оно становится для сихъ людей весьма опаснымЪ.

ВЪ которое годовое время оно приemaemb?

Весна есть то головое время, въ которое оно примътнъе и чаще свиръпствуетъ.

ЧЛЕНЪ 1.

Присины настоящаго колотья.

Колотье можеть причинено быть всемь тымь, что можеть остановить испарение: саъдственно холодные съверные вътры, спапте на вольномъ воздухъ на землъ сырой, мокрое платье и проч. нодвергают Ъ сей бользни.

Еще же опасно сгоряча или въ потв выходить на холодной воздухв, или опускаться въ холодную воду.

СверьхЪ

Сверьх в того сія бользнь может в причинена быть питьем в крыпких напитков , остановкого какого нибуль обыта паго испражненія, как в - то старых в вередого, прижиганій, наконец в пота ногв, рук в, или иншек в и проч.

Еще были примъры и того, что вогнанная внутрь какая нибудь высыпь, какъ-то короста, корь, оспа, ее причиняла. Люди, по нещастію привыкшіе отворять себѣ кровь въ одно какое нибудь годовое время, естьли опустять оное безъ кровопусканія, могуть также оному подпасть. (Угрызеніе змѣя съ колокольсиками, кажется, производить въ Америкѣ настоящее колотье, какъ-то мы будемъ говорить въ Томѣ III, главѣ 48, § 3, членѣ II).

Житье въ излишнемъ теплъ, т. е. или ношенте по качеству или количеству очень теплаго платья, или нагръванте отнемъ неумъренное своихъ покоевъ особенно располагаетъ къ сей болъзни.

Наконецъ колотье можетъ произойти отъ непосильнаго тело движения, какъ-то отъ бъганья, борьбы, скаканья и ношенья тяжелыхъ ношей, и даже отъ ударовъ въ грудь.

Одно только сообразованіе тьла, какъ-то грудь елишкомь узкая, и малопространность или узкость артерій грудной внутренной оболоски дълають нъкоторых в людей подверженными сей бользни: почему, кажется, не надобно сомньзаться, что шлу рованых суть отдаленною причиною колотья; потому что производимое ими дъйствіе есть то, что они уменьшають пространство груди, ее стъсняють и сжимають вы ней содержащіяся серева, такы какы мы дали знать вы Томь І, главь і, § 3 и примьч. 9.

YAEHB II

Признаки настоящаго колотых.

Колотье, такъ какъ большая часть другихъ михорадокв, начинается вообще ознобомв и дрожаниемв. за коими следуеть жарь, жажда и безсоница; после того чувствуется сильная и колютая боль въ какомъ нибудь боку между ребрами (что въ простомъ наро-Ав слыветь какв шиломв колетв, какв пожемв phжетв). Иногда боль простирается даже до спиной ковывается: сти, иногда до передней части груди, иногда даже къ плечамЪ. Сія боль вообще становится сильнъйшею вЪ ту минуту, когда больной въ себя дышетъ и когда кашляетЪ.

> Пульсо въ сей бользни обыкновенно бываешъ скор в и жестокв, моча очень красна.

Свойство крови вЪ нолошьв.

4mo Bb простомъ

народъ на-

какъ шиломъ ко-

леть?

Кровь, вышелши из вжилы, покрывается жесткою пластиного или отстойкого; харкотина у больнаго сперва не имветь никакого знака, но вскорв густветь и часто становится кровавою или гное - сукровичною.

(Прежде нежели приступишь кЪ дальнъйшему чтенію, читай і и 2 гланы сего Тома.)

ЧЛЕНЪ Ш.

Какое пищенпотребление на добно предписывать стракдущимв отв настоящаго колотья.

Натура обыкновенно стремится избыть стю бо-Каними льзны посредством в критического выпоражниванія кроспособами натура ви изъ какихъ нибудь частей тъла, или харканія и силишся избыть сію харкотинг обильных в, или пота, водянистаго помета, болъзнь? мушной моги и проч.

И такъ наша должность состоить въ томъ, Какіе долчтобЪ помогать или содъйствовать намърентямЪ прижны мы употреброды, ALIIIB ?

роды, т. е. послаблять сосуды, разжижать соки и облегчать локротохаркание.

ВЬ савдствие сего пищеупотребление должно быть, чего дохтакъ какъ въ вышеописанной бользни, легкое, прохлафенъ издительное и мокротожи дительное. Больной долженъ больной: избъгать летво вязкихо, неудобоваримыхъ, или очень питательныхъ, какъ- то мяса, масла коровьяго, сыру, яицъ, молока и проч: равно также надобно ему воздержаться отъ летво горясительнаго свойства.

Его пишье должно состоять из обыкновенной какое долсыворотки, или из обыкновенной грудной птизаны, жно быть из в настоя грудных в п бальзамитеских в растеній.

Ясной отвард, въ которой прибавляется немнож-способъ ко меду, или смородиниого желе, или смородиниого ва-готовить ренья, есть также приличное въ сей бользни питье. варъ-Онъ дълается слъдующимъ образомъ:

Возьми отищеннаго ятменя (bordei emundati) упрію,

Вари его въ трехъ фунтахъ воды, пока останется только третья доля; процъди: прибавь болъс или менъе меду, глядя по вкусу больнаго.

Отваро изъ винных в ягодъ, изъ изюма и ятмеия вывсто тамариндово, одобренный для вышеписанной бользии, равно пригоденъ и въ колотъв.

Какое бы ни было избранное больным в пишье, пишья долшолько не надобно ему принимать его очень много за нимаемы разв; напрошив в того должно ему употреблять его, быть все такв сказать по глотку, но безпрестанно, дабы рот в гда в в маи горло у него были безпрерывно увлажнены. Пишье и летва больнаго должны принимаемы быть ныеколько горячими.

Больнаго должно держать въ поков, въ умъренной теплотъ, и, сколько возможно, свободно, такъ какъ предписали мы въ предыдущей болъзни.

Hago-

Надобно повседневно умывать ему руки и ноги пое умовет теплою водою; иногда можно въ ванну посадить его на на нъсколько минутъ: сте положенте облегчитъ его голову и посодъйствуетъ дышанто, такъ какъ уже о семъ знать въ § 3 и 4 предыдущей главы.

ЧЛЕНЪ IV.

Явкарства противд настоящаго колотья для всяких возрастое д.

нужаг въ Всякъ знаетъ, что въ лихорадкъ, сопровожданровопу- емой сильною болью въ боку и пульсомо скорымо и жесткимо, кровопускание нужно; когда си признаки явны, то чъмъ скоръе отворена будетъ кровь, тъмъ больному будетъ лучше.

Первое первому кровопусканію должно быть обильпровопуенаніе должно быть
Обильное кровопусканіе, употребленное въ началь кообильно. лотья, гораздо болье производить желанныхъ дъйствій, нежели малыя кровопусканія, повторяемыя одно
за другимъ въ теченіе бользни. Изъ взрослаго человька
жожно выпустить крови около фунта, какъ скоро
примъчено будеть истинно, что онъ страждеть колотьемъ; а изъ кладшаго или нъжнъйшаго надобно пустить поменье.

Когда и снолько разъ надобно его повиоришь? Ежели послѣ перваго кровопускай пръзъ въ боку и другіе припадки всю продолжающей, то надобно чрезъ двѣнащать или осмнащать часовъ еще пустить крови около осьми или девяти унцій (около полуфунта), такъ какъ сказано въ главѣ 4, въ примъчаніи 4 сего Тома. Ежели и послѣ сего втораго кровопускай припадки не проходять, и кровь всю покрывается пластиного, о коей мы говорили выте, и кою опитемъ въ словѣ пластина, во всеобщей таблицѣ, въ Томѣ V: то

потребно будеть трете и даже четвертое кровопускание (2). C Jond II.

(2) Предписыват провопускание въ воспалительнымъ болванямъ дотолв, Сколькогов ришь Г. Клерав, пона пропадеть пластина, вомитаемая то пагуб. эчакомъ воспаленія, есть весьма пагубной предразсу-на въ нодонъ. Сін пластина не всегда означасть воспаленів: она примъ- лоть в пув женен въ прост и простудь и въ нрови подагряковъ; она обынювен- скать но видима бываеть въ ломомать, въ веременностяхь. Я ее видель, кровь доприблагленть онь, изкв вь началь, шань и въ нонць острымь во- толь, пона пропаабаней.

И такъ сія пластина не можеть быть побудительною причя- стина. мою ив дальтыйшему кровопусканию: общій законв, правда, есть нещістметинень, но имбеть и исиличены, нои надобно уважать. Безь сей ныя слвапредосторожностя можно изъ больнаго выпустить всю кровь, а воспа- спвід слилительная пластина всю не пропадеть; и ежели по случаю ито живь шкомь поост нешся сть такой худой операціи, то не надобно радоваться: сей ви расвидь востанія не иное что есть, кань долговременная истома.

По мивнію Г. Тиссота (смотри Наставленіе Народу) сія пластина, которая впрочемъ не всегда составляется въ колотью и восмаленіяхь груди даже сильнайшихь, зависить оть толинаго множества обстовтельствъ, что не благоразумно бы было основываться на сной для учрежденія просопусканій: и вообще, не надобно много втришь, чтобь состояние крови на торелкъ могло рашить насъ на точное суждение о настоящемь ся состояния въ тват.

и такъ одна токмо напраженность признаковъ должна нами Одна жоке руководительствовать. Когда они таковы, наковыми описаль нкв мо напрясочинитель, що не надобно болбе пущать прови; вообще ежели два женность или при пертыя провопускания учинены благовременно, п. е. на пер- признаковъ выхъ дилхъ, не счень долго одно после другаго, то редно случается должна приступать ив четверному, наипаче же ежели промв провопусканія нась побуупотреблены другія пособія, нановыя поначаны Г. Буханомі и нановыя ждать и выв же показаны будуть въ последства сего члена.

я редно имель нужду более, нежели въ прекъ провопуска. нію провожіянь, говорить Г. Тиссоть, и часто я довольствуюся двума полько пуснанія. первыми.

Надобно заменинь опносительно въ женщинамъ, впрочемъ не пуснания ето/в, накъ мущины, подверженнымъ сей болвани, и вообще всемь довольное оспальнымы бользнамь, что ежели онв подпали колотью, воспа- Канимы в нію леганий и проч. во время ихъ місячнаго очищені, то сіе об- образомъ стоятельство не должно быть препят инвіемь ни просопущоніямь, надобно жогае они двавно показующея, ни пользованию.

Ho

деть пла-

повторе-Трехъ

ношорое надобно перестать пускать KDOBb.

Время, въ Но какъ скоро боль въ боку будеть уменьшаться, пульсё будеть становиться мяконькимь, а больной станеть харкать свободно: то кровопускание будеть ненужно. Сте лъкарство ръдко бываетъ полезнымъ послъ третьяго или четвертаго дня бользни; и когда пройдеть стя нора, то ине надобно употреблять его, естьли крайнія обстоятельства только его не потребуюшЪ.

> (На примъръ: хотя бы бользнь сія многіе дни тому назадъ продолжалась, когда приступъ чинится къ пользованію ея; но ежели лихорадка и разб еще сильны, ежели дышанте трудно, ежели больной не харкаеть, или и харкаеть, да кровію: то не смотря на день, должно отворить кровь, хотябы то быль и десятой по примъру Иппократа, которой учиненнымъ вЪ осьмой день кросопусканием в спасъ Анаксатона отъ загніснія и антонова огня).

Другія средсшва, содъйствующія кровопусканіамъ къ уменьше-HIIO ВАЗНОСШИ крови.

ВпрочемЪ можно уменьшить вязкость крови многими средствами и безъ много-повторяемыхъ кровопусканій; можно даже безЪ нихЪ облегчить разб еб боку рязличными лъкарствами.

Сти лекарства суть мягтительных припарки, прикладываемыя кЪ больному мѣсту послѣ перваго или втораго кровопусканія; припарки сін ділаются слідующимЪ образомЪ:

Мигчимельныя припарки : способЪ ихъ гошо-

The section

вишь.

Возьми бузинных Б цв в тов Б Ромашковых в по горсти. Проскурняка

А ежели дома сихъ вещей не случится, то послать вы апшеку съ симъ рецентомъ:

Recipe florum sambuci Chamomilla - - - ana pugillum. A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Вари сти растентя, или другтя кактя мастительмыл въ довольномъ количествъ воды.

Положи сій таким образом сваренныя расте-их принія между двумя бёлыми тряпицами или въ фланелевой мъщечекъ и приложи теплыми къ больному мъсту.

Еще обмачивается фланель, а по недостатку ея другой салфетка во отварь сихъ растеній, и по легкомъ выжатіи прикладывается къ больному мъсту столь тенлады- илою, сколько больной можеть стерпъть. По мъръ вать, какъ фланель будеть простывать, надобно ее перемънть другою, и всякимъ образомъ смотръть, чтобъ при семъ дъйствіи больной холода не чувствовалъ.

Ежели сей видъ припарки кажется дъломъ хло-другія потливымъ, то просто можно взять бычачій пузырь, припарки налить его молокомъ и водою теплыми, и горячій приложить къ боку.

Припарки не шокмо утоляють боль, но еще по-выгоды слабляють сосуды и сопротивляются застого крови и отв сихв принарокъ.

Еще можно почасту на дни натирать больной летучая бокъ небольшимъ количествомъ слъдующей летучей мазь, ксею натирается бокъ.

Возьми масла сладкаго миндаля дв унцій, Или деревяннаго, Спирта оленьяго рога - унцію.

По Лашынъ.

Recipe olei amygdalarum dulcium, vel olei olivarum - - - vncias duas, Spiritus cornu cervi - - - vnciam;

Налей въ бутылку; тряси ее столь сильно и столь доло, пока сіи два вещества совершенно смъшаются.

Сего

ynompes-

Сего состава выливается нѣсколько капель не больной бокЪ; разводится по оному теплою или нагрѣтою рукою и крѣпко растирается, пока весь въ тѣло взойдетъ; по томъ опять выливается и растирается такимъже образомъ, пока сей мази выдетъ съ кофейную ложечку: сїя операція производится три или четыре раза въ день.

тинктура (Вмѣсто сей мази можно употреблять по такошпанских муже количеству и таким же образом в тинктуры шпанских мух (tintura cantharidum), которая производит водит такое же дъйствие, да еще и скоръе).

Сухія припарки не ванія, дівлаемыя изів поджареннаго овса, хлівба и проч; правда, онів могутів быть нівсколько полезными: одняеколько ко онів не столь вів сей болівни пригодны, сколько мокрыя.

Помъстныя ирово- лотыв от в помъстных в кровопусканий, производимых в пусканий или довольным в числом в пінидв, или рожков в на больнами рож- ном в мъстъ; и замъчено, что дъйствия сих в кровонами: вы-пусканий были и скоръе и благонадежнъе.

Можно еще сЪ пользою прикладыващь на больной нихТ. Iнсты мо- бокъ листы многихъ растений. Я часто видываль ведодой наликія действія въ колотью оть листовь молодой капуnyemm: сты, приложенных в горячими къ боку; они не токмо впособЪ ижь припослабляють части тьла, но еще производать легкую жаздывать; испарину, и могуть предохранить больнаго отв необнх 5 двйходимости въ нарывномв, къ которому однакоже наemsi. добно прибъгнуть, ежели другія пособія остались безЪ двиствія.

Время при- Ежели послё повторенных в кровопусканий, послё кладывать припароко и других средство, предписанных в в чле- марывые: нё о пищеупотреблении и лекарствахо, колотье в в бо-

ку всю продолжается, то къ больному мѣсту надоб-времени но приложить нарывное, и оставить его туть на два надобно его держать дни. Оно не токмо производить выпоражниванте изъ на боль-того мѣста, но еще разбиваеть спазмо или корту, номъ мъси чрезъ то помогаеть природъ къ изгнантю причины стъ бользни.

Для предупрежденія трудности при мотеиспусканіи, не рёдко производимой парывнымо, больному надобно обильно давать пить емульсіи Я рабской камёди, слёдующим вобразом в:

Возьми сладкаго миндаля

(amygdalarum dulcium) двъ унцін;

Положи ее въ горячую воду, чтобъ можно было водрать кожицу; толки крепче въ иготе или ступке съ равнымъ количествомъ сахара; приготовь четыре фунта ягнаго отвара теплаго, въ которой прибавь Ярабской камеди - две унци;

Мъшай, чтобъ она распустилась; простуди; влей вію жидкость понемножку на миндалз и сахарб, смътанныя вмъстъ, притомъ мъшай безпрестанно, пока жидкость сдълается равно бълою или молочною; процъди: больной это долженъ употреблять вмъсто обыкновеннато своего питья.

Ежели у больнаго запорв, то повседневно надо- Средство бно ему давать пролывание, составляемое изб овсяной послабили ячной воды, въ коей варенъ проскуриякв, или ромать жа, и другое какое нибудь мягтительное растение. Сте пролывание не только опорознить кишки, но еще промаведеть то же дъйстве, какое бываеть отъ теплия припарокв, приложенныхъ къ теревамв подбрюшия, и чрезъ то оттянеть сокъ отъ груди (3).

С 3

⁽в) Сія причина должна дать чувствовать нужду промываній въ сей постубользня, такъ накъ и во вськъ бользияхь сосполниельнымы и сопро- пать въ вождае- разсужде-.

Средство производишь моканје.

Для произведенія мокротохарканія или харкотинъ надобно больному давать лекарствъ мокроторазбиваиротожер- тельныхв, масляныхв и склизистыхв, каково есть слъдующее:

> Возьми оксимеля или сциллитического уксуса - - унцію, Груднаго декокта - - шесть унцій.

По лашынь:

Recipe oxymelis aut aceti scillitici - - vnciam, Decoctionis pectoralis - - fex uncias;

Смъшай: больной сего состава долженЪ принимашь по двв ложки чрезъ каждые два часа.

Ежели сциллишическія, ш. е. дълаемыя изъ морскаго лука лекаретва противны желудку больнаго, то надобно ему дать масляной эмульсии или вывсто ея следующее лекарство.

Масляной элентузрій.

Возьми масла сладкаго миндаля, по дев Или деревяннаго, в унции.

По лашынь:

Recipe olei amygdalarum dulcium, ana aut olivarum - - -Syrupi violarum - - -

CMB-

нін женщин , у коихъ илупъ мъ-Сячныя? Нужд2 пр: мываній въ кс-Acmst. Признани, показуюmie npoмываніе вЪ лихорадечных 5 60льзняхъ.

вождаемых в гинлостію; и такъ мы за нужное почитаемъ советовать давать въ сихъ бользняхъ повседневно въ продолжени первыхъ пяти дней промывание, хетя бы впрочемъ у больчаго и не было запора; а ежели бы быль, то бы надлежало наставлять его поутру и вечеру.

Простой наредв, говорить Г. Тиссоть, не любить промываний; однако же нішь полезите локарстов вы лихорадочных бользияхь, а наипаче естьян мочт не обильна, или ежели она прасна; ежели у больнаго есть вредь, ежели лихорадка сильна, ежели боль въ головъ и поясниць нер чиша, ежели жизоть болить: во всткъ сихъ случаяхъ промыванія обыкновенно болье помогають, нежели ногда бы пито было четыре или пать разъ толикое же количество жидности; но по прошествін патаго дил не надобно его наставлять: потому что сін обыльния выпоражинванія попреплітетвовали бы мопрото - жарканію, Стмой Иппонрать удерживался оть сныкъ, какъ скоро больной начиналь харкать, накь - по мы покажемь въ примъчанія 2 сябдующей главыСмъщай; прибавь столько леденца, сколько потребно для составлентя электуартя, густотою похожако на патоку.

Больной должен в почасту принимать сего состава по маленькой ложичкв, а особливо ежели умучился кашлемо.

Есть некоторые люди, коим в отв масла становится дурно и производить вы них в тошноту, что и нередко случается: тогда надобно имы дать диссолюции (распущения) аммонитеской камеди вы ягной воды.

Вошь какимь образонь она дълается:

Возьми аммонгатеской камвди - - двы драхмы граспуще-Разомни совершенно вы ступкы; влей всегда мы- ніе аммошая, полфунта ятнаго декокта, пока камвды совсымы намыдиреспуститея. Можно прибавить туда четыре унціи простой перегнанной пулейной воды (aquæ distillatæ simplicis pulegii).

Ежели больной не испаряето; ежели напрошив Средство того жгучій жарь чувствуется на кожь: то надобно возбудать ньсколько пріемцовь перетищенной селитры и кам-чу и исфоры, составляемых сльдующимь образомь:

Возьии перегищенной селитры - - двъ драхмы, Камфоры - - пять или шесть грановъ.

По Лапынь:

Recipe nitri purificati - - drachmas duas,

Camphoræ - - quinque vel sex grana;

Истолки сти два вещества, смъщай хорошенько, раздъли на шесть равных в приемов в.

Больной долженъ принамать по пріему чрезъ каждые пять или шесть часовъ въ нъсколькихъ ложкахъ обыкновеннаго его питья.

Мы упомянемь только объ одномь лекаретев; помитально которое накоторыми людьми почитается за собственнодвиствующее прошив колотья: мы разумвемь завсь отвард полигалы виргингиской (pol galæ virgina).

> Возьми кория виргинейской полигалы - - унцію; Вари ее въ фунть съ половиною воды дотоль, пока останется только фунть; пусть устоится: процади.

Когда и канъ надобио его предписы-Bamb?

По учиненій пристойных в кровопусканій, да не опустивь и д угихь выпоражнивании, дается больному три или четыре раза въ день по три или четыре ложки сего отвара, болве или менве, глядя по тому, какЪ желудокъ его можетъ сперпъть. Ежели это лъкарство причилить рвоту, то надобно смешать съ симь отвароль двв или при унции простой коришневой воды, или давать его только по маленькому пріемцу.

Важность сего лвнар-CERBS.

КакЪ сей отварб пособляетъ испаренто, возбуждаеть могу и послабляеть животь: то онь можеть выполнить большую часть показаній въ пользованіи колотья и других в воспалительных бользиях в груди.

Конечно никто не подумаеть, что недобно упо-ARR Sero предписытреблять всё еїн лекарства вдругь. Ежели мы одобвает я неряемъ многія изъ нихъ, то сіе на тотъ конець, Man'e VIIчтобъ можно было избрать любое, и ежели не нахо-CAO ABкарств в в В дишся того, на которое есть решительность, тобъ одной и употребить другое: впрочемъ разные обороны болътой же зни пребують разных в лекарство; и ежели одно ка-. бол Бэни! кое нибудь осталось недействительный, или противно больному, то надобно прибъгнуть къ другому (4)

Мину-

Они не дол- (4) Сіе наставленіе весьма важно. Сколь ни превосходны суть сін абхар. етва, польно больной подвергнется опасности, ежели они ему дажиы предвзем с булуть безь порядия и безь разума. Мы уже о семь говориписываемы -быть безЪ ан: абкаретва даже вильявишія не пначе удающем, канъ ногав порадка. yno-

Минута, въ которую какая нибудь острая бо-погрынельзнь дошла, такъ сказать, до своей зрълости, и ко-сти, въ наторая называется крисисомо или переломомо, сопротаетъ

Т

вож-страхъ,
причиненны перело-

употребляемы будуть приличнымь образомь. И такь надобно, узнавь момь. совершенно изложенный способь выше сего вы примычания с главы 4 сего Тома, по которому слыдоваль Иппократь вы пользовании острымы бользаней, никогда не упускать изы вида порядокь, по которому Г. Бужань предписываеть свои лыкарства.

Мы видели въ ликорадив везпрерывной острой, видели въ Каному помолотьо, да увидимъ и во всекъ воспалительных болезаяхъ, что рядну напервое ихъ лекар то есть провопускание, которое не можеть быть дебно сленовторлемо по прошестви двухъ или трехъ первыхъ дей. Мы виде- дов ть въ
ли, что въ перемежающихся ликорадиахъ, да и еще увидимъ, что болезняхъ
во всекъ болезняхъ мокротныхъ или гнилаго рода, первымъ лекар- воспалиствомъ есть реотное, которое также не можеть быть поет раемо, тельныхъ
какъ разве въ первые два дни; потому что какъ провопускания и и м ир т.
реотныя суть такія лекарства, коихъ скорыя действія сопровождают- ныхъ ?
ся большею или меньшею стреми печьностію болезни, то они требують
со стороны больнаго немалаго степени силы, которыя тотчась нетощается болезнію.

ВЬ бользняхь острыхь, предстивляющих призначи смушин- Вь сихь мые, т. е. призначи, показывающе воспалене и измищество мо- авухь винерть, какь то често случется примучеть вь практивь, надобно дахь босперва приступать къ сильныйшимь припадкамь. Ежели господ- льзаей, ствуеть воспалене, то надобно сперза отворить кровь, а на дру- спутан гой день дать ипекануанги; а ежели оказываются примытье, силь- ныхь выбыть, призначи измищества соковь, то надлежить начать со реот- ств. наго, откладывая провопускание до слыдующаго дня. Рыдко случеть ся повторять одно или другое изь сихь лымарствь; потому что снам природы, будучи раздылены между двумя различными причинами, мосуть имьть только посредственной степень напраженности.

Но когда уже однажды предписано то или другое изъ сихъ Надобно льнарствь, или оба, нанъ то въ уномянутыхъ теперь нами случа сбожд ть яхт: то не надобно давать какое нибуль другое. Надобно тертъ ино дъйсти ја ожидать дъйсти ја первыхт; надобно только пологать имъ обильнами предписантитьми, промываниями, умовениями ногь, другими способами, кои наго лънаржасаются до пищеупотребленія, и коими надобно заниматься съ на ст з, прежагала бользии до выздоровленія, о которомъ мы толковали въ главъ де нежели 2 \$ 3 сего Тома, потому что сін предметы суть только пособіа, присту-

вождается иногда величайшею трудностію въ дышаніи, пульсомо непорядотнымо, движеніями кортными и проч. такими признаками, кои удобно могуть привесть

имшь иъ аругому. кои располагають тьло вы действительности лекарствы, пособляють ихь силь, и ежели принимаемы бывають вы надлежащемь количествы и чрезы потребное время, то часто дылають, что больной безы всякаго другаго пособія обойтися можеть.

ПорядокЪ, изковому надобао поелъдовать въ предписания лъизретвъ из колотье»

Однако же естьян въ колоть, бользии, о которой въ сей главъ идеть дъло, на другой день послъ провопусканія, или, естьли нужно было его повторить, после последниго провопускания, не примвчено будень, чтобь жестокость припадновь уменьшалась; естьли напрошивъ примъшно, что они болье еще усиливаются: то падобно употребять пригрованія, пригория; и ежели и они чрезъ сутни не доставять сблегченія, то надобно прибогнуть къ предписанной выше сего летучей мази. Сте по той причинъ наблюдаемо быть должно, что всесбщій законь, оть котораго никогда не должно удаляться въ большей части бользней, а наиначе въ бользняхъ острымь, повельваеть всегда начинать съ лекарствь проствиших в прінтивищимь; а яб дбятельнымь или сильнымь тогда только приступать, когда первыя остались недвиствительными. И такъ видно, что не иначе надобно приступать къ нарыеному, котя впрочемъ съ наблюдениемъ предписаним хЪ предосторожностей, какъ развъ въ шакихъ случадхъ, въ коихъ мазь и другія пособія свонкъ дъйствій не оказали.

Что насается до прочих в ланарствь, возбуждающих варкотину, то, ежели только не будуть крайніе припадки, надобло сбождать того, чтобь приграванія, или припарки, или магь, или нарывное произвели свое дайствів, чего надалться можно черезь одинь или черезь два дни: тогда можно уже дать какое набудь изь трехь лакарствь, предложенных выше вь семь \$, ное больному лучте полюбится, или ное удобное можно будеть достать. Порошокь, составляемый изь селитры и камфоры, должно давать вь означениыхь только Г. Бухансть случаяхь; а что каслется до полигалы, то пусть, кто хочеть, ее и употребляеть.

Тановъ есиъ кодъ, которой надобно наблюдать въ предписания лекарствъ на сто болевнь. Онъ долженъ служить основаниемъ на все аругія острыя болевнь.

Мы бы выступили изъ назначенныхъ намъ предъловъ, естьли бы захотьли говорить о встхъ сихъ бользияхъ. Естьли ито хотя малосмыслень, тоть уразумъетъ приложить все выше нами сиззание къ пользованию слъдующихъ бользией: иадобно только строго по-

весть въ ужасъ предстоящихъ, и кои часто побуждають ихь предпринимань дела весьма противныя больному, какъ- то пускать изъ него кровь, давать ему лъкарства сильныя и раздражающія и проч.

Однако веж сти припадки производящея шолько уси-Канимъ ліями природы, домогающейся побъдинь бользнь; уси-надобно поліями, коимъ надобно еще помогать обильными мокро-ступать тожи дительными пипіями, особенно тогда нужными. въ мину-Но ежели силы больнаго истощены бользнію, то вы кома? семЪ случав можно поддержань его небольшимЪ количествомъ сыворотки съ винограднымъ винолю, негуса и проч.

Когда боли и ликоралка пройдушь, а больной минуша возвратить изсколько своих в силь, т. е. вступить прочивъ выздоравливание: то надобно ему дать легкое слабительное, такое на примъръ, которое мы присовъпровали на исходъ лихорадки безпрерывной - острой въ Гл. 4, § 5.

N 2.

О колотыв ненастоящем в или ложном в.

Ненастоящима или ложныма колотвема назы-знани наи вается то, коего гивздо на наружь болье нахо-свойство лится, нежели какъ въ настоящемо колотъв су-нолотья. • хомб или мокромб, о коемь мы выше толковали: по-

To

чему

Однако мы не хошимъ ушаншь, что сколь ни простъ сей Попребно кодъ, но пребуеть еще вниманія, къ копторому не всякой человъкъ вниманіе и способенъ. И макъ не безъ причины сказано въ гл. т, примъч. 4 сего ост рож-Тома, что хотя пищеупотревление можеть употребляемо быть всь- ность при ми людьми, не абкарешва должны предписываемы бышь шолько предписалюдьми просвъщенивишими и остороживишими.

ніи ивкарешвъ. чему въ ложномо колотъ боль наиначе чувствуется въ между - реберныхо мышицахо (5).

кто оному Люди, подверженные двумЪ выше нами означенполверженЪ: и сему.

ЧЛЕНЪ І.

Признаки ненастоящаго колотья.

Оно обнаруживается кашлемо сухимо, пульсомо скорымо и трудностію лечи на больной бокъ; сей послъдній признакъ тъмъ замьчанія достойнье, что онъ не всегда встрьчается въ настоящемо колотав.

ЧЛЕНЪ II.

Пользование ненастоящаго колотья.

Макъ оно льчится держантемъ себя чрезъ ньсколько льчится? дней въ тепъв, обильнымъ принимантемъ мокротожи дительных питти и ньсколько возбуждающихъ испарину, какъ-то настоемъ съ бузинными цевтами и проч. и наблюдентемъ приличнаго нищеупотреблентя, такого на примъръ, какое предписано въ членъ III § 1 сея

нужныя Однако иногда сія бользнь дълается упорною. ногда оно въз семь случав надобно прибынуть къ кровопусканію, упорно.

главы.

⁽⁵⁾ Прудь, служащая легиимь выбето илетии, сложена изъ дватцати четырехъ реверь, имъющихъ движимость, ноторую они получили отъ образа, по коему прицъплены иъ спиниой кости; и сіи ревра въ ихъ движеніяхъ помогаемы бывають велинимь числемь мышиць, въ томь числъ и междуреверныхь: потому что мышцы груди суть тролиія: одни надреверныя, мъстоположеніе имъющія на самой вибшной поверхности реверь; междуреверныя, находищілся между наждымь ревромь, и подреверныя, занимающія мъсто на внутренней поверхности реверь.

къ банкамо, рожкамо съ надсъканіемъ больнаго мъста, и къ другимъ пособіямъ, предложеннымъ противу настоящаго колотья въ членъ IV, у г сей главы : сій лъкарства, да еще питія селитряныя и прохладительныя ръдко не выльчивають.

1 3.

О воспалении грудобрюшной перегородки, называющейся длафрагмою.

Воспаление грудобрюшной перегородки столь близ-Сходетво, ко подходить къ колотью какъ въ разсуждени призна-ся между ковъ, такъ и въ разсуждени пользования, что едвали сею бользнужно объ ономъ разсуждать какъ объ особенной нію и ко-бользни (6).

ЧЛЕНЪ І.

Особенные признаки сей бользни.

Оно сопровождается лихорадкою весьма острою, жестокою болью въ больномъ мъсть, которая вообще умножается при кашляніи, при чиханіи, при дышаніи, при глотаніи яствъ, при испражнении себя низомъ, при испусканіи моти и проч. По сей-то причинъ у Т 3

⁽⁶⁾ Грудоврюшная перегородка или діафрагма есть одно изб орудій дыханіл: она опять покрывается внутренною грудною оболочкою или плеерою вь томь мьсть, гав у нась лонаточна подь грудью; и та упомячуття перегородка больс или менье поражается въ бользияхь сей части тьла: по сей-то также причинь воспаленіе діафрагмы представляєть болье или менье признаковь, означающихь колотье, и по оной же, Г. Бухань говорить, что стараяся выльчинь колотье, можно выльчить и онов воспаленіе.

Воспаление грудобрюшной перегородии есть бользнь весьма острая и весьма чувствительная; потому что сія перегородка, иромъ того, что с стоить частію изь тендиннаго устроенія, еще снабжена весьма великимь количествомь нервь: оть сего-то происходить величийтая ен чувствительность и жестокость принадковь, представляемыхь ся бользнями.

больнаго дышаніе бываеть коротко: онь дышеть ственяя себв грудь, дабы избъгнуть сжатія діафрагмы: у него сна нъть; кашель у него сухой, икота, и часто бредо. Сардскій смьхо, или лучше сказать, нъкоторое непроизвольное кривлянье, есть весьма обыкновенной признакь вы сей бользии: по сей-то причинь, какы кажется, названа она по Гречески и по латынь парафренесисомь.

YAEHD II.

Пользование сей бользии.

что наипаче напаче надобно преддобно предму что ежели это нещасти случится, то не возможщать въ но будеть спасти больнаго.

HR?

Пищеупотребление и лъкарства во всемъ суть такія же, каковыя предложены противъ колотья въ членъ III и IV, § 1 сей главы.

мягчимягчимягчимягчинельныя промыванія особенно полезны; пошому
пельных
промывапромываніяхъ. от больнаго мъста.

ГЛАВА 6.

О раглитных видах воспаленія легких, называемаго у Врасей перипневмонівю.

§ I.

О настоящемо воспалении легкихв.

тат находишся гнтэло сей 60ходишся въ легкихо; шо оно всегда сопровождается опасностію.

Люди,

Люди, у коихъ много крови, у коихъ она густа, кто наиу коихъ волонии раздулись и оцъпенъли, кои пишающподверсл нешвами грубыми, кои пьютъ напитки кръпкіе и женъ:
влзкіе, весьма подвержены воспаленію легкихъ. Оно
обыкновенно опасною бываетъ для тъхъ, у коихъ
грудь плоска, или слишкомъ узка, такъ какъ сказано
въ главъ 5, № 1, членъ I сего Тома, или кои страждуть одышкого, а наиначе естьли они гораздо ужъ
въ пожилыхъ лътахъ.

Иногда воспаление касается только одной половинки легкихо, а иногда и объихъ половинокъ; въ послъднемъ случав оно почти всегда бываетъ губительно.

Когда сія бользиь причинена клейкою мокротою, какъ она засорившею и завалившею сосудцы легкихв, що назы-разавляется вается воспаленіемв легкихв ложнымв или непастоя-нается: иммв. Ежели она происходить оть скола влажности вдхой, що называется воспаленіемв мокротиымв и проч.

члень І.

Присины настоящаго соспаленія легкихв.

Воспаление легких иногда бываеть бользни глав-причины мою, первоначальною или существенною; а иногда сим-колотья итоматитескою, или посльдствем других вользней, же, ком как в то жабы, колотья и проч. Оно происходить от бывають тьх в же причинь, от коих в колотье, т. е. от оставность новки испарения, причиненной холодом в, мокрым в платьем и проч, также от движения крови, усугубленнаго непомърным твло движением, употреблением пряностей, горящих спиртово, т. е. водок в проч.

Жолотье и воспаление легких часто спутывают когда нася выбеть; тогда сия бользыь называется плевро зывается перипневлониею.

ЧЛЕНЬ мониею:

члень п.

Признаки настоящаго воспаленія легкихд.

ВЪ чемъ Большая часть признаково колотья, описанных вы II члень, я предыдущей главы, находится также сть при- и вы воспалении легкихо. Однако же вы семы послъднемы знановы пульсо бываеты мяконеко, а боли не столь острыя; но за то трудность вы дышанти и тяжесть вы груди вообще суть большія (1).

(Прежде нежели приступишь кЪ дальныйшему чтенію, читай і и 2 главы сего Тома.)

ЧЛЕНЬ III.

Пользование воспаления легких для всякаго возраста.

Какъ пищеупотребление и лекарства должны быть вы воспалении легкихо ть же, что вы колоть то, ное въ ко-дабы не повторять того же, отсыляемы читателя къ пользованию колотья, описанному вы член. ПП и IV, у предыдущей гл.

жны быть вить, что яства должны быть слабъйшими, легчайшими въ воспалении легкихв, нежели во всякой другой воспалительной бользни.

Уче-

⁽¹⁾ По сему существенный знань, раздыляющій соспаленіе леганяю оть колотья, состоить тольно вы напряженности признановь, относлішихся ні дышанію: по всему другому они смішиваются ві практинь. Воть сіе то заставило сказать Г. Тиссота и всёхь другихь иснусных практиновь, что сіи дві болізни не суть различны между собою; что ві той и ві лругой причиною есть соспаленіе леганяю, и что ві колоть сіе соспаленіе можеть быть внішнее. По сей же причині и Г. Лістодь утвержласть, что изі великаго числа людей, умершихь сті соспаленів груди, нашель онь только двухь, нои страдали настолюцью колотьемь.

Ученый Арбушношь ушверждаешь, что одной важность только сыворотки довольно для поддержанія больнаго, ки, ячнаи что отвара ясной, или настой корня феникула в в го отвара; молокв и водв могуть больному служить вместо или настоя феяство и питія. никула съ молокомЪ.

Онъ похваляеть еще паръ отъ шеплой воды, паръ отъ впускаемой въ грудь посредствомъ воронки, или такъ теплой восказать, вдыхальника, коего описанте находится во все- ды, впуобщей таблиць, въ Томь V. Сей паръ въ разсуж-грудь. деній легких весть то же, что в разсужденій вившних в частей твла суть припарки, присов в тованныя въ колотъв въ главъ 5, б г сего Тома. Сей паръего дъкутончасть и разбиваеть густыя мокроты, кои за-ствія. саривають легкія.

Ежели больнаго слабить, но притомъ такъ, не надобчто сте выпоражниванте не обезсиливаеть его: то не но оста. шокмо не надобно останавливать его, но еще и по-выпоражсоблять ему посредством в мястительных промываний, ниванія

Ежели больной не харкаетв, то пусть отво ногла они ряшь ему кровь и новшоряшь стю операцтю столько, дивають сколько силы его позволять (2).

JoME II.

Канъ и Для ногда надобно отворяшь

не обезси-

больнаго.

(2) Внимай, что говорить сочинитель: ежели кольной не жар- кровь? жаеть; потому что ежели жаризеть, то кросопускание дълзется про- Опасности шивнымъ. Въ числъ шести случаевъ, представленныхъ Клеркомъ въ отъ кроглавь 2, въ примъч. 6 сего Тома, въ коихъ просопускание причиня-вопускаеть часто смерть больнаго, помъстиль онь, какь мы видьли, воспа- нія, когда леніе легинкь, въ коемъ больной каркаеть удобно, котя бы ликорадка больной была и сильна. жаркаетъ

Причина тому та, что какое нибудь сыпоражинение въ при- удобнородъ не можеть иначе имъть мъста, какъ на щеть другаго; и наблюде- Для чего ? ніе доказало, что сія истинна, дознанная въ разсужденіи провяныхь емпоражниваній, таковою же была относительно и къ тъмъ, кои сущь не простимия. Были примъры, что просопускание останавливало

Слабительныя и промывамія Для содержанія живота на свободь надобно давать слабительных и употреблять промываніе.

AAR

понось, коего остановка причинила гнилыя ликорадии. Я видьль, что два грана реотнаго, данные нъкимъ невъждою для приданія силы нъкоторому не очень дъйствующему лъкарству, потому что оно было очень сильно, тотчась остановили его дъйствіе, произведти реоту.

Сабдетвія от в остановни каркотинв, вм вющей произойти от в кровожусканій.

И такъ ежели кто пустить кровь вь воспалении легинив тогда, когда токоротохаркание уже уставилось и каркотины выходять свободно, то не подвергается ли тоть, кромь того, что несоходимо лишить силь больнаго, опасности оставляющее переломь въ сей бользни? и что должно изъ того последовать? То, что или матерія каркотинь перейдеть вь составь прови, гдь она причинить болье или менье опустошеній, или останется вь груди, и тогда она произведеть сволочь мокроть, ноторая, ежели не удушить больнаго, то доведеть его до чахотинь.

то восналеній легжих в, коих в надобно лечить без в кровомусканія. Колиное множество уахотовъ произошло отъ кровопусконій! наное есть восполеніе легиня, ноторов бы осмёливались лечить безъ кровопусканія! Однано мало ли изъ нихъ танихъ, въ ноихъ больной свободно харизеть? Налобно посмотрёть на малое тольно число больныхъ для убъжденія себя въ сей истинить. Что насается до меня, те я имъль случай узнать ее заблаговременно. Обязань будучи еще въ молодыхъ лётахъ, по приказанію одного Лекаря Париженаго фанультена, пользовать нёноторую часть больных одного больнаго прихода, не оставляль я лечить воспаленія легиня всянаго вида; поемину сія бользив весьма обынновенна между тёми, нои занимаются тяжними работами.

А всегда усматриваль, что однего или двухь провопуснаній девольно было вь тьхь воспаленіямь, вь коихь больной не хариаль, или и хариаль, до тольно провью; а напротивь того вь тьхь, вь коихь больной удобно хариаль, провопуснанія подавали случай кънещаетньйшимь последствіямь. Тогда покинуль я простонародной способь; и я могу сказать, что снолько разь я ни призывань быль ев самаго начала больни, то она нинаного не имъла нещастнаго последствія. Изъ всехь примеровь, кои могь бы я привести, помещу здесь тольно одинь, доназывающій купно в то, что я утверждаю, и силу природы вь целени бользней.

Rpuntph.

Г. де Гренобль 14 Февраля 1776 впаль въ бользив. Нъимо молодой Хирургъ изъ сосъдсива иъ нему призвань: онъ предписываемъ Для произведения мокротохаркания надобно дазапь черезъ четыре часа по двъ ложки диссолюции У 2

еть ему отварь и питіе изь масла сладкаго миндаля и сиропа; онь продолжаєть сіе же льнарство и сльдующаго дня; но изь страха, кли осторожности крови не пускаєть, и на третій день поутру требуеть доктора. Я нашель вь больномь сильную лихорадку; но пульсь, котя возвышенной и полной, быль гивокь и мяговь: вь боку у нето была боль крайне острая, а начиваче между лашлемь; но карлотины были очень обильныя, хорошо связанныя и цвыта красноватаго. Больной просиль пить, чувствоваль боль вь головь, вь спинь, вь поясниць, и не спаль. Я узналь, что сь шесть мъсяцовь велел у него кашель обычайной и очень частой, а особливо поутру, вь которое но томь выходило много каркотинь.

Я его посадиль на строжайшую діэту, запретивь даже и бульгонь: я приназаль ему употреблять только кашицу изь перлочыхь крупь сь медомь, которую подквашивали смородиннымь желеемь; я векъль тереть больной бокь много разь вы день тинитурою шпанскихь мухь (tincture cantaridum); я предписаль ему питье, восщавалемое ельдующимь образомь:

Возьми перегнанной соды огурешной трасы че-

шыре унции,

Средожва

произво-

жинь мо-

крошожар-

Стиллитического или лукоморского опсимеля - - - унціо,

Минеральнаго жермеса - четыре грана; каніе. Смещай.

По Лашынъ:

Recipe aqua distillata borraginis, vacias qua-

Oxymelis feillitici - - vnciam Kermetis mineralis - - - grana quatuor, Misce

Больной принималь сего чрезь чась. Я приказаль больному опуснать ноги вы теплую воду два раза вы день. Оны употребляль два промыванія вы день, и пиль по полурюмит кашицы чрезь четверть часа.

Та ночь была ему спокойнёе, нежели прошлая: онв спадв два таса въ различные пріемы. На другой день вст припадки уменьшились въ напряженности, а каркотины были и обильнёе и эрълее. На третій день, которой быль илтымъ его бользии, больной почувствоваль

окоже

аммонгатеской камвди, одобренной противъ колотъл въ гл. 5, § 1 член. IV сего Тома.

Когда

около пяти часовъ вечера весьма жестоное удосеніе, продолжавшееся даже до шестаго утра. Во время сего удвоенія каркотины, становясь всегда обильнъйшими, были еще и кровавыми; но по прошествіи приступа больной почувствоваль таное облегченіе, нановаго онь до того никогда не чувствоваль, и ликорадна нарочито уменьшалась. Сіе благосостояніе продолжалось чрезь всю слъдующую ночь, въ которую онь спаль болье четырежь часовь за два пріема: каркотикы воспріяли свой первой цвъть.

ВЪ седьмой день поутру больной началь чувствовать здоровье, но онь быль очень слабь. Я ему даль бульйну, ноторой повторень быль около полудня: но я не приназаль ему болье въ тоть день давать; потому что я ожидаль новаго удосенія, которое и въ самой вещи случилось, но уже поэже, нежели въ пятой день, да и несравненно слабже и короче: оно перестало около двухь часовъ утра. Больной попросиль бульйна, и спаль три часа сряду. Вставши оть сна, онь не имъль уже боли ни въ головъ, ни въ спинъ, ни въ боку: онь жариаль много, но почти и не кашляя; и его харкотина, которая очень была жидиа, имъла цвъть слегка только красноват й. Удосежня не было въ девятой день, въ которой прошли всъ припадки.

Какъ промыванія, состоявшія изъ простой только воды, производили чрезь все теченіє бользни удивительное дъйствіе, и нань они спустя нъсколько дней обильно выгоняли пропектіяся матеріи, то е весьма связныя и цвъта желто - свътлаго, то я предписаль славительное для утра следующаго дни: оно повторено было на тринатуатомъ или пятнатуатомъ дни бользни; и больной, не испытевь обычновенной слабоети выздоравливающимъ посль подобной бользни, вышель изъ дому, спустя два дни посль третьяго дня прочищенія.

Мы бы могли помъстить немалое число примъчаній здъсь; но это оставляемь, боясь, чтобь не вывесть изъ терпьнія читателя. Мы то тольно позволимь себъ замътить, что особенной ходь сей бользни, успъхь и маловременность выгодоравливанія, за оною послъдовавшая, произошли найь от простоты и малаго ноличества льнарствь, мною употребленныхь, такь и от послушливости больнаго, исторой и сам удучи увърень о нуждь дівты, питій и промываній вы сихь случадхь, все это исполняль сь строжайшею точностію.

Когда воспаление легких не уступаеть ни крово- Воспахение пусканію, ни нарывнымв, предписаннымь выше сего, неуступани другимъ выпоражниваниямов: то обыкновенно окан-ющее льчивается абсцессом в или нарывомв, которой бывает в нарет. болье или менье опаснымь, смотря на часть груди, вамь, онанны В занимаемую.

абсцессомЪ или нарывом Б.

Ежели абсцесс сядеть на внутренной грудной Разные оболочкъ (плевръ), то иногда онъ выходить нару-способы, жу и составляеть на поверхности бока рану, посред- сей нарывъ ством в которой выльчивается; а ежели займеть мьсто можеть въ составъ легкихв, то матерія можеть выпорознить-выльчиться посредствомъ харкотинг. Но ежели гной разо-ся. льется въ самой впадинъ груди, т. е. между плеврою и легкими, тогда не можно ее оттуда иначе вынять, какЪ развъ сдъланіемЪ отверстія между ребрами (сочинитель толкуеть о сихъ трехъ способахъ, по которым выпоражнивается матерія абсцесса или нарыва въ концъ слъдующей главы).

Но когда вст примъты возвъщають, что воспа- Знаки, изление разсвялось, а у больнаго силы еще не возвра-въщающие щающся; когда пулься продолжаеть быть скорымя, чтобь сіл хотя и мягкимо; когда дышание всю трудно и тя-бользнь не жесть ни мало не проходить; когда больной время нончилась отъ времени чувствуетъ о нобо; когда щеки становяшся у него красными, губы сухими, и онъ жалуешся на жажду, хошя всть и не хочеть: то весьма можно боящься, чтобъ загнівнів, которов симъ состояніем возвъщается, не нослъдуемо было тахоткого, которою мы будемЪ заниматься, поговоривЪ ивсколько о ненастоящемо или ложномо воспалении лвекихв.

§ 2.

О ненастоящемо или ложномо воспалении легкихв.

Свойство Мы уже замѣтили, что ложное соспаленіе лесего воспа-кихб причиняєтся мокротою в дкою или вязкою, кото-кихъ. рая заваливаеть собою сосуды легкихв. Оно удруча-кто оно- еть только стариковь, немощныхь и многокроснаго му пол-темперамента людей, наипаче же зимою и въ мокрыя погоды.

ЧЛЕНЪ І.

Признаки ложнаго воспаленія легкихб.

ВЪ началь сей бользии больной чувствуетъ померемьно холодъ и жаръ; пульсо у него мало и скоро; онъ чувствуетъ тяжесть въ груди; дышанте трудне. Онъ иногда жалуется наболь въ головь, сопровождаемую золовок ружение мо; однако цвътъ его очень мало перемънился; мога у него обыкновенно блъдная.

YAEHD IL

Пищеупотребление, каковое на добно предписывать вы ложномы воспалении легкихы.

жий должий выть вы настоящемо воспалении легкихо, должно быть весьма легкимы; ястеа должны состоять изы слабыхы
только бульбоновь, поощренныхы лимоннымо или по.
меранцовымо сокомо; питье должно состоять изы
крупяной воды, подслащенной медомо, или изы отвара корней феникула и солодки. Корня феникула и солодки берется на сте по унцти, которыя варятся вы
трехы фунтахы воды дотоль, доколь останется
только два фунта; сте питте подкисливается смородениымо желеемо и проч.

члень ІІІ.

Пъкарства, кои надобно предписывать еб лож-

Кросопускание (3), реотныя и тистительных при-когае наличны вообще вы началь сей бользни; но они бывають сенать тогда излишними, ежели харкотина густа, или, какв кровь и говорять, пропеклась (4). Тогда надобно помогать прочитолько мокротохарканию какими нибудь легкими баль-щатьзамитескими лекарствами, одобренными кв сему случаю вы колотев, какв-то сциллититескимо оксимелемо, диссолюциею аммонитеской камеди и проч., прединсанными выше сего вы главь 5, у и сего Тома.

Жарывныя вообще весьма дъйствительны, и дол-важность жны заблаговременно прилагаемы быть. Ихъ можно нарыв- ныхъ, при- прикладывать или къ затылку, или къ икрамъ ногъ, кладыва- или къ объимъ вдругъ, ежели обстоящельства то- емыхъ за- го потребуетъ (5).

ГЛА-

вляють. При харианіи выметываєтья она скоро, легко и облегчаєть и промы-

COABIATO.

⁽в) Въ сей бользии провь пуснать можно не иначе, какъ съ великою кровопуосторожностію. Возрасть и жемпераменть людей оною обынновенно сканіе радетраждущих в; пора и погода, въ которыя она открывается, при- кобываетъ падни, оную сопровожазющіе, вообще не показують сего дъйствіл нужнымь Кровопусканів, говорить Г. Лівтодь, въ оной бываеть ръдко нуж- въ сей банымв, хоня спепень пажести кажется онаго часто пребующимв. явани. Оно, правда, можеть доставить минутное облегчение: но за то боявань двлаемъ тягчайшею, и прайнь обезсиливаеть больныхъ. Можно гораздо болыную получить пользу от впеканунги (рвотнаго), нап. Ипенакупаче естьян у больнаго есть тошнота и позывы на реоту. Но сла. анга чаще вительныя, а наиначе медь, и чистительныя промывания повщо- въ оной раемыя всегда вь оной употребляются сь пользою. показует-(4) Вошь знаки пропеншейся, или лучше сказать, соэрвешей каркоти. сл, шакъ им: она связна, цавту бъложелтаго, густа, и нажется состоящею изъ одного только вещества, хотя въ самой вещи многія ее соста-

^(6) Сей совъть весьма важень относительно къ сей бользки и къ нъкожерымь другимь, о ноторых в мы не забудемь дать знать, а особливо пъ тъмъ

ГЛАВА 7.

O различных видах в тахотки и о измождении или истощании.

§ 1.

О кахоткв, собственно такв называемой.

Свойство Сахотка есть такая бользнь, которая измождачахотни, еть и снъдаеть все тьло (1). Она есть слъдствіконкь она емь вереда, или шишетекв, или сростовв вы легкихв есть слъд-(2); она также можеть произойти оть нарыва, оть етвіемь. первной сухотки, оть худосотія и проч.

Сколь сіл бользнь смершоносиз, Докторъ Арбутнотъ замъчаеть, что въ его время тахотка похищала болье десятой части людей, умиравшихъ въ Лондонь и его окрестностяхъ. Можно не безъ причины думать, что она нынь еще болье похищаеть; и мы не безъизвъстны, что она не менье губительна и въ другихъ городахъ Англіи, какъ и въ Лондонъ.

Mo-

то большой части тогда развъ остаются безъ желаннаго двиствія, когда принладываются уже очень поздо. Ежели припадни ложнаго воспаленія въ легаяхъ столь жестоки, что не можно надъяться, чтобъ они уступили другимъ лънарствамъ, що не покушаяся на оныя, надобно приложить нарывныя, да еще и къ тремъ мъстамъ вдругъ, ежели то за нужное почтено будетъ.

⁽¹⁾ По сей - то причинъ Врачи даютъ имя сей бользни отисись (phtisis), слово Греческое, которое значить увяданіе, изсущеніе (точно то, что по руски чакотка).

⁽²⁾ Весьма трудно дознаться, находятся и шишечии въ легиинъ. Сумой обычайной кашель доназываеть быте оныхъ съ немалою достовърностію; однано же сей кашель бываеть иногда тогда, ногда ихъ нъть, и ногда тольно напротивъ въ груди разлился гной. Нъноторые больные выхаркивають сіи шишечии съ харкотиною, и сіе токмо одно обстоятельство можеть положительно увърить, что онъ находятся.

Молодые люди от в пятнатцати до тритцати кто ей нальть, у коихь стань тонкой, шея долгая, плечи иболье высокія, грудь узкая и стиснутая, наиболье подвержены сей бользни.

Тахотка обыкновенные бываеть въ Англіи, не- чехетив жели во всёхъ частяхь свыта; что можеть произой- сбыновенти от слишкомъ великаго употребленія мясь и кріп- нье въ Англіи, кихо напитково, от сидячих работь, от множе- нежели ства сожигаемаго землянаго уголья въ семъ королев-гат инустве. Прибавимъ еще ко всёмъ симъ причинамъ без- прерывныя перемыны атмосферы или непостоянность погодъ (3).

ЧЛЕНЪ І.

Притины тахотки.

Мы уже дали знашь, что воспаление легких в ча- всь преето окачивается абсиессом или нарывом в савдетвенвоспаление Гом в П.

⁽ з) Хотя сія бользнь не столь сбыкновенна во Франціи : однако всякь можеть приметить, что она ныне чаще стала, нежели нань прежде (такъ накъ и въ Россіи). Города намъ подають повседневные сего примъры, да и самыя деревни не совстмъ отъ оной изъяты. Однано мы не можемъ въ томь обвинать ни мясь, коихъ у насъ расходинся несравненно меньшее количество, нежели у нашихъ состдей; ни перемънъ воздушныхъ, поелику нашъ климатъ есть изъ числа благоразтвореннъйшихъ. Но надобно въ томъ обвинать наши сидачіл работы, наши излишества во всяком в родв, наши распутства во всяком в вымысль, элоупотребление кофея, смертоносную повадку пелепания и шнурованія, какъ - то мы показали въ Темъ I, гл. 1, примъч. 9. и гл. 5, 6 г, членъ I сего Тома; надобно еще обвинать плотоугодіе, а наипаче мерзкую привычку - - къ руковлудію (коего следствія опишемъ мы въ Томъ IV, главъ 57, 6 5, членъ IV), коему предающея моло. дые люди почти съ самаго отрочества. Весьма желательно, чкобъ учители и дядыми пристальные смотрыми за тыбы, что дыдается вы ихъ спальняхь, и чтобь, возвращи отцамь и матерямь юныхь людей обученных В Наукамъ, возвращами также ихъ произенных в ужасомъ и омеравніем в на накому беззанонію, ив такой снаредной подлости, иъ шаной мерзости, которъя востаеть на благоправіе и религію, и которая посраманеть природу, коея она есть убійца.

но все располагающее къ соспалению лежих пожетъ почестьел за причину тахотки.

могущія также оную причинищь. Таковыя бользни суть: скорпричиния буто или цынготная бользив, золотуха, бользив венерисеская, одышка, оспа, корз и проч.

особенныя КакЪ гахотка почти никогда не вылъчивается, прачины то мы неперь постараемся показать ел причины подробивншимЪ образомЪ, дабы наставить людей избътать оныхЪ.

Воздукъ Сти причины супть: 1) воздуко запертой, или запертой, нездоровой. Воздукъ запертой въ такомъ мъстъ, въ или нездо-которомъ расходятся пары отъ металлово и минераловой. пово, особенно повреждаетъ легкъл тъмъ, что онъ снъдаетъ и разрываетъ нъжные и деликатные сосудилы ихъ (4).

сильныя страсти, усилія духа, скорби дуетрасти, иги, петаль, неудача, бользнованіе, упорное придъвкорби дужаніе къ изученію какой нибудь науки, или художества трудныя и проч.

велное нез) Непомърныя выпоражниванія, какЪ-то обильпомърное пой пото, упорной поносо, діабетесо (т. е. непомървыпоражное теченте мочи), элоунотребленте любовнаго сладостра-

Для чего употрыбльтощее въ дъло мъдъ художниин подвержемы

⁽ф) Мбдь, как в металя болье всего илущій вы дыло нь городахь, повселненно прелставляеть намы поразительные примъры сей истинны. Чаще всего случается вильть часовщиковь, и дълателей Математтических в инструментовь умврающих в отв чахотах. И так в крайняя настоить нужда симы же самимы мастер мы, да и прочимы сего же рода художникам, чт бы их работныя комнаты были состроены такимы образомы, чтобы внашай воздухы могы вы оныя входить, расхаживаться и проходить всяр, и чтобы они не очень долго сраду оставляють за своею работно. Надобно читить то, что нами уже сказано вы Томы 1, гл. 2, 5 з и вы гл. 4 того же. Тома.

етрастія, біли, истощаніе от в непомірнаго теченія ивсячных в кровей, слишком в долговременное молококормленіе и проч.

- 4) Варугъ случающаяся остановка какого имбудь остановна обычайнаго испражнения, какъ-то открытаго потетуя, сбычайнаго пота ногв, кровотегения изб посу, мъсятныхб, прижине нистражие ганий, вередовб, или какого инбудь выступа или сыпи.
- (5) Случаи, произшедшіе от внашних при- Случаи, чин возвратиль закорена при- Случаи, происшедший от видаль закорена присшедшіе от косточка остановилась в дихательном горла, или причинь. в броихіах вольной наконец извергнуль из себя примарь. сію косточку съ великим количеством гиол и посредством присподобленняго питеупотребленія, да еще употребленія хины возвратиль здравіе.
- 6) Внезапной переходъ изъ климата теплаго въ остановка климатъ весьма холодной; перемъна въ платъв и во испарения. всемъ могущемъ причинить нарочитое уменьшение въ испарени.
- 7) Частыя и излишнія любовимя услажденія, веякія избавнія длинныя и питіе крвпкихо напитково (что бы- вишестве. вае пр вивств, но крайней мврв вр Англіи) не преминуть повредить легкихо: почему тоть, кого называють добрымь кампаньйономо, часто умираеть жертвою сей бользии, какь- то показано выше сего въ примъч. 3 сей главы.
- 8) Зараза. Сахотка часто пристаеть от раз- зараза. дълентя ложа съ человъкомъ зараженнымъ сею бользнтю: и такъ тщательно надобно избътать такого сожиття. Изъ сего ничего полезнато не можетъ вытип для больнаго; а для здоровато будетъ весьма выгодно (5).

2

⁽в) Такъ канъ мы доназали примърами, приведенными въ примъч. 6, гл. 1 Тома Г. Но не нужно раздъльть ложе съ чакотивами, Гронинг-

у) Различныя упражненія в жизни. Художники, рыя руко- долгое время засиживаюцівся, непрестанно слякающів аблія и свою спину, или прижимающів свой желудоко и грудь должно- к какому нибудь твлу жесткому, как в-то ножевсти. щики, портные, сапожники и проч., часто умирают в от в тахотки. Пъвцы, пъвицы, всь ть, кои часто удручают в свои легкіл, от в оной погибают в столь или не столь скоро.

жолодь и то) Холодь. Начала сахотки чаще происходять оть мокроты ногь, постелей, одеждь, росы и проч., нежели оть другой причины.

Яства соленыя и разгорачающія. Наслъдственная

порча.

11) Яства соленыя, приправленныя, облаговоненныя пряностями, разгорячающія кровь, суть также весьма частыми причинами сей бользни.

12) Наконецъ, тахотка часто бываетъ наслълственною бользнію; и въ такомъ случав она вообще неизлъчина.

членъ п.

Признаки тахотки.

Признаки начинающейся чажошки. Сахотки обыкновенно начинается кашлем сухимъ, которой иногда продолжается чрезъ нъсколько мъсяцовъ. Ежели въ семъ случат больной чувствуетъ позывъ на рвоту по приняти кушанья, т. е. просто нотвии, то еще основательные можно бояться близкой тахотки.

Боль-

сной Лѣнарь, о которомъ мы упоминаемъ въ семъ 5 примъчании, говорить, что служания, прислуживавшая своимъ госполамъ, впала танже въ чакотву, слълавичюся смертною; и что другой слуга, не столь много ды навшій воздухомъ горницы оныхъ больныхъ, впаль также въ чакотку, и спустя нѣсколько времени умеръ. Сіи свидъмельства, кои можно бы и еще умножить, взяты изъ письма, надписаннаго Издателямъ Парижскаго Журчала, и помъщеннаго въ семъ Журналъ подъ N) 294, 20 Октабря 1780 года.

Вольной жалуется тогда на степень жара большій прошивь обыкновеннаго, т. е. которой бываеть въ естественномъ состояни, на боль и тяжесть въ груди, а особливо по учиненти какого нибудь тълодвиженія. Его харкотина на языкЪ или на вкусЪ солена и часто смъщана бываетъ съ кровію.

Онъ часто бываетъ унылъ и задумчивъ; аппетить у него хуль, жажда непомврная: между тъмъ пильев обыкновенно тастой, мягкой и малой, а иногда довольно полной, даже иногда и жесткой; сіи-то сушь обыкновеннъйште знаки, кои сопровождають начала тахотки.

Вскоръ харкотина начинает в принимать на се-признаки бя цвыть зеленоватой, былесой, или кровавой; боль- утвердивной истощавается тахотного лихорадкого и проливными чакотинь. потами, одинъ за другимъ слъдующими, т. е. одинъ около вечера, а другой около утра; онъ еще изнуряется мытомв или поносомв и непомврнымв истесеніемв моги: нещастные признаки, часто примъчаемые въ сей эпохъ!

Онъ чувствуеть жгучій жарь вы ладоняхь рукь; щеки его послъ объда покрываются багровыи вътомЪ; нальцы его примътнымЪ образомЪ утончаются; ногти загибаются и волосы льзуть.

Наконецъ опухоль рукъ и ногъ, всеконечная по-признаим теря силь, уходь глазь подь лобь, трудность при последнаго глотаніи, холодь вь конетностяхв, возвышають близ-чахотив. кую смершь, которую однако же больной не такъ скоро бышь часть.

ТаковЪ есть обыкновенный ходЪ сей жестокой бользни, которая, ежели не будеть въ скорости остановлена при началь, обыкновенно превозмогаеть всь . лькарства. ф 3

(IIpe-

(Прежде, нежели приступить къ дальнъйшему чтентю, читай гл. 1 и 2 сего Тома.)

членъ Ш.

Поведение и пищеупотребление, которое должны на-

Меремъна воздуха. Надобно при первых в появлентах в тахотки больному оставить не мышкая свое жилище, естьли он в живет в в большом в городь, или на мысть, гдь созмух запертв, и итти жить в деревню на таком в мысть, в в котором в бы создух был в чиств, сух в и проходил в свободно.

тамъ онъ не долженъ оставаться въ неподвижноженіе,
предпочти сти, но напротивъ новседневно столько предпринительно же мать тело движенія, сколько состояніе его позволить
верховая можеть. Наилучшее тело движеніе въ семъ случав есть
взая. Для
верховая взда; потому что она много сотрясаеть
тего:
тело, но его много не удручаеть. Тъ, кои не могуть доставить себь сего телодвиженія, должны вздить въ повозкъ.

Больной не иначе должень садишься на лошадь, Правико, ношорое какЪ поутру, и долженъ стараться съ оной слъзть должно напо крайней мъръ за полчаса передъ объдомъ; безъ чеблюдашь въ разсу- го сте твло движенте сдълаеть ему болье зла, нежели ждени добра: но шолько надобно, во что бы то ни стало, вержовой употреблять ему сте твлодвижение; его жизнь отъ Ззды. Ея сего зависинъ, такъ какъ уже о семъ сказано въ Товажность и ея двимѣ I гл. 5. Его можно почесть за неизмѣнное почти ствія, колькарство, когда только человько начнето оное упогда она треблять заранье, и будеть его продолжать чрезъ благовремения, т. мемалое время (6). е. заринъе

е. заринъе

Becs-

Верховая Тэда есть

⁽⁶⁾ Въ семъ - то наиначе первомъ періодъ сей бользни тановое твлодвиженіе есть настоящее совственнодвиста умищее. Простой мако-

Весьма досадно, что ть, кои направляють ко-верховую эдравію спраждущих вею бользнію, тогда только по- воду вачини всегда наказывають имъ верховую взду, когда советывабольной не въ силахъ уже оной выдержань, или когда ють очекь болья савлалась неизлычимою.

Да и больные съ своей стороны привыкли съ хо-холодлодностію взирать на средства целенія, находящіяся ность больпри их в глазах в и зависящія от в их в самих в; они не всему томогушь увъришься, чтобъ толь обыкновенное твло-му, что

ABUKE-

знающій народь, такь говорить Г. Тиссонь, то щолько почитаеть собственавкарсивомв, что кладеть вы роть; онь мало верить лекарствамь нодейи другимъ пособіямь дівтетическимь, и верховую взду почитаеть за ствующее безнолезную. Сія пограшность пагубна, и я желаль бы его изъ нее противъ вывести. Сіе пособіе дъйствительнье всьхь: безь него не можно на- чахотки, дъяться уврачевать зло; оно одно токмо можеть исублить его, толь-ежели оно ко чтобъ не принимаемы были яства прошлавныя. Наконецъ оно по-предприничтено было основаниельно испаниять совственнодбиствующимы про- мается вы началь, и шивь сей бользии.

Однако надобно замътнить, что верховая влда не прилична жается продолбываеть, накъ сноро ликорадна бываеть сильна и безпрерывна, а боль- чрезъ неной весьма слабъ; пошему что въ сію пору всякое движеніе стано-ENINCA BREARDIMI -

Надежной эпакъ, по которому узнается, что вержовая вада Время бополезна, есть тоть, что она, вмосто умножения скорости пульса, лазни, въ его умедалень, ш. е. что пульсь должень быть не столь часть, спуста которое два часа посла взды, сколько быль до оной; что она умножаеть силы, оно болье доставляеть чувствие благосовтояния, уменьшаеть кашель и тяжесть и непригодне проч. бытваеть.

На лошадь надобно садиться только поутру въ тоть чась, въ знаки, изъ которой не бываеть лякорадии, и въ которой она не столь чувстви- ноимь помельна; но никогда сего не надобно дълашь векоръ послъ кушанкя, знается. ни во гремя вечерияго удеоенія.

Тошь обманывается, имо втрать, что для на вченія себя вая вода еть сей больни довольно только вздить на лошади. Дознанивищия полезна. совственно дойствующія, нан Т-то мервурій, жина, потолину тольно часы дня, бывающь полезными даже вы швий самых в бользилив, ноих вони сушь вы нои налънарешвами, положику резумно расперажающея: що же дожно ска- добно сазать о верховой вадь в чакомив, кот рая часто превезметаеть нап-диться на мучшія лікарешва.

wmo .pxo-

40шадъ-

не назы- деижение могло сдълаться въ толь упорной бользни вають ав- лъкарствомъ: отъ того-то они его отвергають, а наретномъ. ищуть съ жадностию пособия во Врачебной Наукъ, по той только причинъ, что ее не разумъють.

Сухопутныя стран- как В увеселяющія дух в безпрестанною раз гостію предетвованія. метов в, предпочтительные суть малых в развыдов в, вы коих в человых выдить и возвращается по тому же грунту. Однако больной должен в остерегаться, чтоб не простудиться от сих вразвыдов в, или от постелей, или от мокраго платья и проч.

Тъ, кои имъютъ силу и бодрость предприять Морскія довольно долгое путешествие по морю, изъ сего попушешеетвія полезны да- лучать величайшую выгоду. Я весьма часто видываль, что сте средство успъшно было даже въ то время, же и тогда, когда когда тахотка по всемь околичностямь находилась на **чахошка** последнем в своем в степени, и когда все лекарства водошла до носледняго шще упошребляемы были: изв чего основащельно можно заключить, что ежели бы путешествие по морю овоего стенени. благовременно предпринимаемо было, то бы ръдко развъ не оказывало своего дъйствія, т. е. не исцъляло сей бользни (а).

нужные Люди, желающіе испышать еїс средство, долзапасы для жны запастися всёми свёжими веществами, въ коихъ
чахотмыхъ въ
морсияхъ шествія по морю. Какъ въ семъ случав не можно запутешествіяхъ.

⁽а) Ежели путешествій по морю не доставляють тьхь выгодь, нановыхь оть него ожидать бы надлежало: то сіе наипаче происходить сть того, что і) бользнь уже далено счеть шагнула; 2) что путешествія сій не очень долговременны. Больной, не получающій ничаного сблегченія оть разьтяжаніл по наналу (находліцемуся между Францією и Англією), могь бы выльчиться совершенно, естьли бы разьтяжаль по Ашлантическому морю: потому что по всему можно думать, что таковое путешествіе, ежели будеть продолжительно, развърдно не выльчить чахотих.

пастися молокомо, то нужно имъ будетъ питаться плодами, цыплячьими бульюнами, или другими молодими животными, кои могутъ сохраниться на суднъ, и кои нами исчислены въ Томъ I, § 1 и членъ III главы 2.

Не нужно здъсь напоминать, что сій путеше-годовых ствія должны предпринимаемы быть сколько возможно времена, по веснъ, да и направляемы быть всегда къ теплъйшимъ они должны пред землямъ (7).

Тѣ, кои не имъють бодрости предпринимать сї принимаєнутешествія по морю, должны перебраться въ юхные климаты, какь-то въ Полуденныя страны Фран
ній, въ Испатію, въ Португаллію и проч. (а въ Росматамъ.
сї и изъ Съверныхъ странь къ Полуденной полосъ, гдъ
тенлье; но только смотрьть, чтобъ воздухъ въ
дать тъ,
томъ мъсть какъ по себъ, такъ по всьмъ окружно-нов не мостямъ быль здоровъ); и ежели воздухъ сихъ странъ туть нунять здоровъ, но оставаться тамо дотоль, доковать пе

Посль хорошаго воздуха и телодвижения должны каная долмы присовыновать особенное внимание къ диеть. Больдіэта ной не долженъ ничего вкушать горясительнаго и не-больнаго: удобоваримаго; его нишие должно быть услаж дательное

Jones II. X

И шакъ мы совъщуемъ страждущимъ сею бользнію перемьнять свое жилище шакимъ образомъ, чтобъ живущіе на Съверъ перекодили на Югъ, а отъ Юга къ тепльйшимъ мъстамъ и проч-

⁽²⁾ Совьть, предлагаемый Сочинителемь, чтобь путешествовать по морю для излычены себя оть чанотия, не по случаю дань. Докторь Джилхристь, соотечественникь Г. Бужана, издаль вы 1771 году одно сочинене, имыщее предметомы, сіи странствованія; и онь доназываеть множествомь примыровь, одины предь другимы достойный шкы чтенія и вниманія, что сіе важное лыхарство удачно было вы безчисленных обстоятельствахь, вы ноихы всы другія понущевія остались безполезными. Не льзя сомнываться о истинны сихы наблюденій. Сочинитель сей извыстный по своей учености и честности, приводить тольно свои наблюденія и другихы достойный шкы выроятія врачей. Сіе сочиненіе вышлю вы свыть поды названіемь: Тье ибе об вся voyages ін Medicine; апа раггісціяту ін а сомботргіон: with observations on that disense. Ву Евепехат Gilchrist М. D.

и прохладительное. КакЪ вся цёль діэты должна состоять въ томъ, чтобъ уменьшить остроту соковъ, питать больнаго и поддерживать ослабъвающія его силы: то слъдовательно долженъ онъ наипаче употреблять вещества растительныя и молоко.

Различные виды молона. Ослиное молоко; сіе молоко должно соешзвиншь большую часть пищи боль-

Одно токмо молоко болье имветь силы въ сей бользни, нежели всь лекарства врасебнаго веществословія. Вообще всв въ томъ согласны, что молоко ослицы надобно предпочитать всякому другому; но не всегда можно его достать. Далье, оно обыкновенно принимается въ маломъ только количествъ; а для того, чтобъ сте молоко произвело примътныя дъйствтя, надобно ему составлять большую часть пищи больнаго.

Haro-Для чего оно ръдко производишь шт дъйствія, ожидать?

Нъкоторые люди хотять, чтобъ полфунта или фунть молока ослицы, выпитаго въ сутки, доволенъ быль къ произведенію нарочитой перемьны въ сокахъ больнаго; а когда они скоро не примъчають дъйствій, то теряють бодрость и оставляють употребление лежалобы онаго: от сего-то происходить, что сте лькарство, хотя превосходное, ръдко производить выпользование. Причина тому извѣстная, а имянно: молоко обыкновенно принимается больными очень поздо, очень въ маломЪ количествъ, и оставляется очень рано.

Въ наную пору 60жтэни надобно его вашь?

Я видьав чрезвычайныя двиствія молока ослицы въ упорномъ кашлъ, угрожавшемъ тахоткою; и я твердо върю, что ежели бы оно предписываемо было въ семъ предписы- період в бользни, то бы почти всегда ее выльчивало. Но ежели время отлагается до того, пока составится вередв въ легкихв, такъ какъ очень часто случается: то какого успъха от в него ожидать можно?

Сноль тепдо и въ

Молоко ослицы должно выпиваемо бышь, сколько какомъ ко- возможно, въ его естественной теплотъ, т. е. въ личествь такомъ спепени теплоты, которой оно имветь тотда, когда недавно только выдоено; и взрослой дол-молоко осжень его выпивать по полуфунту за разь. Чтобь не жно быть повторять сте количество только поутру и повечеру, онь должень выпивать оное четыре раза на дни, мог или по крайней мъръ три: съ симъ молокомъ должень онь всть не много легкаго бълаго хлеба, дабы онь влужиль ему объдомъ.

Ежели случится, что сте молоко будеть сла- что дохбить, то надобно въ него прибавить старой розовой консервы (confervæ rofarum), а по недостатку ея, порошку гда оно раковых клешней (pulveris chelarum cancrorum), или мелу, слабить:

Обыкновенно приказывають нить молоко облицы не надобно неплымь и на постели; но оно такимь образомь выпиваемое обыкновенно возбуждаеть поть: слъдственно можеть быть лучше бы было пить его по встанти на постесъ постели.

Мы знаемь чудныя исцьленія оть сей бользни, жененое произведенныя женскимо молокомо. Ежели бы можно молоко было имьть довольное количество сего молока, то бы мы предпочтительно предъ всякимь другимь присовытовали его.

Я знаю нѣкотораго человѣка, дошедшаго отъ са- Примъръ котки до такого степени слабости, что онъ даже не превосходнаго дъймогъ переворачиваться на своей постели. Жена его, въ ствія сего то время кормившая молокомо своего младенца, по не-молока. щастію его лишилась. Мужъ ея принялся ее сосать единственно въ намъреніи, чтобъ облегчить ее, а никакъ чтобъ себъ получить пользу отъ ея молока. Однако же почувствовавъ нарочитое облегченіе, продолжаль онъ ее сосать, пока совершенно выздоровъль. Сей человъкъ цынъ сталь силенъ и въ полномъ здравій (8).

2 Нь-

⁽⁸⁾ Настоящій способъ употреблять молоко женщины состоить въ Смешным томъ, чтобъ сосащь его изъ грудей. Многіе люди отвращаются отв сего предраз-

Модонки REZ.

Нъкоторые вредпочитають подонки посль пахносль пах- танья масла живопиних всякому другому; да и въ самомЪ дель это превосходное есть лекарство, когда только желудок в может в его снести. Однако как в оно не всякому сперва нравится, то многіе люди оставляють его, не употребляя его чрезь довольно долгое время.

По накому ному надобно од-HUMH HMH

Надобно сперва их в употреблять по малым в пріпріему на- емамЪ; по томЪ мало помалу умножать количество, а употреб- наконець саблать изб оных в единственную свою ниавшь. Воль- шу. Мнв никогда не случалось видешь ошь них в пользы, ежели больной ими полько одними не питался.

пишлться. Коровье MONOKE: ередства дегнимь.

Коровге молоко, обыкновеннайшее у насъ, хотя не столь удобно варится, въ желудкъ, какъ молоко ослицы или кобылы; однако можеть саблатьавлать его ся легкимь оть смъшенія съ равною частію ячной воды или отв устоянія чрезв нъсколько часовв, послъ конхъ снимается сметана. Ежели при всяхъ сихъ предосторожностяхь оно найдется еще тяжкимь на желулкъ, то можно прибавить на полфунта сего самаго молока столовую ложку рума, или водка и нъсколеto caxapy.

He

ебъ сбразв, но коему мад (бно упошреб--OKOM dillag ко женци-H by .

предложения. Стиуда происходить сіе отвращеніе? Развъ надобно намъ ямбить то только, что находится внё нась? Аства, замешиваемыя и валяемыя наемнинами, почитаемыми за преэрвинбиших в, всегда нажушся намъ превосходными, превнусными; а то вещество, исторое езма Природа печешен пригошовишь, и ношерое полагаент она въ украшенных в ею кранилищахв, производить вв насв отвращение: наная странность!

ВЪ каную пору дня надобно coca mr нормили-HY:

Впрочемъ надобно замътить, что минута, въ которую женсное молоно бываеть наилучшимь, есть посль сбыла нормилицы, спустя четыре или пать часовъ послъ него: прежде сего времени оно имъетъ накую - то сырость и нъсколько отзывается свойствомъ принятых в нетев; а нося распущается и желиветь, даже нолучаеть эзпахь мочи.

Не надобно дивишься, что молоко не всегда ка- для чего жется пріятным в в первых временях в такому же- молоко не всегда нра- дудку, которой привык варить только мясо, и пить вится в иапитки крытіе: сїє-то наипаче случается съ вели-началь его ким в множеством в впавших в в тахотку.

Но мы не шого хошимъ, чтобъ больные, при-предостовыкте къпищъ животной и късимъ напиткамъ, вдругъ рожности, каковыя совсъмъ ихъ оставали: сте лишенте можетъ сдълать надобно ся имъ пагубнымъ. Напротивъ того мы имъ совъту-предприкиемъ кушать одинъ разъ въ день нъсколько мяса молоначалъ дыхъ животныхъ, или лучше употреблять цыплячьи, употреблетелячьи и ягнячьи бультоны. Они могутъ также пить нія молокапо немножку вина, смъщантаго съ негусолю, или съ двумя или тремя долями воды; но они должны мало помалу уменьшать количество вина, а напослъдокъ и совсъмъ его оставить.

При всемъ томъ сте пищеупотребленте надобно молону насодержать на тотъ конецъ, чтобъ пртуготовить себя добно къ простъйщей дтэть, и вообще состоящей только скольно изъ молока и растенти; чъмъ больной обстоятельные возможно будеть се наблюдать, тъмъ для него будеть лучше. главною пищею

Сарогинское пшено и молоко, или ягная крупа, нешва.

варенная съ молоком (9), въ ком прибавляется по не
Х 3

⁽⁹⁾ Вообще, говорить Г. Клеркь, чрезь долгое время варенное молоко не надобполучаеть вкусь несколько острой, запажь уринной; и тв, кои пред- но нипяписывають больнымь такимь образомь варенное молоко, не умнее типь мотехь, кои кинятать и пенять медь. Lettre à M. Pringle, sur les pro- лека, ни prietés du lait.

Надобно еще смотрёть и за нормомъ, ноимъ питается меда. вноть, дающій молоно. Я знаю, что во всяномь большемь городь сіе покажется труднымъ, по крайней мёрь въ разсужденіи простаго народа, но въ разсужденіи деревень это всего легче; а достаточные люди могуть о семь навъдываться и въ самыхъ городахъ. Сей при-

иногу сахару, составляють весьма пригодныя яства. Плоды, совершенно зрълые и испеченные передь огнемь, вы печи, или сваренные, равно пригодны. Сти плоды суть наипаче смородина, печеныя передь огнемь, или вареныя вы водь яблоки, кы коимы испеченнымы или свареннымы прибавляется нысколько молока, или сыворотки и проч. Желеи, сонсервы, конфекты изы зрылыхы плодовы нысколько кислыхы, могуть даваемы быть больному, какы-то изы смородины, розб, слиеб, вишено и проч.

Чи-

молоко. Для чего ?

смотрь тьмь важнье, что молоно сохраняеть цвыть, запахь, внусь и свойства составляющаго его норма. Всякь знаеть, что оть шафрана оно дылается желтымь, оть маріоны праснымь; что оно принимаеть на себя цвыть вина, пива, нассін и проч. Молоно обець жрущихь чаверь, пахнеть чабромь; оть чесному отзывается оно чесномомь; оть полыни бываеть горьно; оть динаго абрана (или нонебыто труша), когда онь сухой събдается, дылается проноснымь и проч.

Изъ сего всякой заключить можеть, что ежели пустить ском тину кормиться, чъмъ она кочеть, или чемъ нужда приведеть: то молоко ел можеть получить совсъмъ противныя качества настоящей бользни; и не токмо не выльчить, но и умножить эло по мъръ, сколько эти травы будуть противны бользни.

Растенія, коими дол-жень питаньел екоть, имъющій доставлять молоко чаНо не опуская изъ вида чакотии, о ноей здъсь идетъ дъло, желать надобно, чтобъ ослица, или корова, имъкщая чакотнымъ доставлять молоко, кормилась растеніями только развивательными, ябчевными и вальзамичесними. Сін растенія суть слъдующія: иссопь, вълая шандра или шанта, вожье дерево, пыжма или вмъсто оной диная рябина, вероника, диной цинорей, ендивія, вълая кропива, фумарія, золотоловникь, кмъль, малой золототысячникь, три вида полыней, девясиль, врунирессьи жерука, водяная сельдерея, мята, шалфей, травы извъсщныя подъ именемъ женсникь волось, черная солодиа, стънная рута, аспленіумь, медуница, дувовой можь, лебробой, лючная лапа, жельзнякь, вудра, благословенной волчець, пастушеской ношелевь, попутникь, нашка, денежникь, пятилиственникь, журавейникь и проч. Большая часть сихъ растеній описана нами во всеовщей тав-

Сін растемія находянися повсюду. Сін растенія, сколько ни многочисленны, только они самыя обыкновеннъйшія. Они попадаются вездъ или ть, или другія, на лугахь, болотахь, долинахь, въ лъсахь, на горахь, на берегу ручьевь и ръкь, на стынахь и проч.

Чистой соз духд, умвренное твлодвижение, яствы, коное состоящия въ особенности изъ упомянутыхъ нами пло-требление довъ, или другихъ имъ подобныхъ съ молокомъ, со-единственствавляють единственное пищеупот ребление, на кото-но наблюрое можно положиться во время начинающейся сахотки. Азть надобно во врежели у больнаго довольно есть силъ и бодрости для мя начивыдержания его, то ръдко развъ отъ оной не вы-нающейся чахотки:

ВЪ нѣкоторомЪ весьма многолюдномЪ АнглійскомЪ примъръ. городъ, а именно вЪ Шеффильдъ, вЪ коемЪ тахотка весьма обыкновенна, я часто видалЪ чахотныхЪ, кои удалившись вЪ деревню, и по предписанію чрезЪ довольное время предпринимавЪ тѣлодвиженіе посредствомЪ верховой ѣзды, а кормившись только молокомЪ и растеніями, возвращались чрезЪ нѣсколько мѣсяцовЪ избавленными отъ всякихъ болей, и даже получившихъ дородность.

Правда, за симъ пищеупотреблениемо не всегда послъдовалъ успъхъ, а наипаче когда болъзнь была наслъдственная, или весьма укоренившаяся: но отъ него только и польза могла послъдовать; и когда по неща-

Собирая самъ сіи растенія, или выводя скотину для корма на тъ мъста, гдъ ихъ болье родится, не токмо можешь воспрепятетвовать ей, чтобъ она не вла противныхъ; но еще сдългешь то, что она доставить тебь молоко насто щимъ образомъ лъкарственное, особенно присподобленное бользни. Г. Клеркъ повъствуеть тамо же исторію о нъкоей гостожь, имъ выльченной отъ чакоти посредствомъ имъ сдъланнаго лъкарственнаго молока. Сіе дъло и многія другія имъ приводимыя долженствують, говорить онь, заставить нась умножать опыты въ семъ родъ. Способъ убивать людей по нещастію весьма извъстень; а сохранять ихъ, не довольно свъдомъ. На это-то надобно обратить вниманіе врачамь и всьмъ смысленнымь людямъ.

Надобно замѣтить, что накъ коровье молоко труднѣе въ желуднѣ варится, нежели вышепомянутыя, то надобно только вначалѣ его предписывать, когда силы больнаго не пропали; или въ выздоравливанія, когда примѣтнымъ образомъ окасность удалилась, щ. е. когда больной возвратилъ нѣкоторую часть свойжъ силъ.

щастію еїє средство не удачно было, то и лікарства безполезными оставались: по крайней мірь л не видаль оть однихь только ихь щастливаго приміра.

Пищеупо- Ежели силы и болрость больнаго пропали, то натребленіе, добно стараться поддерживать его сочными бульюнами,
и болрость желеями и проч. Нъкоторые совътують въ сей боль.
больнаго зни черепокожных рыбь: да сте и не безъ причины;
упали. потому что они очень нитательны и силовозставлятельны (b).

ВпрочемЪ яства и питіе должны принимаемы Яства и нишье дол- бышь по малому количеству за разъ, дабы слишкомъ жны привеликое обиліе новаго хила не обременило легкихв, и не нимаемы причинило излишней быстроты въ кругообращении крови, бышь въ маломъ ко- такъ какъ мы показали уже въ Томв I, гла. 2, прим. 3. личествъ Надобно содержать духъ больнаго столь весе-32 pasb. для чего: лымЪ и столь спокойнымЪ, сколько возможно; поелику Выгоды тахотка часто причиняется и всегда отвичается отъ ошъ весемеланхолическаго духа: почему музыка, пріятная п мости, музыки и кроткая бесьда и все могущее внушать веселость, проч. въ весьма важно въ сей бользни. Далье, почти никогда не пакошив. надобно оставлять одного больнаго; потому что размышленія о нещастномь его состояній могуть тольке савлать бользнь опасивищею.

ЧЛЕНЪ IV.

Пользованге, коему должно последовать больныма в различных степенях тахотки.

Хотя исцеление от сей бользни большею частию зависить от пищеупотребления и постоянства

CO

Выгоды оть употиребленія устерсовь.

⁽b) Я видъль чахотныхь (у коихь припадки однакожь не очень еще тяжни были), кои получали велиную пользу оть употребленія устерсовь. Очи ихь тли вообще сырыми и выхлебывала содержащійся вы ихь раковинкахь сокь; я видъль примъры корошихь дъйствій оть устерсовь и вы другихь случалхь, накь-то во реоть, причиненной беременностію и оскоминами желудка, изьясненными ниже вы главь 22, §, 4 члень IV, примъчаніи 4, и члень VIII, примъчаніи 5 сего Томга

со стороны больнаго въ последованіи оному; однако мы упомянемъ о небольшомъ числе лекарство, могущихъ послужить къ утоленію жестокости главныхъ припадковъ.

Явкарства против перваго степени сахотки.

ВЪ первомЪ степени тахотки можно иногда утишить кашель кровопускантемб (10), и мокротохаркантю способствовать слъдующими лъкарствами:

Возьми свъжаго морскаго луку,

Я имонгатеской камеди,

Кардамоновых зерен зарахмы.

По Лашынь:

Recipe Recentium bulborum scillæ, ana drachgummi ammoniaci, - - ana drachSeminis cardamomi in pulvere. ana drach-

Истолки все это выветь въ ступкъ. Ежели сіл смъсь столько кръпка, что не можно сдълать изъ нее пилюль средственной величины, то прибавь немного обыкновенного сиропа.

Сихъ пилюль дается по три или по четыре однажды, или дважды въ день, смотря по тому, какъ желу доко можетъ ихъ снести.

Jong II.

N

Яммо-

Я не убоюся сназать, что провопускание въ большей части чахотива случаевъ должно быть ствергнуто въ семь пользовани, такъ накъ сочинитель отвергаетъ, накъ сноро видно будетъ, всъ лъкарства массланыя и кальзамическия.

⁽¹⁰⁾ Весьма сомнительно, чтобъ провопускание было полезно даже и Съ каною въ первомъ степени чахотки, наиначе ежели она произошла отъ той осторожномили другой изъ изчисленныхъ въ и членъ сего параграфа бользней стію наЕжели мы вникнемъ въ то, что сказано въ С 1, въ примъчаніяхъ 2 добно предо и з главы 6 сего Тома, то должны почувствовать, что сіе средство, писывать могущее доставить маловременное тольно облегченіе, можеть сдълать провопуся губительный шимъ, исторузан силы и глубже укорення зло сканіе въ

Аммоніа
жесное мокой камеди дъланное, шакже есшь пригодное лъкарсшво
въ семъ первомъ періодъ бользни; оно пріугошовляется
и предписывается шакимъ же образомъ, какъ мы присовъшовали въ колотъв. Смотри гла. 5, \$ 1, членъ
IV, гдъ на полъ написано: диссолюція аммоніатеской
камеди.

волеуто- Можно еще употреблять микстуру, составляелятельная мую изЪ равныхЪ частей / микстура.

Добраго меда и маковаго сиропа (бугирі рарачегит).

Каждой вещи берется по четыре унціи, кои кладутся вивств на сковородку на легкой огонь; разогрѣваются дотоль, пока произойдеть трещаніе въ семь составь. Сего состава больному дается по ложкь всякой разь, когда онь мучится кашлель.

опременяющь желудокь больнаго лекарствами маслянымасляныхь ми и бальза митескими; но сіи лекарства не токмо не и бальза- истребляють причины бользни, но еще разгорячая мическихь кровь, придають ей силы. Они притупляють апистить, разслабляють тердыя, и по всему вредны бывають больному.

Все, что только можно употребить для утоныя льнарства, ней жестокости кашля, должно, сверьх в сервховой можно да- взды и других в пригодных в частей пищеупотребленія,
вать про- ограничиваться выпративами свойства нысколько кислаго
тивы жестокости
камы сиропомо и проч.

выгоды Кислоты, как в жаждоу толя тельныя и прохлажень вы сей бользни. Кислыя растенія, как в то яблоки, померанцы, лимоны и проч., наначе здысь пригодны.

Я видълъ больныхъ, которые великую получали пользу отъ сока лимоново; они много ихъ сосали въ день. По причинъ сихъ- то примъчаній совътуемъ мы унотреблять растительныя кислоты по толь великому количеству, сколько желудокъ больнаго снести можетъ.

Что касается до нишій, то мы похваляем ис- настой съ сорькими травами, каковы суть будра, золото- правами, то пристем прилиствений. Онв принимаются по произволенію; двиствіе же их то, что онв укрвпляють желудокь, способствують къ пищеварению, очищають кровь, и купно выполняють показаніе увлажненія и утоленія жажды несравненно лучте, нежели всв сладкія и сочныя веди.

Но ежели больной харкаеть кровью, що обыкно питье вы венное его питье должно состоять изв настоя или то время, етвару корня растеній ранольсительных и проч., ка ной хартковь есть сльдующій:

Возьми корня большой консолиды, унцію, солодки, - - з каждаго по полунціи.

По Лашынь:

Вари эти вещи вибств въ четырехъ фунтахъ обыкновенной воды трезъ несколько минутъ; пусть отваръ простынетъ.

Можно въ оной прибавить кофейную ложечку купороснаго спирта (spiritus vitrioli): сего отвара надобно пить по чайной чашкъ три или четыре раза въ день.

Есть

Есть много и других в расшентй, много других в корней склизистых войства живительного и стягивательного, изъ коихъ дълаются настои, или отвары. Таковы сушь кокушкины слезы, квитовыя свлена, мать и матиха, лычяное свямя, сассапарель и проч. Безполезно бы было предписывать на оныя рецепты; проетой настой съ оными, или отварв изъ оныхъ, составляеть все потребное, и больной можеть пить того или другаго, сколько самъ похочешъ.

Выгоды **о**шЪ розовой консервы, при-Seemby.

Розовая консерва (conferva rofarum) особенно пригодна въ семъ состояни бользни, т. е. въ первомЪ степени оной. Она дается вЪ томЪ или друинмаемой гомъ пишьт изъ вышеписанныхъ, или сътдается съ по большо- ложки. Но ежели она будеть принимаема но малымъ пріемцамъ, то не можно ожидать никакой пользы. Я никогда от оной выгоды не видаль, естьли не выходило ея по три или по четыре унціи въ день, да и чрезъ не малое время. По сему приему я видълъ оть нее удивительныя дъйствія; и я желаль бы очень, чтобъ она предписываема была во всъхъ тъхъ случаяхь, гав находится просохаркание.

Явкарство противб втораго степени кахотки.

жина.

Когда густая харкотина, тяжесть еб груди, иссущительная лихорадка и всв оную сопровождающіе признаки доказывають, что въ легкихъ составился нарыев: то я предписываю хину; потому что сте токно одно есть лъкарство, от в пособія коего можно надъяться положить преграду всеобщему стремленію соковь къ гнилости. Я предписываю хину слъдующимъ образомЪ:

Способъ предписывашь оную. Возьми наилучшей хины, - - - унцію.

Истолки (ежели она въ коркъ) въ мъльчайшій порошокЪ; раздъли сей порошокЪ на осмнатцать или на дватцать равных в частей.

Больчой должень принимать по пріему чрезь каждые при часа подь видомь катышково, делаемых в сь помощію малаго количества сиропа, или изъ рюм-ки обыкновеннаго его питья.

Ежели случится, что хина будеть слабить, то электуанадобно изь оной составить электуарій (по Руски, рій взь такь сказать, размазеньку) сь помощію розовой конторой насервы сльдующимь образомь:

— добно давать боль-

Возьми розовой консервы, - - четыре унціи. наилучшей хины въ порошкъ - - - унцію.

Померанцоваго, или лимоннаго сиропа столько, быть. еколько потребно для составленія из всёхь сихь веществь какь бы патоки.

ному, ко-

гда хина въ порощ-

къ сла-

Смѣшай

По Лашынь:

Recipe conservæ rosarum, - - vncias quatuor.

Chinæ optimæ in puluere, - - - vnciam.

Syrupi aurantiorum, aut limonum, quantum
fatis est ad conficiendum el Etuarium.

Misce.

Больной должен в употребить сте количество в в спосебь четыре, или пять дней, т. е. по унцти св полови- укотребною в в день, за три или за четыре раза. Когда сте злектуа-количество все изойдет в, то надобно опять повто-рій. рить, ежели обстоятельство того потребует в.

Тъ, кои не могутъ принимать хины въ самомъ настой ел веществъ, т. е. въ порошкъ, или въ электуарги, жины въ должны настоять оную въ колодной водъ. Даже ка- колодной водъ, иог-жется, что колодная водъ есть наилучшее распуска- да больной тельное для извлечентя силъ изъ хины, такъ какъ не можетъ мы упомянули въ главъ 3, § 6, примъч. 14 сего Тома, нимать въ

TT 3

еамень ея п очемь мы будемь еще говоришь во всеобщей табливеществь, ив, Томъ V, въ словъ хина. т. е. въ

порошкѣ. СпособЪ настой.

Возьми полунцію хины вЪ порошкъ, положи ее дълать и въ бутылку или въполштофа воды, настаивай черезъ пать сей сушки; по томъ процеди сквозь тоненькое полошно: больной должень употребить сте количество за три или за четыре раза вЪ день.

Хина тогда бываеть про-

Когда есть признаки воспаления, то хину почитаемъ мы противною; но когда достовърно извъстно, шивыз, ко. что въ груди есть гной, то тогда она есть наилучшее лъкарство, какое токмо можно предписать. Правпризнани да, мало находишся людей, кошорые бы швердо ръшились на пристойное употребление жины въ семъ пергодъ бользни; а то мы не безъ причины думаемъ, что можно бы от оной получать величайшія выгоды (11).

Ko-

посда, когда сложе. ніе больнаго распожено къ симъ признакамь.

Даже и (11) Хина, которая есть превосходное явнарство въ семъ періодъ 60явани, не пригодна, накъ - то замвнаетъ весьма основатильно Г. Бужанъ, когда есть призники воспаления, и даже тогда, когда больной имбеть расположенное сложение къ симь признанамь. Я видъль одного больнаго, въ которомъ жина причинила, послъ двунедъльнаго вли тринед вльнаго оной унотребленія, жаръ и раздраженіе въ груди, эт конми два раза последовало провомарнание. Сін приняюченія прекр. шлемя и упишаемы были дюжиною бупылокъ Бонскикъ водъ, кои выпиваемы были сряду по бущылк в на день по упрамъ. Сь одною больчою последовали такія же приключенія, котя, начавь сперва съ шестания прановъ существенный соли жины (fal effentale chine), доведена она была до прієма восьми грановъ только той же соли. Бонскія воды доставили ей такое же облегченіе.

Польза етБ БонскихЪ водъ.

Вонскій воды и сами по себь весьма цьлебны въ чакотив. Я видъль между прочими одного больнаго, которой послъ употребленія оных в чрез в мъсяць съ половиною, или чрез два м всяці сряду, почувствоваль от того превосходныя действія; и я не сомнёваюсь, что ежели бы онъ продолжаль употреблять их чрезъ всю весну и явто, то бы выздоровление его было гораздо скорве; потому что нынь наслаждается весьма добрымь здоровьемь

Когда будеть извъстно, что въ груди (въ лег-что надокихо) есть парыво (12), не выпоражнивающися однако бно тогдо же

чакотка, такъ накъ нереныя бользит и всё другія бользин Отгердедолговременныя или продолжительныя, требуеть со стороны больнаго ніе себя и великаго себя отверденія; но то бъда, что ръдно случаєтся это ви перпълидъть. Чакотные часто такъ бывають непокорны и ослушливы, что вость сопринуждають Лькаря оставить ихъ. Тогда одна остается имъ под- ст роны пора только въ шарлативахъ, которые, правда, всегда готовы да больнаго. вать лькаретва, но обыкновенно миня надеждою, доводать до гроба.

Съ другой стороны нестоворчивые больные, и при всей ими обходионазываемой довъренности къ Лъкарю имъющіе какое - то отвращеніе тельность иъ лъкарствамъ, требують от того, кто ихъ пользуеть, великой со сторообходительности и ласки. Ему то надобно искать въ пищеупотоев ны Лъкара, леніи то, чемъ бы дополиить лъкарства, или по крайней мъръ замънить тъ, кои непріятны и предъпрочими въ большемъ количествъ.

Всъ же сіи выгоды можно найши въ пространномъ нарывномъ, нарывное положенномъ между плечми, на которое кръпко надобно настоять, и прижипокуда гной окажется истощившимся. Послъ сего нарывнаго надобно ганів. сдълать прижиганіе къ рукъ (близь плеча), которое нужно содержать чрезъ все время бользни, да еще года чрезъ два и по соверешенномъ прошествіи оной.

Хотя Г. Буханъ въ семъ членъ не упоминаетъ ни о нарыя. Выгоды момъ, ни о прижиганіи; однако мы можемъ увърить, что почти отъ сихъ ньть сильныйшихъ средствъ противъ сей бользии; и что ежели нь онымъ двухъ лъв прибавлена будетъ жина, нанъ льнарство противутнильное и пръти- нарствъ, тельное, то особенно ускорится изубленіе больнаго.

(12) О существовани ето не можно тогда сомивваться, когда презв уто поначетырнадцать дней, вв кои обыкновенно продолжается восталение легатырацать дней, вв кои обыкновенно продолжается восталение легатырацать, не получено отв Натуры нужных выпораживании, то е что есть ежели больной не хариаль, не имъль обильнаго испражнения низомь, сей нарывъ не мочился густою мочею; ежели по прошестви сихв четыратица или абти дней больной не выздоровьль, ни даже мало сталь сблегчень; сцессь; ежели еще напротивь ликорадна продолжаеть быть довольно сильною; ежели дышание вего еще принужденное; ежели у больнаго бывають время отв времени небольшие озновы и кв вечеру удвоения; ежели щоки дълаются красными, а зубы сухими; ежели есть жажда.

Умножение жестоности всткъ сихъ признаковъ поназываетъ , Котор й что вомика (такъ называется нарывъ или чирей въ легиямь) вся называется совтавиласъ.

Кашель кою.

могда бу- же харкотиного, и не выльчивающійся разрышениемо за деть изав- то надобно покуситься прочкнуть его внутри. На сей от метних конець надобно больному давать нюхать и вдыхать есть на. вы себя пары теплой воды, или уксуса, заставлять рыві. кашлять, смыяться, кричать и проч. (13).

Ежели

помини.

Камель бываеть безпрерывные; онь поднимается при малый шемь движени, или накъ сноро больной приняль накую нибуль пищу. Больной можеть прилечь тольно на больной бокь, а часто и совсымь не можеть лечь; онь принуждень бываеть простаивать или просиживать день и ночь; снать онь не можеть; онь безпоноень; часто на него находить ужасная тоска съ пономъ на груди, а наи-паче на лиць.

Ночью онъ пответь; часто изо рту его пахнеть премерзиимъ запахомь, а особливо гнилыми лицами. Онъ ощутительно худъеть; роть и языкь у него сухи; ничто не можеть утолить его жажды; голось его слабь и охриплей; глаза его уходять подъ лобь; на груди его противь больнаго мъста иногда примъчается небольшая опухоль и перемъна цвъта почти непримътная; у нъкоторыхъ людей можно узнать опухоль прижиманіемъ впадины желудка, а особливо когда онъ кашллетъ.

(13) Надобно ему давать по большому количеству мягчительной жидкости, какъ на примъръ отвара изъ ячменя и меду, телячьей воды (т. с. въ ноторой варилося телячье мясо), молона смъшаннаго пополамъ съ водою. Сіе большое количество жидности, содержа желудонъ всегда наполненнымъ, упирается противъ легинъ; а отъ сего и матерія нарыва ударяется къ горлу.

Надобно ему еще давать нюхать теплаго уксуса, а въ горко впуснать уксуса и воды для произведения нашлю. Даже еще можно давать больному по ложкъ слъдующаго питья:

Возьми сциллипического оксимеля, унцію

Кръпкаго настоя съ вузинными Цобтами, - - пяпь унцій. Смъщай.

По Лапынъ:

Recipe oxymelis scillitici, - - - unciamo bene saturatæ infusionis storum Sambuci, - - - - uncias quinque Misce.

Ежели сін явнарства не удадутся, а больной еще въ силахъ, то надобно посадить его въ нарету, или тълегу, которая бы нъсколько потрасала, а для того надобно пустить нарету по дорого негладкой.

Ежели нарыей прорвется вы легкихи, то еной случин, можеть выхаркнуть быть ртомь; но иногда случает инстат проссия, что прорыей сомики причиняеть внезапную смерть: при пр риссе случается тогда, когда количество сноя велико, вы вомики. а силы больнаго истощились.

Во всёх в случаях в надобно опасаться давать предостобольному дышать или нюхать спиртную воду, или рожнестя, п требныя летутія соли потому только, что сей прорыв всегда вы семь ввергает в в сильной облюрок в. случ. в.

Ежели матерія, которую больной извергаеть, знани, ногуста; ежели кашель уменшается; ежели дышаніе трые дастановится свободнье: то можно ласкаться надеждою ють нь-к трую надеклу

Аства должны тогда быть легкими, но сило- къ в издовозставлятельными; пригоднъе же всъхъ прочихъ цып пищеупоплячій легонькой бульюнъ, отваръ изъ крупо или изъ пребле іе
сагу, кашица изъ отборнаго сарасинскаго пшена; а и лънар.
вмъсто питья надобно больному давать сыворотки послъ пахтанъя, или простой сыворотки, подсыченной б льному
исдомъ. Сте время бользни шакже требуетъ хины, предписыкоторую надобно предписывать подъ видомъ и употаа онъ
приближина.

(14) Ежели сомика или нарыей лоннент или воздар вопроченения вы пустоть легкихы, между плеврою и что над б-Томб II. Ч легь на дълань,

нати больной не чувствуеть болье боли въ груди; онъ ды- Пограциюшеть свободно, просыдаеть ночи спокойно, возвратиль накоторую сти, въ

⁽¹⁴⁾ Мы за долгъ почитаемъ присоединить, что накъ пищеупотре - Чрезъ леніе, предписываемое Г. Буханомъ здёсь, есть основаніе пользованія: ск лько то оно должно наблюдаемо быть не тольно чрезъ все теченіе бользии, времени но и продолжаемо чрезъ долгое время, въ ноторое больной почитаеть должно себя выздоровъвшимъ. Возвраты чахотки по тому тольно часто и слу- продол. чаются, что получившіе облегченіе въ оной погрытають противь жаться пищеупотребленія.

жина разослегкими: що единственный способь выпорознить естьенся по оттуда, состоить вы томь, какы мы уже упомянующей и, чтобь сдёлать посредствомы насёчки отверзте между ребрами. Но какы сёя операція, называемая емпіемою, должна всегда производима быть искуснымы Хирургомы, то безполезно описывать здёсь оную; мы только то дадимы знать, что она не столь стращна, какы обыкновенно думають, и что вы семы обстоятельствы она одна только остается для спасенія больнаго.

€ 2.

жишь

разсуждеміи сего чинимыхчасть своих силь, чувствуеть аппетить и проч; тотчась почитаеть онь себя стольно здоровымь, сколько быль до больани, и воть онь предается прежнить забавать, даже излишествать. Онь онять паль вы чамотку; пошли жалобы на Лькаря, которой будто бы счень рано объявиль исцыленіе, да и это де исцыленіе было только мечтательное; но вы самоть дыль зависьло только оты большого саблать его существеннымы и прочнымы посредствомы наблюденія своего тище-употревленія презы шесть мысяцовь, презы водь, презы два и болье.

МиниврБо

Одинъ тритиятиятиятия человъкъ, собою плотной и сильной подпаль воспалению легинкь, которой сть онаво пользуется посредетвомъ провопусканий повторяемыхъ и реотныхъ, отъ которыхъ однано еще живъ остается; но выздоровление его есть наитомительнъйшее, и чрезъ нъсколько мъслизъв оказывается у него начинаю. щаяся чакомка. Онв тотчась требуеть помощи, и строго наблюдаеть предписанное ему пище употревление. Это было въ началъ осени; и хотя эта пора, да еще зима воегда бывающь вь сихь случаяхь неспособными: однано онв следующею весною стольно поправился, что почель себл совершенно изявнившимся. И такъ онъ предается прежней привычив , а особливо ушъхамъ стола; но по наступлении слъдующей весны еназалось у него опать провожарканів, соединенное съ таними же припаднами, начіе у него были прошлаго года. Онъ принимається внять за пящеупотревление и пригодныя явняретва, нетерыя его возстановляють въ такое же течение времени, такъ что второю веспою опъ бы почемъ еще себя совершенно вымъченнымъ, естьми бы не вылъ жернитою такси же на себя довъренности въ первую весну. И такъ онъ не пекидаетъ первато пищеу потревления, однано же и не такъ пртино оному последуеть, чтобь не почувствоваль следующею осенью весьна сильнаго возчуветвованія чакотик, ноторое его убъидаеть

О симптоматической тахоткв, т. е. о такой тахоткв. которая произошла отб другой бользии.

Сія бользнь не можеть быть выльчена, ежели вь семь напередъ не вылъчена будетъ та бользив, которая видъ чапроизвела тахотку. И такъ когда сей видъ тахотки комин напроисходить от в золотухи, от в жабы, от в скорбута, от в чать кочеодышки, от в французской бользни, и проч.: то на-ніемъ той добно сперва заниманься пользованием В той бользни, ноторая которая произвела стю тахотку, и следовательно пред-произвела писывать пригодныя авкарства и пище употребление. чахошну.

Когда сія бользнь зависишь ошь непомърных выпо-что надоражниваний, какого бы свойства они ни были: то не ток- бно тогда мо надобно их в остановить, но еще и возставить си- дългть, лы больнаго пристойнымь твлодвижениемв, диэтого чахотна питательною, желу дкокрвпительными и проч.

Матери слабыя, нъжныя и очень еще молодыя мърныхъ часто впадають вь стю бользнь оть очень долговре-выпоражменнаго кормленія своих в младенцев в своим в моло-совтив ком В. И так в надобно им в, как в скоро он в примътять, матерям в, что ихъ силы и аппетитъ пропадають, отнимать которыя ыладенцовъ от грудей, или призвать другую корми- въ сію 60-Y 2

произошла отъ непо-

лицу, лезнь ошъ

экишь виредь шолько пищеупотревлениемь, и онь уже послъ совершеннаго воздержанія ощь веего могущаго разгорячить, возвратиль постоянное себь эдоровье, коморое онв жадишь, простившись с всяними излишествими.

* Видно, что не можно назначить срока, чрезъ которой делжно продолжаться пищеупотревление. Наинадежнъйший для человъна, которой угрожаемъ быль сею губительною бользнію, есть тоть, чтобъ не покидать онаго чрезь многіе годы, да его и никогда не надобно понидать вдругт. Ежели сочинитель предписываеть выше предосто. рожности при начати онаго, то нонечно еще болбе надобно прилагать предосторожности при оставлении его ; и сіи предосторожности штыв нужные бывающь, чымь пищеупотревление долье продолжалось и чемъ было спрожае.

елишкомъ лицу; а иначе онъ не могушъ ласкашься, что выздодолговре- ровъютъ (15).

нормленія.

S 3.

(15) Весьма важно замъщить, что наставление Сочинителя относится только до матерей, ноторыя слишкомь долго кормять; потому что иасательно твхв, кои кормять чрезв предписанное Природою время, тв изв страху, чтобь не впасть въ сію бользнь, не должны переставть кормить. Мы поназали въ главт і примъчаніи 2 Тома I, что вст матери должны исполнять сію необходимую должность, и упстиянули, что Мортонь замътиль, что накоторыя матери, угрожаемыя по видимому чахоткою по причина ихв сухощавости и слабости, отв оной освободились молококормлечіемь. Ежели молококормленіе далается ланарствомь въ сей бользни, то накь можеть статься, чтобь ено же могло быть и причиною сей же самой бользни?

Чакошка развъ весьма ръдно причиняется молококормленіемЪ. Вользни, ма кои молокормленіе есть лв-Kapство. Природа никогда не предписывает Ъ

закона,

котораго

бы не мо-

жно было

исполнишь.

Почему оно почти ниногда и не бываеть причиною оной. Ежели иногда встръчаются женщины, принуждаемыя оставить нормаение по причинъ: то сія бользнь всегда имъеть причину древнъйшую, ноторую надобно иснать или вь пищеупотревленіи ихъ прежде кормленія, или вь ихъ тълосложеніи, или въ тълосложеніи ихъ отца и матери.

Всянь знаеть, что молококормление есть двиствительныйшее явнарство для предупреждения заваловь грудей, послыдствий родовь, называемых различимся молокомь; скопа загрубблаго молока, воспаления въ подбрющи, скоповь и вередовь въ маткъ: бользияхь толь обыкновенных и толь опасных родильницамь.

Чтмъ болте станемъ познавать Приролу, тъмъ болте увъримея въ истинив, что Природа никогда не предписываеть закона. котораго вы мы не могли исполнить. Она производит з чатіе въ женщинажь: сія женщина, снольно бы нъжна, сислько бы сл.ба ни была, питаеть однако же своего младенца, носить девять месяцовь въ утробъ своей, и раждаеть, равно нанъ и сильнъйшая женщина, да часто и благополучное. Ежели бы во власти было уволить себя оть сего труда, то конечно можно бы было увидать велиное число женщинь, которыя бы полагались на старанія других для возврещенія плода их в удовольствия; но Природа тупв положила порядон в Матка. конторая его въ себя принимаемъ, есть единое мъсто, въ которомъ онъ можеть оживляться и открываться; и на сей конець, любулся. такъ сназать, въ ней содержащимся сонровищемъ, она затворнется. вообще, тотчась по получени, и тогда только отпервается, когда младенець, дошедши до последняго степени, не осщавляеть болье мвета, конорое бы расширинься могло.

5 9 3. 0 0000

Обб Яглинской тахоткв.

Стя бользиь есть непримътное увяданте всего тьла безъ нарочитато степени лихорадки, безъ Свойство кашля, безъ трудности въ дышанти. Она сознивание съ слабосттю, съ недостаткомъ аппетита, не-пищеварентемъ и проч. (16).

Люди нрава безпокойнаго и нешерпѣливаго, также предающіеся пишью спиртных напитково, или ды- кто онож шущіе воздухомъ нездоровымъ, болье всъхъ оному женъ. подвержены.

Пользование сей бользни.

Мы охотно присовътуемъ, наипаче въ пользованїи сей бользни, дізту легкую и питательную; мнотое тьло движеніе на вольномъ воздухъ, и употребленіе горьких веществъ, которыя имъють свойство поправлять и укръплять желу доко.

Таковы суть: хина, стародубка (gentiana), ленарства: ромашка и проч. Сти вещества особо, или порознь кана, настаиваются въ водь, или въ винь, такъ какъ мы стародубвыше показали: больной сей настоенной жидкости ка, ромаще долженъ принимать по рюмкъ часто въ день.

4 3

Ho

Младенецъ выходить на свъть. Что жь дълаеть Природа для предупрежденія бъдствій и смерти, коимь бы подвергли его яства, употребляемыя взрослыми? Тотчась по разръшеніи оть беременности, она сворачиваеть меченіе вещества, питавшаго младенца въ утробъ его матери; она складываеть его въ двухъ хранилищахъ (въ грудяхъ), въ коихъ количество молока, сбыкновенно обильнымъ бывающаго, почти всегда сразмърнымъ находится съ аппетитомъ младенца, которой, будучи болье или менье сильнымъ, имъсть болье или менье нужды въ пищъ.

⁽¹⁶⁾ ИзЪ изчисленія признаковь видно, что сей видь чакотим есть точно тоть, которой, собственно говоря, называется Аглинскою чакоткою.

куиоро- Но лъкарешво, особенным в образом возставля- сной эли- ющее пищеварение и много споспышествующее къ вынсиръ. пользованию, есть купоросной эликсир (elixivium vitrioli), принимаемой по приему дватцати или тритцати капель, за два раза въ день, по рюмкъ воды

или вина.

Стальное сино есть еще превосходным в лакарили желью ством в в в сих в случаях в; оно укрыпляет в твердыя, и особенным в образом в помогает в Природ в в в составлении хорошей крови. Вот в каким в образом в далается сте вино:

Спосебьего Возьми стальных или жельзных опилок извыстных выстных вы Аптекахы поды Латинскимы именемы - Limatura martis, три унцій; положи их вы бутылку; влей на нихы фунты былаго вина; пусть настаивается чрезытри недыли, вы кои по два раза вы день тряси бутылку: процыди сквозь пропускную бумагу.

Ero упот- Больной долженъ сей жидкости принимать по реблять. . столовой ложкъ два или три раза въ день.

Важность Но пріятныя забавы, собесѣдничество съ людьувеселеній, ми веселыми и забавными, верьховая ѣзда, предпочтиверховой тельнье въ сей бользии всьмъ лъкарствамъ. И такъ, тешествін когда только достатокъ больнаго позволяеть, совъв проч. туемъ мы ему предпринимать долговременное путешествіе для своей забавы, какъ способнъйшее средство возвратить себъ здравіе, такъ какъ уже нами и сказано въ примъч. 6 и 7 сей главы.

Строжайтей воздержности. (Другой совъть, не менъе важной, есть наблюденте строжайшей воздержности, наипаче ежели плотоугодте было причиною бользни; но то бъда, что сему-то совъту вообще весьма не охотно слъдують. По сей-то причинъ большал часть молодых в людей, вредав-

предавшихся блудницамь и премерзкому пороку рукоблудія, вообще тогда развъ отъ сего отстають, когда ихъ силы уже не позволяющь имъ шому прежаваться, и тогда бользнь уже сдълалась неизлычимою. Я того видълъ поразительный примъръ въ нъкотором в молодом в челов вкв, на дватцать втором в году от в роду, изв коего мудрыйне совыты, даже данные людьми, долженствовавшими имъть наиболье власти надъ его духомъ, никогда не могли вывести еей премерзкой привычки. Онъ не переставаль то дъдать даже въ то самое премя, когда посредствомъ пищеупотребления и лекаретев старались его освободишь от сей жестокой бользни. Он погибъ, такъ что не возможно было ему сдвлать никакого облегченія. Мы особенные будемь говорины о руковлудіи BB TOME IV, BB IN. 57, \$ 3, TACHE IV, BB KOMOPOND показано пользование горбатости, причиненной плотоугодіемь и излишними любовными забавами.

Вообще въ сей бользни, да и во всъхъ другихъ, первое ленервое лекарство состоитъ въ томъ, чтобъ избъ-карство въ какой нигать причинъ, оныя произведшихъ, или могущихъ будь больоныя отягчить.

\$ 4-

Средства предохранять себя отд различных видова кахотки.

Первое лекарство въкакой нибудь болбэни, естьто, чтобъ мабъгать производящей оную причины-

Мы не хотим окончить сей главы, не присо-предокравытовав от всего сердца всым желающим избавить нительныся от различных видов тахотки, чиоб они предствами принимали столь много телодвижентя на вольном от сей воздух , сколько могут ; чтоб избытали всякаго ху-бользин даго воздуха, да еще наблюдали наистрожайшую трезвость.

Ежели тахотка савлалась нынь толь обыкновен-воздухь и ною бользнію, то не мало должно причину оной при- презвость имсать

писать модь дожиться поздо спать, за ужином виного навдаться, и провождать каждыя вечеринки за бутылками вина, или около чаши пунша и проч. Сти напитки, употребляемы будучи въ слишком великом воличествь, не токмо вредять пищеваренто и отнамають аппетить; но еще воспаляють кровь и подкигають такоть такосложенте.

TAABA 8.

О лихорадках внутренних или нервных в.

Лихорадки нервныя нынв стали весьма обыкно-ANA Tero венными между нами. Причину оных в без в сомный на-SIM YNXOстоль ны- добно приписать перемень, учиненной въ образв нань обычно- шей жизни, и многоразличности сидячих в работь; потому что наиболье подверженные онымъ люди суть венны, и нт наитв, кои имъютъ телосложение слабое и хилое, кои 60xte онымъ под- пренебрегають тело движение, кои употребляють яства слишкомЪ нешвердыя, кои предаются ученію сЪ верженъ. излишнею горячностію, или кои слишкомъ напиваются крыпких в напитковь.

§ 1.

Причины лихорадоко внутреннихо-нервныхо.

Удручам
тів стра- всемъ тівмъ, что можетъ привести въ уныніе, или сти, труды духа, изсушить кровь; почему нечаль, страхв, безпокойствія,
кудыя недостатокъ сна, глубокія размышленія, яства маловства. питательныя, незрълые плоды, огурцы, дыни употребленныя въ слишкомъ великомъ количествь, грибы и проч., могутъ подать къ оной случай.

Воздух вырой, занершой и нездоровой может Воздукъ также оныя причинить. Почему чаще примъчаются сырой, заонь въ дождливыя погоды, и губительныйшими быва- нездороють для техь, кои живуть вы домахь нечистыхь и вой. низкихЪ, вЪ улицахЪ узкихЪ, вЪ гофшинпаляхЪ, тюрмахЪ Years e, nome pa surtuinted, exploited

Люди, коихъ темпераментв истощенъ излише-ныя выноетвомъ любовнаго плотоугодія, частыми слинотегені-ражниваями, слишкомъ умножаемыми гистительными, или нія. другимъ какимъ примъпнымъ выпоражниваниемв, весьма подвержены сей бользни.

Еще же можно подпасть лихорадкам в нервнымв, Остановия ежели кто носить мокрое платье, ложится на земль испаренія. сырой, предается непомърнымъ трудамъ; наконецъ, какЪ скоро кто находиться будеть въ случат испытать останоску испарины, или спазмодитеское сжате въ твердыхб, какъ-то показано въ Томв I, § 3 тлавы 12.

Прибавимъ еще, что онымъ подвергнуться мож- непорядочно от слишком в больших в и слишком в частых в не- ность въ порядочностей въ пищеупотреблении: слишкомъ вели- треблении кая воздержность не менње вредна, какЪ и слишкомЪ великія излишества. Ничто столь не содъйствуеть къ содержанію шта въ здоровомъ состояніи, какъ установленное пишеупотребление; ничто также столько не способствуеть къ произведению лихорадоко самаго худаго свойства, какЪ противное тому.

(Мы присоединимъ ко всъмъ симъ причинамъ и распутть, коимъ толь часто подпадають молодые люди; а несть съ имянно распушность съ женщинами и частое излілніе женщинасвмени. По сей - то причинъ новобрачные, плотоугод блудів. ники, вольнодумцы, нещастные предавшіеся мерзкой привычкъ рукоблудія, наиначе подвержены сей больз-III MIN. Jours II.

ни, какъ то им покаженъ въ Томъ IV, гл. 57 5 3. членъ IV.)

\$ 2.

Признаки лихорадоко внутреннихо-нервныхо.

признаки предше-

Уныніе, потеря аппетита, слабость, усталость послі и мальйшаго движенія, безсонница, глубокіе вздохи, робость, суть вообще предвієтники сей бользни. За сими припадками слідуюють пульсь малой и тастой; сухость языка, хотя больной и не чувствуєть нарочитой жажды; онь ощущаєть поперемінно небольшіе ознобы и небольшіе жары, кои обнаруживаются краснотою лица и проч.

признаки. СущеВскоръ по томъ больной жалуется на головокружение и головныя боли: у него тошнота съ позывами на рвоту; пульсо скорой и иногда перемежливой, мога блъдная, похожая на выдохичест пиво. Онъ съ тяжести дышеть; грудь у него подавляется; онъ имъеть легкія отсутетвія духа (обезумленія).

Признани, Ежели около девящаго, десящаго или двънащияизъявляющіе благощіе благополучной
перемонь. выпоражниванія окажущся на низь, или небольшая сырость на кожь, или ежели случищся какое нибудь
загнісніе въ томь или другомь ухь, или какія нибудь широкіе тиры на губахь или носу: то можно
ожидать какого нибудь щастливато перелома.

Неблагоподучные признани-

Но ежели у больнаго непомерной поносв; ежели у него проливной потв, за коимъ следующь частые приступы сильнаго обморока; ежели языкъ дрожить; ежели конесности охолодели; ежели пульсв дрожищь или при ощупи онаго чувствуется какъ бы ползущи червь; ежели у больнаго есть припрышки тен-

жиново ; ежели зрънте и слухъ почти погасли; ежели нехотя извергаетъ свой помето: то весьма можно опасаться близкой смерти.

(Прежде дальныйшаго чтенія, читай і и 2 главы сего Тома).

\$ 3.

Пищеупотребление, которое надобно предписывать твмв, кои страждуть лихорадками внутрениими-нервными.

ВЪ сей бользни весьма нужно больнаго содержать Больнаго ма свъжемЪ воздухъ и вЪ поков: мальйшее движение надобно отличитъ его, причинитъ безпокойствия и даже об- на свъ- мороки.

Падобно не токмо поддерживать его бодрость, понов. Для но еще и ласкать его и оживлять надеждою скораго чего? выздоровленія. Въ сихъ лихора дкахо всего вреднье пред-полдержиствавлять воображенію больнаго умоначертаній печаль-вать его ныя и наводящія ужась; оть сихъ умоначертаній часто больость и причиняемы были лихора дки нервныя: то надобно ли сомньваться, что онь могуть отяготить ихъ?

Не токмо не надобно разслаблять больнаго, но діэта долнапротив того нужно под терживать его силы и оныя жна быть оживлять діэтого питательною, крительными. Почему кашица, панадо, всё ему подаваемыя яства должны смётиваемы быть съ виномъ, но притомъ всегда сразмёрно съ свойствомъ и напряженносттю припадково.

Сыворотка съ виномъ, слабинькой недусъ, оба питеподощряемыя померанцовымо или лимоннымо сокомо, примичны будутъ вмъсто обыкновеннаго питья. Сыворотка съ гортицею также будетъ пристойнымъ питьсмъ въ сей лихорадкъ.

Важность вина въ сей больз-NH.

Вино, естьян бы только можно было достать его пельнаго, было бы одно нужным в лекарством в в сей бользни; потому что доброе вино имветь всь свойства крепительныхб, не имъя ни одного ихъ худаго качества: я говорю доброе вино, по тому что хотя роскошь савлала напитокъ сей общимъ; однако ръдко случается получить его цельнаго, а наипаче бедняку человьку, которой можеть купить его развъ только малое количество за разъ (1).

Я часто видаль больных влихора дками нереными, которые не смотря на то, что почти уже не имыли пульса, а безпрестанно бредили, у коихъ конетности охолодели, наконецъ имели все признаки смерши; однако оправились, выпивая вЪ каждой день по бупылкъ добраго вина въ сывороткв, въ овсяной водв, въ негусь и проч.

ИзЪ винъ налобно чкое вино.

Доброе вино Бордосское старое лучше всего въ сихъ случаяхъ. Его можно давать однимъ или смъ. тать ста- шанным в св вышеупомянупыми пишьями, глядя на оброе Борлос- столтельства.

> Крашко, вЪ сей бользни все дъло состоитъ въ томЪ, чтобЪ поддержать силы больнаго, давая ему часто и по малым в пртемам в показанныя нами питья, или другое какое свойства горячаго и крвпительного.

Не надобно Однако же не надобно слишкомЪ разгорячать больслишкомЪ наго или пишьями, или одъялами и проч. Наконецъ PRESCOPAчать боль- яства должны быть легкія и даваемы въ маломъ коли-Hare. чествъ.

6 4.

⁽¹⁾ Очень прудно во встхъ винныхъ лавкахъ найти хорошаго цельнаго вина. Правительство верьма должно обративь внимание на сей предмешь. Вино нынв употребляется при столахь почти встхв дестаточных выдей и дворянь.

manag duamarch dayer du fan 4' moa ume hebananela

Явкарства, кои надобно предписывать еб лихорадкахв внутренних в-нервных в.

Ежели больной вЪ началь сей бользни чувствуетъ ипекакутяжесть и боль въ желудкь; ежели нозываетъ его на анга. Копрвоту, то нужно будетъ дать ему легинькое рвотное: пятнащить или дватцать грановъ ипекакуанги въ рять.
весьма мълкомъ порошкъ, или нъсколько ложекъ реотнаго голепа, будутъ соотвътствовать вообще совершеннымъ образомъ сему показангю. Ежели тъже пригнаки остаются, то сте рвотное надобно повторить
на другой или третта день, всегда на трехъ или четырехъ первыхъ дняхъ.

Реотным не токмо очищають желудоко, но еще важность и производимое ими обыкновенно потрясение произво-реотных вы сей дить испарину и доставляеть другия многия прево-бользни- еходныя дыйствия вы лихорадкахо первныхо тыхы, вы коихы ныть знаковы воспаления, и вы коихы Природа требуеть себы оживления.

Тъ, кои не похотять опуститься на рвотное, Славительдолжны принять для отищенія первых путей неболь- ное для шой пріемь ревеню (2), или настой сь Ялександрійскимо листомо и манного.

(Сте слабительное можно составить следующимь наго. образомь:

Возьни Ялексан дрійскаго листу, - - дв драхмы способъ Манны, - - от двух до трех унцій оное дво

По Латынъ:

Recipe sennæ, - - - - drachmas duas

mannæ, - - vncias duas & semis

III 3

Ha.

⁽²⁾ Когда тольно ресечь больному не противень. Въ семъ случать сдинъ ресень, въ пріемъ ощь одной до двухь драхмъ, настроечной въ одной или двухъ рюмнахъ сысоротии съ синомь, весьма пригодень. Сямъ образомъ я много разъ употребляль съ удачею.

Настанвай эти вещества в двух фунтах в кипятка чрез в два часа; процеди: больной должен в сей жидкости час в отв часу выпивать по рюмк в, покуда опорознится.

Во всъхъ лихора дках в главный пунктъ соетоитъ положение въ томъ, чтобъ учредить ходъ припадково такимъ образомЪ, чтобЪ они не были крайними ни вЪ больвоспалишельных шемь, ни въ меньшемъ. Почему въ лихорадках воспа-SEKOP2лительного рода (горяткахв), въ коихъ сила кругообрадокъ (горачекъ) съ щения слишкомъ велика, кровь слишкомъ густа, а волоти слишком в окрыплы, провопускание и другія выпораміемь, но-жинванія бывають нужными: но вы лихорадках первторое приныхб, въ коихъ Природа безсильеть, кровь распущена годно къ михорадив и безсвязна, наконець твердыя разслабли, неотмыно надобно избъгать кровопусканія, а напрошивъ того нувнутренмей, нервжно давать вина и других в крвиительных в по большим в MOHприемамъ.

Мы увъщеваемъ избъгать кровопусканія въ сей Кровопубользни шемь паче, что въ началь вообще примъчаетенаніе совершенно ся всеобщее сжате сосудново, и иногда въ то же врепротивно мя тягость и трудность в дышаніи, которая подасть въ сей бослучай думать, что есть полнокровие или излишество ати, хошя она какрови. Я находиль людей, даже и изъ Врачей, столь memcs ero обманувшихся въ семъ случав собственными своими показуючувствами, что они настояли, чтобъ пущена имъ щею по итношоробыла кровь, хотя явно было, что кровопускание имъ му виду. было противно (3).

Ho

Новое до- (в) Сін разсужденія Сочинителя доназывають, снольно - по надлежить назатель- быть разсмотрительным и внимательным въ карантеристическіе ство того, признами больней, и снольно - то многоразличны должны быть ошибскольно - им тъх в, кои ни о чем в не сомнъваются, и нои съ перваго взора на то надоб больнаго ръщать о его состояніи. Мы бы желали, наниаче въ том вме намъреніи, въ каковом сдълано сіе сочиненіе; мы бы желали, повто

Но ежели провопускание вы сей бользии вообще нарывина противно, то нарывныя вы оной совершенно нужны. Вы ней нусовни могуть прикладываемы быть сы великою пользою во всых временахы сей бользии. Ежели у больнаго есть бредв, то надобно прикладывать нарывныя кыта затылку; и доколь мапряженность продолжается, то, прикладые какы

повщоряемь мы, произвесть вы душь особь умныхы, честныхы и осторожну человьнолюбивыхы неловычаюсть из тымы спорожващамы, исторые вы распоне размысливы приступають из самому дылу, или и размышляють, знаванів да тольно на тоть ночець, чтобь уловить похвалу за чинимых ими каракщее безпримырных глупости.

Нътегда позвань я быль вы деревню для осмотру одней боль знаковь мой дывины, какы мий извыщали, сы давникь дней. Я вопрошаю стю бользней. Дывину, испытываю ее со всякимы внимантемы, наное только мий отпибки совмыство. Я не одинь разы за сте принимаюсь; но не нахожу ничего вы ном ничего не отпрываю, кр мы глубокой печали и прайней тоски. Стя ввергаеты молодая особа, толосложентя довольно сильнаго, но особенно чувстви нерадыне тельная, лишена была удовольстватя видыть ныноего, ноторой у ней о семы на сердцы лежаль; да она по тому тольно и была вы сей деревны, правильны произведенных тымы человымовь.

Я сіе узная в тогда, ногда сназая в друзьям в, у ноих в она была, что это дівнца не больна, но что ей нужно разсівніє мыслей и веселость. Однако туть бывшая одна Дама мив сназала, что я се очень удивляю; потому что ле призванный в ожиданіи меня Хирург утверждая в, что у ней есть лихородна; что надобно пустать ей кровь топчась, и что онь дасть два пріема проносных для предупрежденія щоль жестоной больни, которая, как в онь прибавлять, ее угрожала. Я настоля на мое мивніє. Сія минмая больнал отвезена была в в ся домь, и увидбешись с в любимым в предметьюм выздоровьла.

Какіе безпорядии провопусланіе и славительным причинили бы въ человънъ погруженномъ въ унолніе и терзаемомъ горестію: въ сіє время Природа слабъеть и солотя находятся въ величайтей хилости. Вмёсто сыпоражниванія тупъ надлежало стараться ободринь, оживить, укрѣпить; и для сей юной особы конечно не было ни одного толь сильнаго пропительнаго, накъ свиданіе съ милымъ ел предметомъ.

нахобно со- как в скоро выпоражнивание от в нарывнаго станетв держать уменьшаться, лучше всего приложить другое нарыввыпоражное кЪ другому мъсту, дабы чрезъ то содержать ниваніе оть нары- безпрерывное выпоражнивание, пока больной будеть вныхъ, вив опасности. нока боль

ной будеть внв Выгоды ныхъ въ HH.

Ньшь шакихь бользней, вы коихь бы я примьепасности. тиль выгоды оть нарывных столь ощутительнымь образомЪ, какЪ вЪ сей. Они не токмо возбуждаютЪ сть нарыв кругообращение, раздражая твердыя; но еще производять сей больз. безпрерывное выпоражнивание, которое некоторымЪ образом в может в замънить к рититескій выпоражниванія, весьма рыдко бывающія в семь виды лихорадоко.

КакЪ бы то ни было, благопріятивищее время ВЪ кое время бокЪ прикладыванію оныхЪ есть около начала бользни, жъзни наили когда показывается некоторой степень опемелодобно ихЪ приклады- сти, въ коемъ случав надобно прикладывать ихъ къ вашв. головъ (4).

Еже-

СЪ другой стороны, на что не отважится человъкъ, безстылно утверждающій бытіе ликорадин для произведенія провопусканія, и насказать, что великая угрожаеть бользнь, для продажи проноснымь? потому что въ деревняхъ, слободахъ и пригородиахъ Хирурги по большой части сами продающь лькарства.

Таковъ же быль одинь невъжда, которой при елучав, какъ ему нънто выговариваль за то, что онь желаеть людей дълать больными, дабы опосав лачишь, отватиствоваль между прочимь: впрочемь, государь мой, надовно каждому корминься оть своего состоянія. Сей человънъ безъ сомнънія и аза не зналь Врачебной Науки, кеторую онъ безчестиль и оскверняль.

Способъ, по коему льиствутога в нарывныя.

(4) Нарызныя, кажется, двумя способами дъйствють вдругь: болью и жаромъ, кои суть необходимыми слъдствівми производимаго ими раздражанія. Это мивніе Иппократа, которой къ вному доведень быль сходствомь, примътивъ, что въ болъзняхъ, выльчивающихся себою, заушницами, вередами и проч., Природа употребляеть сін только средств. Почему и вилимъ мы, что онъ употребляль нарыеныя всяной разъ, когда нужно было разбить бользнь, для ослабленія гивзда оной, распростраЕжели въ течение бользни у больного будеть что надозапора, то нужно будеть доставить ему ньсколько бнодылать,
выпоражниваний низомь, наставляя ему чрезъ каж больнаго
дые два дни промывание, составляемое изъ половины запорь:
нолока и половины воды съ небольшимъ количествомъ
вахара: туда же надобно прикинуть ложку обыкновенной соли, ежели это промывание не произведетъ
желаннаго дъйствия.

Ежели напрошивъ случится у больнаго нарочи- к гла той поносв, то для остановленія онаго надлежить слабъсчень Јоль II.

ему низомъ.

неніемъ и разведеніемъ оной по всёмъ орудіямъ. И шакъ онъ думаль, что боль располагала больное мъсто къ притягиванію и ко вмъщенію въ себъ бользнетворной матерія: слъдственно, что боль, произведенная искусствомъ, остръйщая естественной въ состояніи находится, уменьшая и уничтожая сію послъднюю, слълать по крайней мъръ спасительной отводъ, согнаніе бользи съ мъста; и что жаръ притягательною силою загоняль бользнетворную матерію въ то мъсто, къ мосму приложены нарывныя, откуда она вытеклеть наружу.

Но простой народь весьма удалень сть принятія сего мнь забобоны нія. Онь на щеть нарывныхь имбеть столько же преарізсужленій, пр стонасколько и мины; онь вь двйствій первыхь видить только одну на родія на прасную боль, и рану по крійней мврв излишиюю. Когла мы пред-щеть налагаемь нарывныя, то большая часть людей говорить: "Кь чему рывныхь, мучить этого больнаго: онь и такь жалокь: такь на что умно,, жать страданія? Ежели надобно ему умереть, то пусть умреть ,, спокойно; а ежели онь оживеть, то по крійней мврв не будеть ,, на нась жаловаться, что мы надблали ему рань, которыя, оти,, мая у него употребленіе ногь, или аругихь частей на нарочитое ,, время, только что послужать из продолженію бользии. "Стороки больныхь для утвержденія сихь словь не минують приводить вь воображеніи только существующіе примбры людей, которые или встались хворыми на ввкь, или умерли оть послъдствія нарызныхь.

Однано мы не убоимся сназать, что они суть сильныйшими настоящее явиарствами из встя, нановыя имбеть Врачебная наука; что ко- поняте, гда они прикладываются благовременно и водятся благоразумно, то какое делепасають больных, ноих извыстна смерть без прикладыванія жно имыть вных и что кромы неоціненных от них выгодь вы бользиях о нарывокому здысь идеть двло, они суть единственными лычарствами, ных могущими возстановить чувства вы случай апопленсія, усыпыня, соильности п паралича.

ему давать по маленькимь пріемамь тервяка нісколько разъ въ день, или вивсто обыкновеннаго пишья давать ему пить былаго декокта.

Korna eny-SH ROTTINE чечевицу похожая. Chille

Иногда около девящаго или десящаго дня видима бывает выступающая на тетевицу похожая сыпь. Какв сей выступа или высыпь часто бываеть критическима или нереломным в, то надобно весьма остерегаться противиться ходу природы вЪ семЪ двйствіи. ОнЪ не долженъ остановляемъ быть ни кровопусканиемо, ни другими выпоражниваніями; так в как в не должен в же возбуждаемъ быть и разгорятающимъ пищеупотреблеміемд. Напрошивъ того надобно поддерживать силы больнаго легкими крвиительными, какв-то сывороткого съ винома, легкима негусома, или жиденького кашицею изв сагу, вв кою прибавлено не множко вина. Вольнаго не надобно держать въ излишнемъ теплъ; однако же не надобно и остановлять легкаго и умъреннаго пота, бывающаго въ сихъ случаяхъ:

Лвнарешва кромѣ нафизивне и прфпи-

Хоття нарывных и крипительных сущь главивитими лекарспивами въ сей болезни; однато для шехъ, кои пожелали бы другихЪ, мы покажемЪ одинЪ или два нельныхъ рецента, обыкновенно предписываемыя противъ лихорадки внутренней - нервной (а).

BE

катышекЪ, ногда больной прайнъ enidi.

Волюсвили (а) Когда больчой прайны слабь, що можно ему дать волюсь или напышшопъ, состивляемый следующимъ обризомъ.

> Возыми норня виргинійской серпентаріи, Контраереы, - - упать грановъ, Вобровой струм, - - -

Истояни вее это въ ступкъ въ мълчайшей порошонь; слълай жетышьонь св помощью првиписльной конфекции, или мафранивы ensona.

По Лашынь:

Recipe Sepentaria virginiana, c ana grana decem , Contrajervæ, - -

Caftorei , - - grana quinque-Redige in minutissimum pulverem omnia; fac bolum ope confestirais cordialis, vel crocei fy upi.

He

ВЪ отчаянныхъ случаяхъ, когда у больнаго есть что долже икота, припрышки ев тендинахв и проч. я видаль не-но давать, обычайныя двйствія мускуса, даваемаго много разъ въ вольнаго день по большому пріему. Мускусв безв прекословія инота и есть превосходное антиспасмодитеское: его можно да-проч? Одинъ вашь по двашцаши, двашцаши четыре грана, три мускусъ. или четыре раза въ супки, даже и чаще, глядя по обстоятельствамь.

Иногда нужно бываеть съ мускусомо совокупить мускусь. мысколько грановь камфоры и летучей сали оленьяго смыширога, как в имъющих в силу возбуждань испарину и ури- намфорою ну. Авкарство сте составляется следующим в образом в: и летучен

OXCHERTO

же случав.

pora.

Возьми мускуса, - - - пянінатцать грановЪ,

Камфоры, - - - при грана,

Летусей соли оленьяго рога, - - шесть грановъ Следай болють, т. е. катышоко съ номощно небольшаго количества обыкновеннаго сиропа.

По Лашынв:

Recipe musci, - - - grana quindecim, Camphoræ, - - grana tria, Salis volatilis cornu cerui, - - grana fex. Fac bolum cum syrupo simplici.

111 2

Еже-

По такому нашышку надобно давать больному чрезъ наждые чешыре или пяшь часовЪ.

ВЪ шомъ же намърени можно употреблять слъдующій поро-порэшокъ MOKE: въ томъ

Возьми кория вулдырьяна, - - 20 грановъ, шафрана, - ? наждаго по четыре Бовровой струн,

Истолки все вытеть въ мълчэйшій порощокъ. Сей пріемъ дзешел шри или чешыре раза въ день въ рюмкъ смеоротия съ молономъ.

По Лашынъ:

Recipe radicis valeriane sylvestris , - - viginti grana , Castorei, { ana quatuor grana. Redige omnia in tenuissimum pulverem-

Когда лихорадна двлается перемежавощеюся. то хина въ вещеemsb.

Ежели сія лихорадка сдвласшел перемежающегося, что весьма часто случается въ исходе ся, или ежели силы больнаго истощились проливным в потом и проч. то надобно предписать хину. Сей корки въ порошкъ надобно давашь больному по полудрахмв, даже по драхив, въ рюмкв Портосскаго или Бордосскаго вина. Сей пріемъ надобно повторить три или четыре раза вЪ день, ежели желудокЪ больнаго можешЪ его снести.

ВЪ настот.

Ежели хина въ веществъ будетъ противна, то надобно настоять унцію сей корки на холодъ вЪ бушылкъ Рейнскаго или Португальскаго вина чрезъ два или три дни; и сливши его пошихоньку, давать больному по рюмкъ жидкости много разъ въ день (b).

Во скольнижъ ви--охик бхад писывать хину?

Нъкоторые Врачи предписывають хину въ сей лихорадкв и других (когда ньть знаковь воспаленія), радонъ мо- не смотря на то, перемежающаяся ли та лихорадка, жно пред- или отступная. Мы не можемъ сказать, до какого пункша будущія наблюденія уставять выгоды сей практики; но мы должны върить, что хина лихора дкопрогонятельное весьма общее, и что она пожеть предписываема быть въ большей части ли-

20-

Аругой способЪ ynompe-SARINE XIIиу.

Возьми наилучшей жины, - - - унцію, Померанцовой ворян, - - полунцію, Керня Виргинійской серпентарін, - - двъ драхмы, Шафрану, - - драхму.

Истолки всю въ порошокъ; настанвай презъ три или четыре дии въ фунть наилучшей водии; процеди.

Сего настою дается по двъ кофейныя ложечки три или четыре раза въ день въ рюмит легнаго вина, или негуса.

⁽b) Хина пригодна еще, булучи настсена въ другихъ пропительныхъ напышкахь, на прим. следующимъ сбразомъ:

корадоко, въ коихъ кровопускание не нужно, и въкоихъ не примъчается помъстнаго воспаления (5).

(Когда больной вступить въ выздоровленте, то надобно управлять имъ такъ, какъ предписано выше въ § 3 главы 2 сего Тома).

ГЛАВА. 9.

О лихорадкъ злой, гнилой, пурпуровой или петехнальной (I).

Сїя ликорадка можеть названа быть язвительною сія ликоликорадкою веропейскою; потому что большая часть радка можеть наея признаково весьма много походить на ту ужасную звана быть бользнь, которая извъстна поды именемы язвы или ликорадтулы (2).

Щ 3

Люди Европей-

сною. Для чего? Во встять тъхъ, коихъ причина есть порча со-

- (5) Мы увидимъ въ слъдующей главъ, что и самъ Г. Буханъ не во вс дожидается для предписанія жины того, чтобъ ликорадка имъл тъхъ войство перемежающейся или отступной. Можно общимъ поставить ихъ закономъ, что жина есть наилучшее досель изобстное лькарство противы всёхь ликорадовь, коихъ причина есть порча соковъ: но всё ликорадовъ, исключая воспалительныхъ, признають сію причину.
- (1) Хотя мы уже и упомянули выше сего о петехіамь и петехіальиымь пятнахь вы главь 2, примы 2 и з сего Тома; но для дальнышаго свыденія надоблю емотрыть во всеобщей тавлиць, вы Томы V, слово петехіи.
- (2) Мы показали въ главъ 4, въ примъч. 1 сего II шома, по какой причинъ Г. Буханъ шу же лихорадну называешь острою, горищею и еоспалительною; и мы привели свидъщельство Г. ле Роа, ноторой доказываеть, что сіи наименованія, изъ ноихъ сочинители сдълали толиное множество особенныхъ ликорадонъ, не иное что означають, какъ степень той же лихорадии.

Сіе же разсужденіе должно приложить и ив ликорадив глой; что долсіе имя дается ликорадив смертоноснейшей и заразительнейшей: воть жно разпо сей-то причина сочинитель говорить, что она могла бы назвать уметь ся чрезь ли-

Кий нанверженЪ риилой?

Люди телосложения хилаго и темперамента меболье пох- ланхолитескаго, у коих в силы истощены долговременлихорадив ными постничествами, бленіями, жестокими и удручишельными шрудами, любовными непомерными площоугодіями, частыми слинотегеніями и проч. наипаче оной подвержены.

· T.

Присины лихорадки злой, гкилой, пурпуровой, или петехгальной.

Унилая лихорадка и проч. причиняется нездоре-Нездоровой воздухь: вымъ воздухомъ, какимъ на примъръ дышутъ живуошь коего эна сбыкно- щте въ мъстахъ низкихъ и непрочищающте его; кавенно быва-ков в еще есть тотв, которой портять гнилыя выдохновентя находящихся въ гнтенти животных и гастееть въ гофиципа- ней и проч. По сей-то причинъ сія лихорадка весьма обы.

хорадну злую?

ен Беропейскою язеою или чумою. Но накъ пурпура, петехін и гиплость со ковъ дългють ликорадиу весьма заразительною, и никогда не являются, чтобъ купно не угрожали большею или меньшею опасностію: по енъ сущь ликорадни элыя во всемъ пространствъ слова; да мы и не замедлимъ въ семъ увъришься, ежели, шанъ накъ мы ушверждали въ шечени вышеупомянутаго нами примъчания, не мьзя не въришь, что натура представляеть намь тольно два вида ликорадокь везпрерывныхь - острыхь, одну вы довру, а другую вы злу.

Для чего дается сіе наименованіе лихорадит гиилой, пурпу ровой, или пеши-MIZASHOE!

что сделалось съ лихорадною велпрерывною - острою, то же последовало и съ ликорадною элою: ей дано было имя поразишельнейшаго признака; ее назвали ликорадною элою, пурпуровою, ликорадною элою петехіальною, или просто лихорадною пурпуровою, лихорадною петехіальною, когда высыпь или выступь, извъстный подъ именемъ пурпуры и петехіевь, господствоваль надъ всёми другими признаками; лихорадною гнилою, когда гнилость соновъ и помета наиначе оназывалась; просто ликорадною элою, когда вев опасные признани злости находились на такомъ степени, чно не для чего было ее назвать болбе гинлою, нежели пурпуровою, болбе пурпуровою, нежели гинлою. И такъ г. Буханъ имфетъ причину трантовать осикъ трекъ видахъ ликорадовъ подъ однимъ наименованиемъ. О пурпуровой ликорадав родильниць шолковано будешь вы Томъ IV, главь 50, 5 4, TACHE VII.

обыкновенна въ тюрьмахъ, въ гофшинталяхъ, въ боль ляхъ, ницахъ, а напиате когда въ нихъ много народа, а мъ больне ста сти не бываютъ довольно провоздущиваемы, или прокоздущиваемы или прокоздущиваемы прокоздущи прокоздущи

Внѣшній воздухь, которой не проходить свободно, которой безпрестанно напоевается дождями и густыми туманами, причиняеть также лихорадки злыя и проч. Симъ образомъ видимъ мы, что онѣ часто елучаются послѣ великихъ наводненти на земляхъ низкихъ и болотныхъ, а наипаче когда передъ сими наводнентями были великте жары или засухи, или послѣ оныхъ послѣдовали.

Пища, состоящая из одних в только веществ вещества животных возваналежащей примъси растений; или животныя, мясо, рыба, долгое время сберегаемыя, могуть шак мя сбереже произвести сей вид пихорадки (4): по сей то гаемыя причинь мореходцы в долговременных путешеств их и жители осажденных городов часто заражаются лихорадками злыми.

Хльбъ.

⁽в) От сего-то происходить, что больнымь, переведеннымь вы гофшпиталь, не токмо надобно бороться противы собственной больния, но еще и противы всёхы тёхы, коимы подвергаены ими дышемый воздухь. Та осторожность вы некоторыхы гофшинталяхь, чтобь больныхы одинановою бользнію собирать вы одну залу весьма муйра; но она сдылает везполезною, доколь залы между собою будуть сообщаться, доколь воздухы изы заль, вы колкы лежать больные заразительными бользнями, будеть безпрестанно переходить и смышиваться сы воздухомы заль, назначенныхы для другихы больныхы-

Единое средсиво предохранить больных в отв пагублих в двиствій сего ядовитаго воздух; состоить въ томъ, чтобъ ставить замы по одиначкъ, да и на нарочитое одну отв другой разспролніе; ианъ- то предлагаеть и начертываеть Г. ле Роа-

⁽⁴⁾ Восемь человень, говоришь Г. Тиссошь, наблись прошухлой рыбы: они всё заразились лихорадаою элою, и изъ числа сего погибло пашеро при всёхь попеченіяхь искуснёйшихь Врачей.

Хльбъ, испорченной отъ дождливой погоды, или ной жатьбъ: долгое время лежавшій; шакже вода, от в за тоянія испортившаяся, могуть подать поводь кв симь лихорадкамв.

Гніющіе трупы.

Труны, которые согнивая заражають какь бы ядомЪ воздухЪ, весьма могутЪ произвести ликорадки злыя. По сей-то причинь сей видь лихорадки часто опустошаеть лагери и мъста, гдъ находится театръ войны; а сте показываеть намь, сколько-то нужно удалять на некоторое разстояние от городовь кладбищи, бойни и проч. такъ какъ предписано въ Томъ I, глав. 4, примвч. и и глав. 9.

Нечистоma.

Негистота есть также одно из в общих в причинъ лихорадоко гиилыхо. По сему-то мы видимъ, что онв весьма обыкновенны въ большихъ городахъ между бъдными, кои дышуть воздухомь нездоровымъ и запертымъ, не радъють о систоть, и принуждены питаться яствами промзглыми и испорченными. Онъ не менье свирыствують и между тыми художниками. кои работають надь матеріями омерзительными, заставляющими ихъ постоянно быть на одномъ мъстъ.

Страсти Aymu.

Преврашности, нещастія, бъды, скорби и печали должны помъщены быть въ число причинъ, могущих в подать поводь къ лихорадкъ злой (5).

Мы

Гиавное MECIMO AHкорадки гнилой накодится вЪ нервахЪ.

⁽⁵⁾ ВЪ томъ сомнъваться не явзя, что ликорадна гнилая главное себъ мвсто имветь въ нервань и мозгу. Я нахожу, говорить Г. Лістоль, въ одномъ только этомъ дълъ такой знакъ, ноторой ее можетъ различить сть пречихь видовь ликорадонь. То правда, что и сін посабднія часто сопровождаемы бывають такими же пораженіями мозговыми и нервимми, но они въ нихъ бывають только привременными и симптоматическими, а напротивъ естественно сопровождають во всяное время лихорадку злую. Другое еще дъло, ноторое я могу привести въ свидетельство моего митнія, доназываеть нъи торымь образомъ то, что я утверждаю, а именно, что по прайней мъръ двя части людей, коихъ я видъль зараженными гнилою лиморадисю, были въ мещастін, или имъли печаль и прискорбія дука, тайный источникъ везчисленнаго множества бользней. Precis de la Medicine Prat. Tom le pag. 61.

Мы присоединимы еще, что гнилая ликорадка, верымая или пурпуровая есть вы высочайшемы степени заразительна; почему часто пристаеть она отводной только заразы: по сей причины всякой здоровой человых должены бытать зараженных симы видомыли-хорадки, естьли только непреоборимыя причины не побуждають его оставаться при нихь (6).

\$ 2.

Признаки лихорадки злой, гнилой, пурнуровой или петехальной.

Тиилах лихорадка вообще возвъщается примътною признаки слабостію, без визвъстною усталостію и почти без в предтевсякой явной причины. Иногда сія слабость бывает в стаующіє столь велика, что больной едва может в ходить, или даже и стоять, не опасаяся притом вето нибудь себъ худаго: он ваходится в величайщем в учыни; он вздыхает в теряет водрость, поражается страхом смерти.

У него есть тошнота, и иногла онъ блюеть желсью: онъ имьеть сильную головную боль, сопро-

⁽⁶⁾ Одно тоимо желаніе быть больному полезным'я можеть побулить Одни щокприближаться и оному. Но изкъ мы показали въ Томъ I, въ гл. 10 мо могуи 11, \$ 2, что больные не токмо отвращаются отв бестды, но что щіе блить
еще имъють нужлу въ одломъ только сторожь, да помещчикь, ногда больному
надобно перемънить его бълье: то надобно въ семъ случав, не опа полезными
салеь нареканія за жестоность или нечувствительность, никакъ не должны къ
допускать въ комнату больнаго ни отца, ни матери, ни брата, ни оному присестры, ни друзей и проч. Правда, врачь, да и всякая человъколюби ближатьвая особа, отт реающая отъ врать смерти единаго изъ себъ подоб-ся.
ныхъ, имъеть права на благодарность стъ сбщества; но менъе ли
онъ тогда ее достоинъ, когда великолушно не допускаеть того,
чтобъ люди, наслаждающіеся добрымъ заравіемъ, подъ видомъ ревности почти всегда безполезтой, а чаще того вредной, ввергались въ
бользяь, отъ которой почти не возможно избъгнуть, и нося послъдствія всегда плачевны, естьли только не смертельны?

вождаемую біеніем вы висотных артеріях ; глаза часто кажутся красными и воспаленными, и больной чувствуеть боль вы самых в ямках в глазы. Оны слышить журчаніе вы ушах ; дышаніе у него трудно и часто прерывается вздохами.

Признаки жарактеристическіе или существенные. Онъ жалуется на боль, противъ желудка находящуюся, въ спинъ и поясниць; языкъ сперва бываетъ бъль, но по томъ дълается чернымъ и испроръзаннымъ; зубы покрываются иломъ въ видъ черноватаго тъста. Больной иногда извергаетъ глисты верьхомъ и низомъ: онъ дрожитъ, трепещетъ и часто бредитъ.

Ежели ему пущена будеть кроев, то она кажется распустившеюся, или имъющею развъ малую только связь, да она тотась и загниваеть; пометь у него крайнъ зловоненъ, и притомъ иногда зеленоватой, черной, или цвъту красноватаго; кожа покрывается пятнами блъдными, пурпуровыми, синими, темными или черными; и иногда случаются ужасныя кровотестия изо рта, изъ носа, изъ глазъ и проч. (7).

(КЪ сему исчисленію признаково присовокупимъ мы, что пульсо тогда мало, скоро и жестоко, иногда мяконекъ и томной, и часто перемежающійся; что кожа суха, безвлажна и жгуча, а иногда холодна и клейка. Я видълъ у одной дъвушки отъ четырнатцати до пятнатцати лъть, которая пала подъ сею ужасною бользнію, кожу сморщившуюся и иссохшую, а наипаче къ концу пальцовъ, почти такъ же, какъ бываетъ у удержавшихъ свои руки долгое время въ водъ; и въ двънатцатой день ея бользни на одълахъ ея

на-

⁽²⁾ Гнісніе кроси и пурпуровыя пяшна, поставленныя здёсь віз число общикі элой ликорадки признакові, оправдывають що, что мы выше сего утверждали віз 2 прим. сей главы.

нашлись многія большія чешуи кожицы, кои она отсарала от в своих в рукв, оставшихся по тому обнаженными. Спина, ягодицы и большая часть лядвей таким в же образом в ободрались.)

Пихорадки злыл могуть различиться оть совер-что отмишенно воспалительных тьмь, что вы первых пульсо злыя инбываеть мало, уныние велико вы больномы, кровь по-хорадки чти совсымы распустилась, пятны или петехи разсы-оть тыхь, паются по тылу, а помето пахнеть заразительнымы и совершенно нестерпимымы зловониемы.

Оть лихорадоко внутреннихо или нервныхо раз-оть личаются жаромь, жаждою, которыя бывають нарочи радонь тве; цвътомь темнъйшимь моги; наконець великимь нихь или изнеможентемь и всьми другими припадками, кои до-нервныхъ. кодять до крайности.

Однако иногда признаки лихорадоко воспалитель-иногда сіе пыхо, нервныхо и злыхо такъ перемъщаны бывають различіе между собою въ предлежащей къ пользованію бользни, трудно что весьма трудно бываеть опредълить, къ которому сдълать. классу она принадлежить. Тогда - то надлежить употребить величайшія предосторожности, и собрать все свое знаніе, какое токмо совмъстно.

И такъ надобно тогда обращать вниманіе на го-какъ надосподствующіе или сильньйшіе признаки, и предписывать пищеупотребленіе и лькарства, каковых в они тресемъ слубують.

Весьма нужно замѣтить, что лихорадки воспали Лихорадки тельныя и нервныя могуть превратиться въ лихорадки тельныя и злыя и гнилыя от слишкомъ горятительнаго пищеупо- нервныя требленія, или от противных в лъкарствь, такъ могуть какъ мы замѣтили въ гл. 4, въ концѣ прим. 1 се превратиться въ го Тома.

He

Трудно на:

Не легко пазначить, скедько времени продохзначить, жающея личорадки злыя: иногда онв оканчивающея
времени между седьным и четырнатцатым днем, и инопродолжа- гда заходять за пятую и шестую недвлю. Но весьющея лима нужно замётить, что продолжение их много закорадки
висить оть телосложения больнаго и способа, по косму бользнь его пользуется (8).

ијастимвые приБлагопріятньй шіе признаки суть легкой поносо около четвертаго или пятаго дня, сопровождаемый легкою также теплотою и умъренною на тълъ влажностію; и когда поносо, теплота и влажность продолжаются чрезъ

не-

ихь продолжене ееть относительно ив возрасту-

(в) Г. ле Роа, старинной Профессоръ Монтпельерской, замътиль, что элыя лихорадии имъють весьма различныя свойства въ разсуждении возраста эграженныхъ оными людей: почему раздълиль онь ихъ и лихорадии элыя молодыхь людей, и лихорадии элыя стариновъ. Мы бы желали изложить причины, на ноихъ основывается сіе иъ дальныйшему свъденію велущее раздъленіе; но сіе предпріятіе завело бы мась за предълы, нами предписанные, и впрочемъ было бы чуждо отъ нашего предмета.

Мы упомянемъ тольно що, чно опъ говорить о продолжение сего вида ликорадия.

онт не ещоль долговременны у сщариковъ. "Вь лихорадай элой стариновь больные иногла умирають въ "восьмой или девятой день болдзни, а чаще въ одиннатцатой или "тринатцатой. Я не видаль такихъ, у коихъ бы она, онанчиваяся "смертю, длилась далье. Когда сія бользнь не похищаєть больнаго, "то обыкновенно оставляєть посль себя бользненныя и продолжи-"тельныя впечатльнія, которыя волочать его долгое время, и ното-"рыя иногда его подавляють.

Долговременн'я, но не столь опасны у молодык в людей"Анхорадка элая молодых в людей, хотя и опасна, однако гоураздо менье, нежели нанъ у стариновь; ногда больному прелопреудълила судьба избъжать смерти, то она обынновенно бываеть долуговременна, естьли тольно не иончится переломомь. Она ръдно ноиучится прежде дватулть патаго, или тритцатаго дня: часто она
удлится до соронъ патаго, шестьдесятаго дня, иногда и далье. Въ
усемъ по видъ лихорадки элой случается иногда то, что больные,
убесьма бывъ больными пятнатуать, дватузть, даже до тритцати
удней, однако минуютъ смерти. у Melanges de Physque & de Mediciу пе, рад. 171, 187.

немалое время, то часто уносять съ собою бользиь; и такъ не надобно ихъ останавливать.

Маленькіе пупырышки тетевицепо добные (сыпь), проявляющісся между петехіями или пурпуровыми паштами, сушь шакже благопріятной признакь, такь какь и тоть видь коросты, коею покрываются губы и нось вы исходь бользни.

Когда от в употреблентя вина или другаго чего крепительного возвышается пульев, а упомянутые наии переные припадки уменьщаются: то это очень хороштй знакъ.

Глухость, случающаяся около исхода бользии, бываеть также весьма часто благопріятнымь признаковь (а), такь какь опухоли и нарывы вы пахохо или вы подлючиныхо жельзахо (9).

Между нещастливъйшими признаками можно счи-опасные тать непомърной поносо съ животомъ жесткимъ и на-признанть дутымъ, пятна широкія, черныя, синія на кожъ, пры- щики во рту, потъ холодной и клейкой, териал вода въ глазахъ или ослъпленіе.

(Однако инотда случается, что слепота или терная вода туже имветь участь, какую глухость, т. е. что она со временемь проходить, и почти толь же скоро, какь бользнь).

Ъ 3

Пере-

⁽а) Глукость не всегда бываеть благопрівичным в признаком в в сей больши: да она, можеть быть, развь тогда только можеть имвив сіе свойство, когда составится нарыбь в ущахь.

⁽⁹⁾ Сін опужоли добро предозначають въ молодых влюдях (потому что они у них суть притическія). У стариновь, говорить Г. ле Рог, обынновенно бывають симптоматическими и предвыдають близкую смерть: пурпуровыя пашла или петемім бывають иногда, но ръже, таковаго же свойства.

Перемвна голоса, томное и заблуждающее зрвне, трудность при глотанен, дрожане языка и невозможность высунуть его вонъ изо рта, постоянное желане больнаго открыть себв грудь, суть также признаки неблагополучные.

смершельзнаки. Наконець, когда потв и слина напоены вровію, а мога черна, или опускаеть подсвяв черной: то больной вь величайшей находится опасности. Припрышки тендиновь, пометь зловонной и сукровитной (т. е. весьма свытлой, весьма водянистой), нехотя извергаемой сь холодомь вь конетностяхв, суть вообще предвыстники смерти.

(Прежде нежели приступить кВ дальныйшему жиенію, читай і и 2 главы сего Тома.)

§ 3.

Пищеупотребление, каковое на добно предписать больнымв, страждущимв лихорадкого злого, гнилого, пурпурового или петехіального.

намъреніе, При пользованіи сей бользни всь наши усилія которое должны, сколько возможно, стремиться къ тому, чтобъ воспрепятствовать расположенію соковъ къ пользованіи гнилости; поддержать силы больнаго, вперить въ несей боль- го бодрость, споспътествовать дъйствующей природымо дъ къ изгнанію причины бользни легкою испариною и другими выпоражниваніями.

Надобно Мы уже замѣтили, что нездоровой воздухъ чаеперва до- сто причиняеть лихорадки злыя: слѣдовательно,
етавить
больному
воздухъ ихъ отятчить; и такъ надобно сперва воспрепятствочистой и
вать, чтобъ воздухъ не пребывалъ неисходно въкомвать больнаго. На сей конецъ надобно отворить две-

ри и окны его комнаты, или боковой смежной, дабы прохлаждать воздухь и безпрестанно его поновлять, такь какь сказано вы Томь I, гл. 4; ибо естьли дышанте и испаренте здоровыхы людей дылають воздухь маленькой комнаты нездоровымь: то сте же самое не скорье ли произойдеть, естьли сте дышанте и сте испаренте выходить будуть изы такого человыка, коего весь составь соковы находится вы состоянти гнилости?

Но не довольно впускать свъжій воздухъ въ ком- окроплять нату больнаго; надобно еще употреблять уксусв, ли- комніту, монной или померанцовой или другой какой изъ ки- проч. неслыхв растеній сокв, какой скоръе себъ доставить слыми соможно, для частаго окрапливанія или опрыскиванія ками. онымъ кровати, пола и всъхъ мъстъ комнаты.

Можно также вст сін кислыя вещества употреб-или дтлять парами, взливая ихъ на раскаленную сковроду, лать изъ или варя ихъ до кипятка въ комнатт и проч.

Надлежить также поставить вы разныхы мь-давать стахы комнаты свыжихы корокы лимонныхы, померан- изы боль- цовыхы, и часто подносить поды носы кы боль- ному.

Кислыя вещества, употребляемыя симъ обра-выгоды зомъ, споспъществовать будуть не токмо къ про- отъ сихъ хлаждентю больнаго, но еще къ предохранентю отъ за- разы тъхъ, кои ему служатъ.

Пахучія расшенія, как в на примър в рута, тер-польза от побыльник в, дикая рябина, и проч. равно могушь по-очень паложены бышь в в различных в мъсшах в дома; и люди, расшеній ходящіе за больным в, лучше всего сдълають, есть-ли будуть почаще их в нюхать.

Вольному не шокмо надобно бышь въ свъжемъ надобно воздухъ, но еще совершенно на своей свободъ и поков: малъйшій шумъ можешъ поразинь его голову, и въ понов. малъйшее движеніе въсостояніи его привести въсильной обморокъ.

Въ сей бользии мало находится лъкарствъ толь летва дол- дъйствительныхъ, ка ъ кислыя, такъ какъ дано знать поднисляе- въ гл. 2, примъч. 8 сего Тома. Ихъ надобно класть мы. во всъ яства, во всъ питія больнаго. Померанцовая, лимонная, уксусная сыворотка весьма пригодна; ее надобно давать поперемънно, или на вкусъ больнаго. Еще можно ее сдълать кръпительного прибавленіемъ въ нее толикаго количества вина, сколько слабость больнаго дозволить можетъ.

Пишіе, ис- Ежели больной очень обезсильль, то надобно гла боль- ему давать негуса, или вина ев половиною воды, или обезсилень подкисленнаго померанцовымо или лимсинымо сокомо. и имбеть Въ нъкоторых случаях в можно ему дать рюмку цъльнонось. наго вина: наилучтее въ семъ обстоятельствъ вино есть Рейнское; но ежели есть поносо, то надобно предпочтить вино Портосское, или Бордосское.

когда у больнаго запора, то надобно ему данего занорь.

вать въ рюмкъ обыкновеннаго его питья по кофейной
ложечкъ виниаго камня (cremoris tartari), болъе или
менъе, глядя по обстоятельствамъ; или дать ему
вмъсто питья декокто изъ тамариндово, которой
двойную доставляетъ выгоду, т. е. послабляетъ и
утоляетъ жажду.

настой ев Настой св ромашковыми цевтами, естьми жеромашковыми цавтами, под- бользни. Его можно подкисливать, прибавляя на кажинсленной, дую рюмку от в десяти до пятнатцати капель купотоснаго эликсира (elixirii vitriolici).

Яства

Яства въ сей бользни должны быть легкими; какія долони должны состоять въ кашиць, въ панадв и проч. жны быть въ кои надобно прибавлять по нёскольку вина, ежели больной слабъ и унылъ. Сти яства всё должны подкисливаемы быть померанцовымо сокомо, смородиннымо желеемо и проч. Больной можетъ безъ всякой опасности всть плоды зрёлые, испеченные въ печи или передъ огнемъ, или даже сырые, какъ-то ябложи, смородину, вишни во консервахо, сливы и проч. такъ какъ предписано въ главъ 1, \$3, членъ I, и гл. 4, примъч. 3 сего Тома.

Никогда не надобно въ сей бользни оставлять нужно побольнаго долгое время безъ пищи. Малое количество часту яствъ и питія, но даваемое почасту, не токмо поддерживаеть силы, но еще сопротивляется склонности питье и соковъ тълесныхъ къ гиїенїю: почему надобно ему яства. давать почасту на дни небольшія количества какихъ нибуль кислыхо питій вытеупомянутыхъ, или какихъ можно сподручные достать (10).

Ежели у больнаго случится брезв, то надобно что надопочасту припаривать ему руки и ноги кръпкимъ на 640 дъстоемъ еъ ромашковыми цевтами. Сей настой, или гда у нехинной для тъхъ, кои пожелають поболье запла-го бредъ:
тить, не преминетъ произвести наилучтее дъйствге.

Сїй припарки не токмо облегчають голову, припарки расширяя сосуды конетностей, но еще, взонедши внутрь изъромаши проникнувь вы кровь, могуть противутнильного своновых цвытовь силою содыйствовать кы разрушенію гиилости сонии хины; ковь.

Tomo II.

Ы

§ 4. въ семъ случать

⁽¹⁰⁾ Сіє правило, котороє весьма важно, доказываеть, что Г. Бухань почитаеть лихорадии элыя, гнилыя принадлежащими кь классу ликорадовь нероныхь, такь накь дано уже знать вь 5 примъч. сей главы.

Пвкаретва, кои надобно предписывать вб лихорадкя злой, гилой, пурпуровой или петехілльной.

Росписе въ началъ сей бользни производить по-Рвопшыл въ началь; чти всегда хорошее дъйстве; но ежели бользнь вепромыванія и сла- дется съ нъскольких в дней, и припадки сильны, то реотныя не такъ надежны бывають. Однако же надобинель-·RIGH био всегда животь держать на свободъ посредствомъ промываній или слабительных в.

> Кросопускание радко бываешь нужнымь вы михорадкахв гнилыхв, злыхв; ежели есть признаки воспаленія, що можно шогда иногда его употребить в в первых в иинутах вользни: но вообще опасно его повторять, такЪкакЪ доказано вЪглавъ 2, примъчанти 6 сего Тома.

Нарывныя въ сей бользни пначе прикладывать Нарывныя AON KHPI не должно, как в развъ в в самой послъдней крайности. принлады-Но ежели петехи или пурпуровыя пятна вдругь проваемы падушь; ежели пульей ослабвешь чувствишельнымь бышь вЪ одной толь- образонь; ежели ссть бредв; ежели съ сими признако послъдней прай-ками соединяшся и исчисленные нами въ концъ параграфа втораго сей главы: то надобно приступить къ ности. Признани, парыснымо и приложить ихъ къ затылку и икрамъ, которые или между лядвей. показуюшь на-

рывныя.

ея ошв нарывных в ?

Однако как в нарыеныя могуть причинить въ сей чего надо- бользни антоново огонь (11): то мы предпочтительбно бояшь-HO

Ежели эло такъ распространится, что та часть не будеть имъть теплоты, ни чувствія, ни дъйствія; ежели она уступаеть

⁽¹¹⁾ Когда накая нибудь часть твла имъсть только жарь, чувствишельность, двиствіе крайнт ослабшее; когда цветь перемванися и сделамся темнопраснымъ, синимъ, чернымъ, и на поверхности составилисъ маленькіе пузырики или колокольчики съ водою сукровичною, шемною, или черною: то сіе состояніе есть начинающимся замертовлость, которую Брачи называють антоновымь огнемь.

но совътуемъ въ семъ случав пластыри изъ горгицы и уксуса, называемые синапизмами, или составы изъ луку и ржаной муки, или ржанаго тъста смътаннаго съ горгицето и проч. кои надобно прикладывать теплыми къ полошвамъ ногъ, откладывая парыеныя до крайнихъ случаевъ (12).

bI 2

ВЪ

прижатію и только слабо опять приподнимается; ежели она черна; ежели разлирается на лоскутки, или ежели съюживается: то сіе состояніе есть утвердившаяся замертоблость, называющаяся сфацелюсомь у Врачей, а по по Руски можеть назваться головиею. Авгис, traité des tumeurs, Tome I, рад. 56.

(12) Сіє правило не опровергаеть того, что мы сказали выше въ главь 6, § 2, примъч. 5 сего Тома, т. е. что надобно заранье прикладывать нарывныя во многихь бользияхь. Гиклость соновь, главная порча въ лихорадиахь гиплыхь, и крипическій высыпи съ оными соединенным безь сомньнія побудили Г. Бухана сдълать сіе изъятіе, и оно кажется весьма благоразумно: но оно наиначе касается гиплой лихорадии молодыкь людей; ибо воть какь изъясняется Г. ле Роа:

"Ланарства, употребляемыя обыкновенно при пользованіи лико Из'ятіє на "радонь острыкь, мив кажутся недвиствительными въ сей, въ сіе прави-"ликорадий злой стариновь. Ежели когда мив по щастію удавалось, ло-"то я сей успахь нашаче должень приписать кинь, употребляемой "посль общихь лькарствь по большому пріему, нашаче въ существь "ея и нарывному, приложенному заранье, Объ прибавляеть въ примъчаніи:

Я говорю нарывному, приложенному зарачёе; потому что думаю, что ежели оно такъ приложено не будеть, то часто лёнарство не производить тёхь великихь дёйствій, коихь надлежадо бы ожидать. Нарывное безъ сомнёнія можеть произвести полезное дёйствіе оттягиваніемь, которое оно причинаєть посредствомь боли и воспалительнаго раздражанія на мёсть, къ коему приложено; но, ежели я не обманываюсь, нарочитое истеченіе гноя, къ оному мёсту по том приливающаго, есть еще выгоднёе въ сихъ лихорадкахь. Сіе истеченіе, мять кажется, полезностію не уступаєть истеченію оть примиганія и щетины въ нёкоторыхь болбанняю продолжительный; и ежели я совётую употреблять нарывное зарачёе, то это по той причинь, чтобь оть такого истече іл улержаться во время усилія бользни. Извёстно, что для полнаго гноспроизведенія, производимаго нарывнымь, потребно два или три дни.

ВЪ началь сей бользни обыкновенно дают в сурмянаго рожности, тартара (tartari stibiati) или рвотнаго по малым в прімя надоб- емцамъ, повщоряемымъ чрезъ каждые два или три но давить часа, пока наконецъ больнаго начнешъ рвать, или слабишь, или производинь пошь. Сей способь довольно сходень, только бы сте лъкарство не было продолжаемо дотоль, пока больной ослабнеть.

Люди долгое время были вЪ смѣшномЪ мнѣнін, Aominoe. будто можно выгнать гиилую или язвительную матемивніе о сихъ крърію гнилой ликорадки легкими пріемами лекарствъ пишелькрепительных в или алексирарматескихв: в в следстве ченыхъ и аже ссифтр- го оди превозносили похвалами корень контратервы, крвмаческикЪ пительную конфекцію, литридаціумі и проч. каквнелвкаризмыныя лыкарства; однако по всему можно думать, ешвах Е. что они развъ весьма ръдко могуть быть полезными (13).

изъ нихъ лучше всткъ до-

Вездь, гдь только ни пужны крепительных, вино лучше всъхъ; почему и совътуемъ мы его какъ брое вино. надежнъйшее, безопаснъйшее и наилучшее лъкарство. Вино, плоды кислые и противучнильные суть единственныя средства, на кои можно положиться въ пользовяити гнилых в лихорадокв.

Однако

ВЪ ляхораднак злыкь молодык людей надобно упошреблушь пластыри изъ горянцы, или тесто съ горянцею, или составъ изъ луку. Это суть превосходныя авнарства всякой разъ, когда опасно, чтобь не случился антоновь огонь; почему и употребляются они съ величайшею пользою и въ другихъ бользнахъ, канъ-то въ оспъ му даго свойства.

что должно ду-Mame o семЪ клас-CB 45карствЪ?

(13) КЪ аленсифармаческимъ явигроттамъ не иначе надобно прибъгань, говорить Г. Ліетодь, какъ съ телиною осторожностію: ито по неразумію, изв угожденія кв бабамв и кв мивнію неввжествующей черни, дзеть ихъ безъ различія всян му вилу 6 льныхъ, тот поступаеть противь разума и спыт ; нановець погращность унотребляющихъ оныя въ бользняхъ, конкъ наружности заставили ихъ смъшать оныя съ другими бользиями, всеьма често бываеть пагубною большимъ. Precis des medicamens, Tome 1, page 181.

Однако въ опаснъйших видах в сих в лихора док в , Сножно в въ соединенных в съ петехјами или пурпуровыми пят- мана въ нами, синими, черными, надобно еще присоединить сей болозе хипу къ кислым веществам в. Я видал в, что она дъ-ни. лала почти чудеса даже въ тъх в случаях в, въ коих в петехји оказывали отчалннъйшій вид в; но для того, чтоб в очи произвели сіи дъйствія, надобно ее принимать не токмо по больтому пріему, но и продолжать употребленіе оной долгое время, так в как в сказано выше въ примъч. 12 сей главы.

Наилучий способь давать хину есть безъ пре-способъ ек кословія тоть, чтобь давать ее вы порошкъ такимъ предписмо образомъ:

Возьми наилучшей хины - - - унцію,

Истолки ее въ мълчайшій порощокь; всыпь его въ полфунта воды и прибавь столько же краснаго вина; подкисли все это тритцатью или сорокью каплями купороснаго эликсира (elixirii vitriolici) для содъланія сего лъкарства удобоваримьйшимъ и дъйствительный шимъ. Въ этотъ же составъ можно прибавить двъ или три унціи лимоннаго сиропа (fyrupi limonum).

Сей микстуры должно давашь по двъ столовой ложки чрезъ каждые два часа, или и чаще, ежели желудокъ можетъ снести.

Ть, кои не могуть принимать хины вы порошкь, должны ее принимать настоенную вы винь такимы образомы, какы мы совытовали вы примычании сего тома.

Ежели у больнаго есть нарочитой поносо, то когда у надобно ему сварить хины вы красномы сины сы при-больнаго бавлентемы туда небольшаго количества корицы, и нарочитой вы 3

подкислить всю купоросным вликсиром (elexivium vitriolicum) савдующим образом в:

Возьми наилучшей хины, - - унцію, корицы, - - - арахму, купороснаго эликсира, - - сорокъ канлей.

По Лапынь:

Recipe optim. chinæ, - - - vnciam,

Cinnamomi, - - - drachmam,

Elixirii vitriolici, - - quadraginta guttas.

Истолки хину и корицу; вари и то и другос трезъ нъсколько минутъ въ фунтъ краснаго вина; процъди; прибавь купоросиой эликсиръ.

Сей жидкости надобно давать по двъ ложки чрезъ каждые два часа.

нольна ств Ньтв начего дьйствительные вы семь видь понестых носа, какы кислыя, принимаемыя по большимы приевещееть мамь, такы какы и всь лыкарства могущия возбудить случий тихую испарииу.

тапь, ноной мушать, ноной мушать, ношать, ноной мушать жатаго соку, въ которомъ распущена драхма полыншнотою и
рвотою: унцію простой коришневой воды (aquæ simplicis cinnaтоті) и не много сахару.

Сего пишья надобно давать въ ту минуту, какъ оно поспъло, т. е. въ самое время кипънїя, и повторять его столько часто, сколько будетъ нужно.

При первых в ноявленіях в опухоли заушных жекогда ока- лізо, надобно приложить нагноивающих в катаплазмово вывается для скорыйшаго гноепроизведенія.

варыво во желъзахъ

(Налобно читать во всеобщей таблиць, въ V Томъ, подъ словомъ нагнаивающие катаплазмы, о способь их в составлять, и должно их в перемвнять свъжими чрезъ каждые три или четыре часа. Ежели опухоль не смягчается, то нужно призвать Хирурга, которой приложить двиствительныйшие, и которой впрочемЪ нуженЪ будетЪ для проръзанія нарыва, какЪ скоро созрвешь онь.) Какъ скоро примъшно будешь, что матерія созръла (14), то надобно проръзать нарыей, и продолжать всегда прикладываніе тьх в же катаплазмова. Я видаль, что вы исходь сей лихорадки нарочишые вереды, синге, антоновоогненные по видимому, лекаренные издающёе от себя мерзкой запах в согнивших в тру-нои надобповъ и разсъянные по многимъ мъстамъ тъла, вылъ-но предпичивались мало помалу от весьма обыльнато употреб- для удобленія хины в в вин в подкисленном в купоросным в спир-нъйшаго томв. (Смощри способъ пользовать выздоравливаю-излъчения вередовъ щаго больнаго, § 3 главы 2 сего Тома.) причиненныхъ сею

6 5.

Средство предупреждать и предохранять себя отб лихорадки злой, гнилой, пурпуровой или петехіалізной.

Для предохраненія себя от в лихорадоко гиилыхв, лихорадокв столь опасныхв, мы совьтуемв пищечнестрожаншую наблюдать тистоту, житье на мьсть требление

сv- предохранишельное

больонию.

OMP THEO

Однако надобно замътить, что въ глубокихъ нарыважь ямки не бываешь; однако другіе признаки могушь дашь знашь о ихь эрв-AOCINA.

⁽¹⁴⁾ Можно увтрипься, что матерія нарыва, т. е. гной созръдь, когда на нарыев находится ямна или жерло явное; ногда подъ сею ямкою ощущается мягкость и накъбы жидкость; когда окружноети нарыва не споль спали распанупы, не споль красны, и не споль больны.

сухом и хорошее имъющем в положение, теледеижеиге на вольном воздухв, употребление яств в здоровых в и умъренное питие добрых в напитков в.

Сколь Болье всего надобно избъгать заразы. Нътъ танужно изкого твлосложения, которое бы оть оной было внъ
бътать заопасности. Я видаль таких влюдей, которые заразились сими лихорадками оть одного только посъщения
человъка, страдавшаго гнилого лихорадкого; а других в
оть того, что проходили по городу, въ коемь она
свиръпствовала; и нъкоторых оть того, что были
на похоронах умерших оть нее людей, так как в
дано знать въ Томъ I, гл. 10, и выше въ примъч. 6
гл. 11, § 2.

разомъ настраждетъ сею больной какой нибудь человъкъ
разомъ настраждетъ сею бользнію, надобно приложить всякое
ступать, стараніе, чтобъ за раза не распространилась. На сей
конецъ больнаго надобно положить въ пространной
больчой не комнать, удаленной, сколько возможно, отъ жилыхъ
покоевъ дома; держать его въ крайней чистоть; еще
почасту поновлять воздухъ.

Всю, что касается больнаго, всю, что идеть оть него, должно тошчась уносимо быть. Надобно часто перемънять у него бълье, и люди здоровые, кромъ опредъленых сму служить, должны избъгать всякаго съ нимъ сообщентя, такъ какъ предписано въ Томъ 1, гл. 2, толкующей о систотъ, и гл. 10, толкующей о заразъ.

то дой:

Ежели кто боител заразы, или страшится, не жны ав-заразился ли, то тотчась надобно ему принять реотнать тв, наго, и трудиться от оной освободиться обильнымы ион болт- употреблениемы настоя сы ромашковыми цейтами. Ежели страхы всю остается, или показываются какие инбудь нещастные признаки, то должены про-

должать употребление сихъ предохранительных в средствъ чрезъ день или два.

Вивсто обыкновеннаго питья можеть онь употреблять настой съ ромашковыми цветами и хиного, а сверхъ того передъ сномъ пить по фунту кръпкаго негуса или по нъскольку рюмокъ добраго вина. Я часто принуждень быль слъдовать этой практикъ въ тъ времена, въ кои свиръпствовали лихорадки гнилыя, и я совътоваль ее другимъ людямъ, всегда съ пользою.

Люди вообще спѣшатъ прибѣгнуть къ прово-кровонупускантямо и слабительнымо, какъ къ сильнѣйшимъ сканіе и
предохранительнымо противъ заразы; но сіи средныя опасны
ства не токмо мало могутъ отъ оной предохранить, въ семъ
но часто истощая силы, умножаютъ только опа-случаъ,
сность (15).

Jone II.

Ь

Что

Быль примърь, что одна женщина совътовала нъноей матери, неимъвшей на себъ оспы, и недавно ходившей за больвшимь сею бользнію сыномь, пить чрезь многіе дни безь пощады цьльное вино, и притомь всякой вечерь передь сномь принимать по полудрахмъ терьнау мать сіл въ т чности посльдовала данному совъту. На четвертой день пристила къ ней воспалительная лихорадка (горнука), которая на другой день оназалась оспяною; но при всъкъ наилучшимъ образомъ употребленныхъ старалілхъ пупырышая не прочинались, оставались маленьнями, осъдали, разходились по тълу, и больная умерла на патомъ дни бользани,

⁽¹⁵⁾ О предохранительных ланарствах надобно то же сназать, что ложное о собственнодайствующих. Большая члеть из предохранительных мавне о суть только ланарства бабушек, кои она хвалять какь могу-предохращих предупредить всянія бользии; однако же радно случлется, чтобь нительне паль человань при унотребленіи оных от бользии. Причинуных сего надобно иснать вы неважества такь, кои их предписывають. У них почти никогда не бываеть относительности между предохранительными и лакарствами пригодными кы той бользии, которую хотать выльчить; да часто они бывають совершенно противными.

Что касается до людей, кои пользують зараженных сими лихорадками больных в, то они должны всегда носить при себъ грецкую губку, или платок в, напоенный уксусом в, или лимонным соком в, которой они должны нюхать, когда приближаются къ больному. Прежде нежели придуть въ кампантю, должны они вымыть себъ руки, и, ежели возможно, перемънить свое платье, такъ какъ данъ уже имъ о семъ совътъ въ Томъ I, главъ 4.

T A A B A 10.

О лихорадкъ съ мълкого сыпью, или высыпной, у Врасей называющейся лихорадкого тетевицеподобного.

откувасія Сїя лихорадка получила свое имя отів высыпи вихорадна или маленьких в пупырышково, выходящих в на кожв, получила віе имя? и похожих величиною и видом в на герны тетевицы (1).

Ciu

чте должно різуміть чрезь сей видь льжаретьь? Настоящія предохранительный сущь самыя ядкарства той боядани, от к торой человдив хочеть избъснуть. Надобно предаться пище употревленію, питілть, ядкарствать, коихь требуеть сія боядань; однить словоть, употреблять почти по такому же количеству сіи пособія, такь какь бы человдив имбль въ самоть двав ту боядань. На сіе видань примърь въ совдтв, которой сочинитель даеть б) щимся, чтобъ не пристала къ нить элап лихорадка; еще видань и другой въ поведеніи ле-пень де ла Клотюра въ разсужденіи жителей, которые испытывали первые признаки повальной бользни, опустощавтей Гроссь - Тейль. Observations sur les maladies epidemiques, аппез 17.0,

Вемля, въ (1) Театръ сей бользни котя и во Французскихъ съверныхъ провинкоихъ она діяхъ, какъ - то въ Нормандіи, находится, но наиболье въ Германіи и ище примъчается. примъчается. Сти пупырышки иногда бывають красными, ино-какого гда бълыми; однако сти два вида пупырышково иногда цавта пуперемъщаны бывають одинь съ другимъ.

Сти пупырышки вообще многочисленные бывають на которой вы тыхь мыстахь, вы коихы пото обильные идеть, части такахы то на груди, на шей и проч; но иногда также болые выстая все тыло оными покрывается. Умыренной поты или сыпають? кегкая влажность по тылу особенно способствуеть кы сей высыпи; почему и бываеть она тогда бользненные и опасные, когда кожа суха.

Иногда случается, что сія лихорадка бываеть сія вольным первобытною, существенною пли единственною; но ча-бываеть ще всего симптоматитескою, т. е. произтедшею оть тествендругой бользни, какъ-то оть оспы, кори, лихорадоко ною, но воспалительных (горятеко), или злыхо, нервныхо и проч. чаще симво вськь сихь случаяхь она вообще бываеть слъдствіноматическою емь пищеупотребленія, или лькарства слишкомь горятительныхо.

У и горадка съ сею сыпью наиначе пристаетъ къкто болье людямъ нрава недъятельнаго и темперамента флегма-оной подтитескаго или хлинкаго. Молодые люди и старики болье верженъ? оной подвержены, нежели мужи въ совершенныхъльтахъ.

Оня еще обыкновениве бываеть у женщинь, не-она сбыкжели у мущинь, наипаче же у женщинь деликатных вываеть у и недвятельных в, которыя пренебрегая твлодсижение, бываеть у всто сидять на одномы мысть, и питаются яствами а оссбливо водинистыми и малосочными. Сти женщины наипаче под-посль ровержены сему виду ликорадки во время их водовь; довьда часто тогда теряють и жизнь.

§ 1.

Присины лихорадки высыпной тесевищепо добной.

Пихорадка тетевицеподобная причиняется иногда сильными страстяти и сильными впечатлёніями на в 2 душё,

душв, какЪ- то непомврною печалью, глубокимъ болвзнованіем в и размышленіем в. Продолжительныя бавнія, упорныя выпоражниванія, діэша слишком в легкая и слишкомЪ водянистая, дождливыя годовыя времена, излишнее употребленте зеленых в плодов в, как в - то сливв, вишенв, огурцовв, дынь и проч. часто подають кЪ оной случай. Испоршившіяся воды, яства поврежденныя от в дождя и непогодь, или лежавшія долгое время, могушЪ также оную причинить.

Причины ни у родильницЪ.

Сія бользнь у родильниць часто бываеть сльдсей больз- ствіем в упорнаго запора, продолжавшагося во время беременности; она еще можетъ причинена быть непомърнымъ употреблениемъ зеленыхъ плодовъ и яствъ нездоровых в, къ которым в беременныя женщины слишкомЪ прихопливы.

> - Но главнъйшая причина оной у сихъ женщинъ есть недъятельность или неподвижность. Женщина, провождающая жизнь сидячую, и въ то же время пиптающаяся яствами только грубыми, ръдко избъгаетъ сей бользни при родахЪ.

> По сей причинъ эта лихорадка особенно пагубна женщинамъ большаго свъта, и даже женамъ фабрикантовъ и купцовъ въ торговыхъ городахъ, которыя, желая помочи своимъ мужьямъ, почти во все время своей беременности от нихъ не отлучаются; между тъмъ какъ сія бользнь едва извъстна женщинамъ дъятельным в и трудолюбивым в, живущим в в деревнях в и предпринимающимъ пристойное тълодеижение вольномЪ воздухъ.

> > 2.

П ризнаки лихорадки тетевицеподобной.

Когда тетевицепо добная лихорадка бываеть су-Признаки предшещественною или бользнію сть себя существующею, ствующіе. mo

то она означается почти такъже, какъ и прочія высыпныя лихорадки, т. е. легкимь озноболю, за которымь послъдують жарь, слабость, уныніе и вздохи.

Сін признаки сопровождаемы бывають пульсомо признани малымо и тасты по, трудностію въ дышаніи, тоского сущеши тяжестію въ груди (небольшимъ кашлемо. Г. Ле-булущей пекъ де ла Клотюръ замьчаеть, что сей видь каш-высыцимя сеть существенный и неотлучный признакъ будущей высыпи тетевицепо добныхо пупы рышково (Observations sur les maladies epidemiques, année 1770). Больной ворочается; иногда бредить; языкъ его кажется бълымъ; руки у него дрожать, и онъ часто чувствуеть внутри жгучій жаръ.

У родильницъ молоко пропадаетъ (расходится у родильпо тълу), и другія выпоражниванія останавливаются. нидъ.

Больной чувствуеть подь кожею зудь и боль признаки подобную происходящей оть уколонія иголки. Вскор высыпию по томы начинають появляться безчисленные маленькіе прыщики или мылкіе пупырышки, красные или былые; а за сею высыпью вообще послыдуеть уменьшеніе жестокости припадковь.

Пульсв становится полные и правильные, кожа влажные, и потв, по мыры какы созрываеты больные, испускаеты особенной вы сей лихорадкы запахы гнилости. Слабость, уныне, тяжесть вы груди пропадають, и обычайныя выпоражниванія постепенно возвращаются.

Около шестаго или седьмаго дни высыпи, пупырышки начинають подсыхать и падать; что причиняеть весьма досадной зудв на кожь.

выпь яз- Вообще они высыпають въ третій или четверявется и той день, ежели они крититескіе; но когда высыпз
вропавопадаеть: бываеть симптоматитеская, то они могуть выходить во всякое время бользни.

Признаки опасные. Иногда сї и пупы рышки то появляются, то опять пропадають: въ семь случав всегда есть опасность; но когда они вдругь пропадають, не являяся опять, то опасность тогда становится величайтею.

у родильницъ сти прыщики вообще наполнены чевицеподобныхъ поватыми, а иногда перемъщанными съ красными. ковъ у родильницъ.

(Прежде дальнъйшаго чтентя, читай главы и и 2 сего Тома).

\$ 3.

Пищеупот ребление, которое на добно предписывать страждущим в лихорадкого высыпного; тетевицеподобного.

Во всех в сысыпных лихорадках в, какого бы онв Цвив, нот рую на-вида ни были, главная цель состоить въ томъ, чтобъ добно себъ предупредишь внезапной уходь прыщиково и спосивпредлашествовать всему тому, что можеть ускорить ихъ тать при созрвнісяв. Савдовательно больнаго надобно держать пользова-HIM AHKOвъ такомъ растворени воздуха, чтобъ сысыпь не радокъ выскоро шла, да также, чтобъ и прыщики не взошли сыпныхЪ внутрь прежде созрѣнія своего; и такъ больному навсьхъ. добно давать только яства и питія свойства умфренно пишаниельного и крвпительного.

не надобно Комнату его не надобно держать ни въ излишбольно немъ теплъ, ни въ излишнемъ холодъ, да не должно держать въ излиш- кутать его многими одъядами; наконецъ паче всего немъ теп. надобно держать его въ покоъ и развеселять: потому лъ. что заподлинно нътъ ничего, чтобы столь удобно вгочяло внутрь сысыпь, какъ страхъ или болзив

ВЬ сей бользни пристойными яствами суть ле яства, гонькіе циплячьи бульюны съ небольшимъ количествомъ жавба; пападо, сагу, или кашица, изъ коихъ въ полфутта каждой вещи можно прибавить, ежели слабость больнаго того требуеть, одну или двъ ложки столовыя добраго сипа съ нъсколько гранами соли и не много сагару. Больной можетъ еще ъсть хорошія лолоки печеныя передъ огнемъ, или вареныя съ другими плодами качества послаблятельнаго и прохладительнаго.

Что касается до питій, то они должны при-питье, косподоблены быть состоянію силы или безсилія больнаго. Ежели у него еще есть силы, то питіс его маль. должно быть легко, какb-то ятная вода, настой ев мятою, или слядующій декокть:

Возьи п опилков в оленьяго рога, в по дв в унции. Корин салысепарелли,

Вари до кинятку въ четырехъ фунтахъ воды; процеди; прибавь несколько сахару.

Вольной это долженЪ пить визстю обыкновеннаго пинъя.

Ежели же больной очень ослабъ и обезсилълъ; еже-когда обезли высыпь не выходить приличнымь образомь: то силълъ.
питье должно быть нъсколько кръпительнъе. Ему надобно тогда давать сыворотки съ виномо, подкисленной
померанцовымо или лимоннымо сокомо; и это питье
потребно дълать болье или менъе кръпкимь, глядя,
какъ обстоятельства того потребуютъ.

Иногда тетевицеподобная ликорадка подходиш в когда сіл подв ликорадку гнилую. В в сем в случав надобно под-бользов подерживать силы больнаго сильными крепитель в им, соликорадку еди-глилую.

единенными съ кислыми веществами; и ежели степень гнилости нарочить, то надлежить предписать хину.

что пона-Когда голова очень болить, то надобно послазуеть мяг-бить животь мястительными промываніями (а). промыва-His?

Яркарства, кои надобно предписывать больным в лихорадкого тетевицепо добного.

Ежели яства и питія идуть добрымь порядокем ино нужны бы- камЪ, то лъкарства бываютъ мало нужны въ сей ваюшь, ко- бользни. гда пищеупотреб-

леніе жоро-

Одна-

Важность въ умфренномЪ пищеупотребленіи въ сей бользчи, доказанная •пышомЪ.

(2) ВЪ Журналь, подъ названіемъ Commercium litterarium, 1735 года, пом'тщена исторія объ одной чечевицеподовной ликорадив, опустошавшей Стразбургь въ месяцахъ Нолбрь, Денабрь и Январь. Сіл исторія поназываеть намь нужду въ умбренномь пище употребления въ сей бользии; она извъщаеть еще, что Врачи не всегда бывають изъ числа тъхъ, нои первые открывають настоящее пользование бользней.

, Сія лихорадна, говорить сочинитель, производила ужасныл , опустошенія даже между людьми крвпчайшаго твлосложенія; и ниу каное явнарство не удавалось. Больные вдругъ объящы были озно-, томь, поленотами, потяготами, болью въ спинъ, за чемъ последо-, валъ великой жаръ; они теряли тогда же аппетить в испышывали з величайшую слабость. Около седьмаго или деващаго дня появлялась и чецевицеподовная высыпь, похожая на пишнышки отъ укушентя , блохъ происходящія, съ великою тоскою, вредомь, везсонницею и э, сильными движеніями, когда больной находился въ постели. Крово. , пускание было смершельно. ВЪ семЪ отчанномЪ состояни одна новии вальная бабка дала сама оть себя некоторому больному, находившемуся э, въ сильнъйшемъ степени бользни, промывание изъ дождевой воды, у изъ коровьяго масла безъ соль; а вмъсто обыкновенного питья два у фунта ключевой воды, полфунта добраго вина, соку изъ одного "лимона и шесть унцій самару, свяренных в вмость до поны. Сін лол, нарешва теличайшій успъхь оказали: животь послабился, опасные ,, припадии исчезли; больной возвращиль свои силы и избъгнуль ошъ д челюстей смерши.

Сему образу пользованія подражали многіє другіє яюди всегда еЪ благополучнъйшимъ успъхомъ.

Однако ежели высыпь не происходить надле-обства, жащимь образомь, или ежели больной до крайности тельета, но не токмо нужно поддерживать его силы зують крыпительными, но еще и приложить ему нарывныя. крыпительными

Наплучшимъ крвпительнымо въ сихъ случаяхъ нарывныя весть доброе вино, кое больной можетъ принимать Спос бъ дакакъ въ яствахъ, такъ и въ нити; и ежели есть хину съ знаки гнилости, что часто случается, то надлежитъ виномъ и тогда давать хину съ виномъ и кислыми веществами, кислыми такъ какъ мы присовътовали въ лихорадкъ гнилой.

Нькоторые Врачи прикладывають вдругь многія нарывныя. карывныя чрезь все теченіе сей бользни. Когда натура томится, когда высыпь то является, то пропадаеть: то надобно поощрять ее безпрерывнымы прикладываніемы малыхы нарывныхы; но безы сихы обстоятельствы и одно нарывное намы кажется довольнымы.

Однако, когда пульсо внезапно ослабнеть, пупырышки пропадущь, голова защиится: то надлежить тогда приложить многія нарывныя къ чувствительныйшимь частямь, къ ляжкамь, къ икрамь и проч.

Кровопусканте ръдко бываеть нужнымъ въ тете-кровопувидеподобной лихорадкв, и иногда оно дълаеть въ снане обыней много зла; потому что оно обезсиливаеть и противно
разслабляеть больнаго. И такъ къ оному не надобно ни- въ сей бокогда иначе приступать, какъ развъ только съ согластя възни, и
Лъкаря. Я помъщаю здъсь сте разсужденте для того,
что обыкновенно пользують стю бользнь у родиль цамъ.
ницъ обильными кровопусконтями и другими выпоражнивантями, такъ какъ бы она была очень воспалительна; но стя практика обыкновенно бываеть смертельною, такъ какъ доказано въ предыдущемъ замъ.
чанти.

Jone II.

Больные въ сей бользии всегда съ трудностію въ труд- сносять выпоражниванія, и она часто, кажется, похо-сять вы. Дить на лихорадку гнилую, нежели на лихорадку восторажни- палительную.

мего? Хотя тетевицеподобная лихорадка часто припредостопредосторожности,
к ихъ

требуеть его оставить и прибъгнуть внезапно къ пищеупотребсія 60ленію очень прохладительному и къ большимъ выпоражниваніямъ. Мы не безъ причины думаемъ, что гораздо
редильвезопаснъе поддерживать силы больныхъ и побуждать
ниць естественныя выпоражниванія, нежели прибъгать къ
искуственнымъ пособіямъ, которыя истощавая силы,
сдва ли не всегда умножаютъ опасность.

тмо на- Ежели сіл бользнь сдълается упорною, или вылать, ко- вдоравливаніе больнаго долго тянется, то надобно гла бо- ему давать хины въ порошкъ въ винномъ, или въ льзнь дол- водлномъ настов, по его выбору.

жогла на
Пихорадка тетевищеподобная, такъ какъ всъ продобно про-чія лихорадки высыпныя, требують легкихъ прогичищіть: щеній, коихъ не надобно опускать, какъ скоро лихорадка прошла, и силы больнаго, и всколько возвратившись, то дозволяють.

(Когда бользнь прошла, и больной вступиль въ выздоровление, що надобно его пользовать, такъ какъ сказано въ § 3 главы 2 сего Тома.)

\$ 5.

Средства предохранять себя отб лихорадки техевице-

способъ, Средства предупреждать и предохранять себя какъ дол- отъ сей бользни состоять въ томъ, чтобъ дышать жны по-

воздухом чистым и сухим в, употреблять доволь ступать ное твлодвижение, вкушать только яства здоровыя беременныя Беременныя женщины должны избъгать запора и предлям избълринимать повседневно столько твлодвижения, сколь-жаны сей ко могут в; онъ должны опасаться всть плоды испор-бользым тенные или худаго свойства; и когда разръшатся от в бремени, то должны строго наблюдать прохладительное пищеупотребление.

(КЪ одной женщинъ, которую я аккупировалЪ, примъчаприсшала, спустя двы атцать или пятнатцать часовы ніе на средпослъ ея родовъ, весьма сильная лихорадка. Я ее принисываль двумь или тремь рюмкамь вина, которыя ей даны дать оную были по ея прозьбъ во время ея боли. Я ее посадилъ у родильвивсто всякой пищи на бульюнь; обыкновенное ея наць. пишье составляль капиллярной сиропв (т. е. сиропъ женских волось) (бугириз adianthi), разведенной въ теплой водъ. Хотя тогда была осень и стужа начиналась уже; однако я не велёль умножать покрываловъ ея. Чрезъ сушки не была лихорадка уже толь сильна, но была боль въ головъ, въ спинъ, въ поленинъ и выпоражниванія нёсколько задержались. Бульюну приказалъ я употреблять только три раза въ день, и вельль исправишь два промыванія на простой водь. На другой день послъ родовъ появились тегевицепо добные гулырышки бълые на шев, на груди и на рукахЪ; но вев припадки нарочито уменьшились. Я приказаль слъдовашь сему же пользованію, и въ шестой день послъ родовъ больная въ состоянии была встать.

Я не хочу внушать того, будто тому пользованію, коему я последоваль въ семь случат, надобно следовать во всякихъ. Извъстно, что есть весьма нъжныя обстоящельства, кои требують величай-шаго проницанія и глубочайшей учености. Но тогда одинь токмо Врачь можеть рышить, которой чыть ско-

вкорће призванъ будеть, тъмъ лучше; потому что весьма часто случается, гдв не надобно не опускать времени.

Я бы желалъ шолько, чтобъ Хирурги, повиваль-Погрѣшности, чиныя бабки и прислужницы, для коих в комната родильницы нимыя при весьма не разумно бываетъ мъстомъ сходбища, были жожденіи за родиль-смысленве, и чтобъ поболве разсуждали о состолницами, ній лишь только родившей женщины; чтобЪ они увъпроискодать отрены были, что эта женщина подобна человъку, подъявшему непомърныя шягости, у коего кровь и соложнаго O RIMERON ки находящся въ болье или менье сильномъ движении: родакъ. слъдственно, ежели больную въ семъ состояни нагрузять яствами, какъ скоро родить, или спустя нъсколько минушъ послъ ея родовъ, что весьма чаето почти всегда случается, то желудокЪ, раздълявшій также тягость съ прочимъ тъломъ, не въ состояніи болье бываеть ихь переварить; хилд, имьющій составишься из в сих в яствв, состоять будет в только из в частицъ сырыхъ, которыя, взощедши въ соки тъла, откроють съмя гнилости, къ которому они весьма склонны. Ежели кромъ сего будуть давать имъ горятительных в на добій, как в-то вина и сахару, вина и корицы весьма горячих в (клентвейну), эликсирово, конфекціи и проч. такЪ какЪ водится, для, какЪ говорять, выгнанія молока потомь: то сін пряныя и раздражательныя вещества разнесуть пламя повсюду, гав будуть кругообращаться, и произведуть воспаление въ той части, которая наиболъе къ оному расположенія инветь.

Важность Ежели, размышляя о сихъ истиннахъ, они досодержания знають, что случающияся съ родильницами нещаниць въ сти по большой части происходять отъ пренебрежения умъренной оныхъ истинъ: то почувствують, сколько-то важно и прохладительной пищеупотребление умъренное и прохладительное въ обыдіять. кновенныхъ родахъ для предупреждения всякаго нещаетнаго обстоятельства, и сколько-то нужна строгая мокротожидительная дёэта въ случав, когда таковыя обстоятельства подадуть первые знаки ихъ существованія, какъ то доказываеть приведенное мною примъчаніе.

(Мы увидимъ въ Томъ IV, гл. 50, § 6, членъ VI способъ, какъ должно вести себя при родильницахъ больныхъ сею лихорадкою.)

ГЛАВА 11.

О лихорадкъ отступной.

Сїл лихорадка такъ названа от в отступленія по чему или уменьшенія припадковь, которое оказывается ино- названа сіл тихорадка гда скорье, а иногда позже; но вообще прежде осьма- отступно дни бользни. Сей отступь или отступленіе обы- ною кновенно предшествуемо бываеть легкимь потомь, посль котораго больной чувствуеть нарочитое облегченіе; но спустя немного часовь припадки, которые не совсьмь еще пропали, опять приступають.

Отступленія отступной лихорадки имьють иногда правильные періоды; но чаще бывають непорядочными, такь что продолженіе ихь то долье бываеть, то короче. Какь бы то ни было, чыть болье отступная лихорадка походить на лихорадку перемежающуюся порядосную, тьмь менье она опасна.

(И так в отступныя лихорадки суть тв, кои св нача- Свойства на нашествія своего до конца не покидають больнаго; стетупной лихоно коих в припадки, каковы суть ознобо, позевота, радки холодь, жарв и проч. начинаются и умножаются попеременно, так в что бывають поры на дни, в в кои больной чувствуеть себь немалое облегченіе, однако же всю ва-

находясь еще въ лихорадкь: потому что у него пульсв всегла болье лихорадотной, нежели въ естественномъ состояніи, и упадокъ силъ всегда нарочитой; чего не примъчается въ промежуткъ перемежающихся лихора. докб, о коихъ выше толковано было въ гл. 3 сего Toma.)

\$ I.

Присины лихора, ки отступной.

Отступная лихорадка обыкновенно бывает в в в м в-Macma, Bb коихъ она стахъ низменныхъ, болотистыхъ, покрытыхъ стоячею водою и лъсами; но она еще пагубнъйшею бываетъ ваеть. вь шъхъ округахъ, гдъ великой зной соединяется съ великою мокрошою, какъ- то въ нъкоторыхъ мъстахъ Африки, въ Бенгалъ, въ Восточныхъ Индіяхъ и проч. въ коихъ отступная лихорадка вообще ееть гнилаго рода и весьма опасна. Она чаще примъчается въ пасмурную погоду, а наипаче послъ дождей и великих в наводненій.

Кто наиomemyn-HOM!

Всякой человъкъ оной подверженъ: ни полъ, ни возрасть, ни телосложение оть оной не освобождають. лихорадив Но тв, кои суть темперамента хилаго, кои занимають жилища низкія и нечистыя, кои дышать воздухомь нечистымъ и непроходчивымъ, кои не предпринимають довольнаго телодвижения, наиболье оной подвержены.

Признаки лихорадки отступной.

Первые признаки сей лихорадки сушь позевота, потягота, боль въ головь, головокруженія, и то жаръ, то холодъ. Иногда больной съ перваго приступа оной начинаеть бредить; онъ чувствуеть боль противъ желудка, и иногда туть примъчается опухоль; языкъ

у него быль; глаза и кожа часто кажутся желтыми; онь часто блюеть желтыю.

Пулься иногда бываеть нъсколько жесткимв, но ръдко полиымв, и выпущенная изъ жилы кровь не представляеть знаковь воспаленія. Нъкоторые больные терпять непомьрной понось, а другіе напротивь мучащея весьма досаднымь поносомв.

Не возможно описать всъхъ признаков сей бо-не возможльзни; потому что они различны по обитанію мъста, но опипо твлосложению больнаго и по годовому времени. Они ветхъ примогунть шакже много различаться отв пользованія и знановь, от в многих других в обстоятельствь, коих в долго по прачибы было исчисаять. ирайняго

Стя бользнь показывается то подъ признаками различия. лихорадоко желтныхо, то лихорадоко нервныхо, то радна окалихорадоко гнилыхо. Не ръдко случается видъть, что зывается сін признаки слъдують одни за другими, или дже часто подъ перепушывающся вмъсшъ въ одно время у шого же жоргдовъ человъка.

(Таковые признаки встръчаются вивстъ только въ лихорадкъ отступной непорядотной, которая впро- А особливо чем в очень часто бываеть; вы семь случав больной когда они не ръдко терпитъ корти, боли нодобныя коликъ, ко- непорядоч. лотью, ломотв и проч.

желчныхъ,

Но когда лихорадка отступная порядогна, отступто холь ея весьма полобень холу ликоралоко переме- ная михожающихся, такъ что по порядку ся отступлений мож-радна поно распознать вседневную, троиную, тетверодневную подобна и проч. Даже часто перемежающияся превращаются в в перемеотступныя, а отступныя въ перемежающияся: такая-жающимто между ими находится близкость!

Лихорадка отступная порядотная не опасна, Она не опатакЪ какЪ и перемежающаяся. Мы увидимЪ, что не сна; но ma ная опасна.

такова - то лихорадка непорядотная, которая часто превращается въ воспалительную, вълихора дку гнилую, и которая тогда всегда подвергаеть жизнь больнаго опасности. Отступная, соотвытствующая лихорадкы тетверодневной, неукротимье и опасные всыхъ. Обыкновенными ея следствіями суть сухотка, лихорадка внутренняя, водяная бользны и проч.

Мы прибавимЪ, что вЪ сей лихорадкѣ больные имъющъ иногда слинотегение, которое часто бываетъ крититескимв. Иногда они во время припадка испущають горятую могу.

(Прежде дальнёйшаго чтенія читай главы і и г cero Toma.)

€ 3.

Пищеупотребление, коему надобно следовать во лихорадкв отстипной.

Оно долтельно къ припадкамъ.

Пищеупотребление должно присполоблено быть кЪ жно быть госполствующимЪ, т.е. главнымЪ признакамб. Когда они им выш в какой нибудь знак в воспаленія, що діэта должна бышь весьма легкая, а пиште слабое и мокротожидительног. Но когда признаки ея подобны признакамЪ лихорадки нереной, или гнилой, то надобно полдерживать силы больнаго яствами и питіями свойства нъсколько болъе пишашельнаго, каковыя мы показали вЪ последней лихорадкв, ш. е. вълихорадкв сетевицеподобмой. Однако надобно бышь весьма разборчивымЪ вЪ употреблении веществь горягительных в; потому что сія лихорадка часто превращается вЪ безпрерывную отъ пище употребления горячаго и лъкарствъ прошивныхЪ.

Во встхъ случаяхъ **ФОЛЬНАГО**

Какого бы рода ни были признаки, только надлежить больнаго держать прохладно, чисто и спокойно. Ero

Его комната должна быть большая, сколько возможно, надобно и воздухъ въ оной надобно поновлять часто отворя- держать ніемъ окошекъ или двери. Надобно ее опрыскивать чисто, спонойно, уксусомо, лимониымо сокомо и проч. у больнаго ча- на свъсто переменять былье, одняло, простыни и проч. и жемъ возтопічась выносить вонь его кало и могу.

Хотя мы одобрили всв сій вещи; однако за нуж-причины, ное почли вторично ихъ одобрить, какъ такое дъло, чля котокотпорое въ разсуждени больнаго важнъе самыхъ хва-часто повлюнныйших выкарствъ (а). торяются ть же совъщы.

Пркарства, кои должны принимать больные лихорадкого отступного.

Для достижения до выльчения сей лихорадки, Средства надобно сперва стараться сделать ходь ея столь же авлать простымь, сколь прость ходь лихорадки переме-кодь сей жающейся порядогной. Ежели есть нъкоторые знаки порядочвоспаленія, що можно въ томъ успать посредствомънымъ. кровопусканія; а во всякомъ другомъ случат надобно Кровопувоздержанься от в кровопускания, потому что оно осла- тольно бы бить больнаго и продлить бользнь. оно было

Но что касается до реотнаго, то оно развъ дъльно поръдко не прилично будетъ, и вообще великую можетъ рвотное въ принести пользу. ней гораздо

Томв II.

Пяп- нужные

⁽а) Знаменишый Докторъ Линдъ Эдимбургскій въ своей инавгуральной диссертація о ликорадкамь отступныхь гиплыхь двластв савдую. щія примъчанія:

Надобно, сколько возможно, чаще перем внять былье у больнаго, одъяло и простыни, и выставлять ихъ на воздухъ; коль и мочу его топилев вонв выпосить. Комната, въ коей онв лежить, должна быть короно провътраваема и оприскиваема уксусомь. Накочецъ надлежить приложить тончайшее внимание но всему тому, что насается больнаго. Я испышаль, что Врачь, уважающій сін правила, и оныя наблюдающій, несравненно лучше успаваеть, нежели кота ученъйшій, но небрегущій объ оныхъ.

Ипекажузнга,

Пятнатцать или дватцать грановъ ипекакуанга въ порошкъ совершенно соотвътствовать будутъ сему показанію.

Рвошно€ пишье.

Однако я совътую предпочитать въ семъ случав рестное питье изводного или двухв грановь сурмянаго тартара (tartari stibiati), и пяти или шести трановъ ипекакуании (ipecacuanba) въ порошкъ, разведенное вЪ рюмкъ воды: сте пишье повторяется два или три раза черезъ день, ежели тошнота и позывы на рвоту продолжаются (1).

Промыванія и лег-

Животь надобно послаблять посредствомь пронія слави- мываній и легких в славительных в, как в- то легкими тельныя настоями Ялександрійского листа и манны, маленькими пртемами электуарія ленитива (electuarii lenitivi), виннаго камия (стетотія tartarі), тамарин довд, вареных Б слив в проч. но весьма надобно остерегаться сильных в праститеских в реотных в.

IIo-

Hie o promныхъ. Причины , -ошом вий рыхъ надобно употреблять ero moasко ев ипекакуанкою. Ипекануанга безопасите. Способъ употреблять рвошное.

когда об-

ещоящель-

cmB2 ero

mp omb.

Разсужде- (1) Мы должны дать знать согласно св Г. Лістодомв, что для пріуготовленія сурмянаго тартара различным в следують способамь, и что выборь зависить от мысли и воли наждаго Аптенаря: изв чего слыдуеть, что приличной пріемь сего лекарства не всегда таковь же бываеть; чию онь перемъняется; и чио онь иногда очень много дъйствуеть, а иногда очень мало, а отв сего и невыгода бываеть болье или меиве велика»

> Ибноторых В Аптекарей реотное преизводить величайшія дойстві от двухь грановь; а другихь и оть четырехь грановь ничего не двиствуеть: сін обстоятельства должны нась побудить нь тому, чтобъ ростное употреблять не иначе, какъ съ величайщею предосторожностью, и когда обстоятельства совершенно его потребують-

> Мы имбемъ въ инекакуанто наптуральное реотное, легкое п безопасное, которое примично вЪ большой части случаевЪ.

> ВпрочемЪ, наилучшій способЪ давать сурмяной тартарь (глязагит Яівіанит), состоинь въ томъ, чтобъ распустить четыре или иять грановь въ фунтъ теплой воды: сего распущения надобно взять ложку, влить его въ рюмку и дать больному; сей пріемъ продолжается чрезъ наждые полчаса, пока больнаго начнетъ рвать : послв сего остатонь выбрасывается.

Посредствомъ сего способа лихорадка сїя въ не-хина, кеиногіе дни можеть приведена быть въ перемежающі ясл гда лихоудоборазличительныя и порядотныя. Когда дъло до сдълалась сего состоянія дошло, то можно предписать хину, порядочкоторая развъ ръдко не довершиваеть совершеннаго межаювыпользованія.

Безполезно здъсь новшорять способъ, по коему должно ее принимать; мы имъли случай о семъ говорить въ предъидущихъ главахъ, а наипаче въ § 4, главъ 3 и 8 сего Тома.

5 5.

Средства предохранять себя отб лихорадки отступной.

Наилучий средства предохранять себя от сей предохралихорадки состоять въ томь, чтобь употреблять нительных яства здоровыя и нитательныя, наблюдать строжайтую систоту, держать тело свое въ умъренной теплоть, делать приличное телодоижение, наконець избъгать въ земляхъ теплыхъ мъстъ мокрыхъ, росы, ностаго воздуха, и другихъ такого же рода вещей.

Впрочемъ, въ шъхъ странахъ, гдъ она посальна, хина въ наипревосходнъйшее предохранительное, какое токмо тъхъ странахъ, можно одобрить, есть хина, которую можно жевать, гдъ сія или пить настоенную въ содкъ, въ винъ и проч. лихорядка повальна.

Нѣкоторые Врачи совѣтуютъ жевать или за гу-табань въ бу класть табакъ; они его одобряютъ какъ вещь по-случать лезнъйшую для предупреждентя въ болотистыхъ округахъ лихорадокъ какъ отступныхъ, такъ и перемежающихся.

TAABA 12.

Обб оспъ и оспопрививании.

S I.

068 ocn 3.

Сія бользнь толь обыкновенна, что мало нахо-Maxo maкихъ людишся людей, которые бы ее не имъли въ то, или дей, кодругое время; она есть заразительный шая бользнь вы торые бы нашихъ странахъ, и съ давняго времени бичь Европы. оной не им тли. ВЪ накое Оспа оказывается вообще около весны, авлаетгодовое ся очень частою льтомь, менье осенью, и почти нивремя она чаще: нто когда зимою. Дети наиболье оной подвержены штв. оной наикои питаются яствами грубыми и неу добоваримыми, болье под-кои не предпринимають приличнаго тело движения, кои обилують грубыми соками, подвергаются величайшимъ опасностямь вь сей бользни.

Она раздъ- Оспу раздъляють на раздъльную и сливную: сей ляется на послъдней видь оспы всегда сопровождается опаснораздъльную и слив. стію.

что дол
(Раздъльного оспого называется та, коея жемчужно разу- жины раздълены и разлучены одни от других в; а
мъть подъ
сими сло.

вами? такъ между собою соединяются, что многія, кажется, составляють одну кору.

Сіе раздъленіе, основанное на природъ, не долчія суть жно заставить насъ почитать сій двъ оспъл за два только етепени различные вида; это только степени той же бользтой же 60- ни. Благоразумные практики, говоритъ Г. Ліетодъ, лъзни. сіе знаютъ; даже часто примъчаются, въ противность всему, что говорятъ, оспъ раздъльныя опаснъйшими, нежели сливныя, какъ по числу жемчужинъ, такъ и по припадкамЪ: впрочемЪ пользованіе какЪ той, такЪ и другой совершенно одинаково; дёло только состоитЪ вЪ томЪ, чтобЪ пріємЪ сразмѣрить сЪ опасностію.)

Еще же раздълили оспу на христаллови дную, т. другое е. водянисто - прозрачную, въ коей гной свътлъ и раздъление оспы. безсвязенъ, и кровлную и проч.

ЧЛЕНЪ І.

Присины оспы.

Зараза есть обыкновенный путь, по коему зараза сообщается оспа; и съ того времени, какъ сія бо- есть обыка новенный путь ввезена въ Европу, еще не нашли совершенно шая присредствъ для воспрепятствованія, чтобъ она не была чина оспыза разительного: а сіе по той причинь, что не употребляли пристойныхъ способовъ для достиженія до сего, такъ что нынь оспа сдълалась нькоторымъ образомъ природного.

Дъти, кои слишкомъ разгорячились отъ бъганья, борьбы и проч; взрослые, кои покидають распутство, весьма расположены къ оспъ, ежели они ее еще не имъли.

членъ и.

Признаки оспы.

Сія бользнь так в извъстна нынь стала, что безпо- признани лезно входить в вы мылкія подробности о ея при- предшествую- знаках в.

Дъти обыкновенно бывають печальны, ко всему колодны и сонливы чрезь два или три дни, кои предшествують важнъйшимь признакамо осны (1). Э з

⁽¹⁾ Однако, говоритъ Г. Тиссотъ, у дътей темперамента медленнаго и флегматическаго я видълъ, что небольщое воднение крови, преж-

Они пьють болье обыкновеннаго, не имъють охоты къ яствамъ твердымъ, жалуются на слабость силъ и весьма потливы, естьли хошя малое сдълають телодименте.

Признани будущей За сими припадками следують легкіл перемены колода и жара. По мере, какь время высыпи приближается, сій припадки получають большую жестокость, и сопровождаются болью вь пояснице, вь голове, реотою (или но крайней мере позывами на рвоту) и проч. Пульсо въ ней скоро, кожа жгуча, больной ворочается. Когда заснеть, то просыпается со вскакиваніемь и съ некоторымь ужасомь: обыкновенный признакь близкой высыпи, такь какь и корси вь очень молодыхь детяхь.

врема, въ Около третьяго или четвертаго дня, считая поторое съ той минуты, какъ нездоровье почувствовалось, жемчужины вообще начинають являться: иногда онъ появляются ранъе; но это не есть знакъ благопрітываться ятной (онъ обыкновенно предвъщаеть, что оспа будеть сливная.)

первыя появленія жемчужин в походять на патжать знаки ны от укушенія блохь, и сперва выступають на лиць, по томь на рукахь, а оттуда на груди и проч-Къ

де нежели появился озновъ, давало нъкоторую живость, итноторую веселость и руманець, коего они до того не имъли-

ВЪ ионцъ послъдняго льта я примътиль то же у одного дитяти пяти льть, и въ февраль мьсяць сего года у одной дъвушки четырнатцати льть, кои были оба прежде пасмурными и печальными. Ихъ оспа предозначилась веселостію и игривостію, кои дали знать и самой матери дъвушки, что въ сей послъдней таится накая нибудь великая бользнь.

Сполько - то истинно, что натура, для извъщенія насъ о приближенія непріятеля, всегда облекается противнымъ намъ знакомъ, и что она принимаетъ даже видъ здравіл, когда онъ намъ несвойственъ КЪ тому, чтобъ признаки были благонріятньй-что явшими, потребно высыпи производиться медленно; а масть признаки
михорадкв уйти, какъ скоро жемчужины полвятся.

благопріятными?

Въ оспъ разсъвной ко добру прыщики появляющся ходъ выръдко прежде четвертаго дни, считая съ того, какъ оспъ къ началось чувствоваться нездоровье, и они начинають добрувыходить постепенно въ слъдующе дни.

Жемчужины, кои сушь разсвеныя, коих дно знани жемцвыта хорошаго краснаго (а), кои наполнены матеріею чужинь нь гнойною густою, былесою сперва, а по томы желтоцвытною, сушь наилучтія.

Напрошивъ того тъ жемчужины, кои цвъта опасные в темнаго и синяго, составляють признако нещастли-нещавой; также когда онъ малы, сплюснуты и имъють въ серединъ черныя плинышки. Тъ, кои содержать въ себъ воду свътлую и безсвязную, весьма худы.

Великое число жемчужинЪ на лицѣ всегда сопро-худой вождается опасностію; и то также худой знакЪ, ко-знакЪ, ко-знакър, ко-знакЪ, ко-знак

(ВЪ оспѣ сливной лихорадки не совсѣмъ покида-лихорядна ють больнаго послѣ высыпи; ее всегда остается нѣ не покида-колько и она удвояется каждой вечерь. Въ оспахо ху-высыпи даго свойства стя лихорадка весьма чувствительна бы-оспы сливваеть чрезъ все время бользни, и удвоентя бываютьной и ху-болье или менье жестоки.)

Ho

0

⁽а) Сей знакъ равно благопріяшень и въ осло привилой: по сей причиит оспопрививатели со тщаніємъ его наблюдають; и накъ сноро онъ монажется, то изъ того выводять благополучнойшее предзнаменованіе, жоторое ниногда не обманываеть ижь надежды.

Эпаснъйшіе Но непріятньйшіе признаки суть петехіи или признаки. пурпуровыя пятна, терныя, терныя, занимающія мывемя опусто между жемчужинами. Онь изывляють гнилое распунартикь щеніе крови, такь какь мы показали вы главь 2, вы частей; по-примьч. 2 и 3 сего Тома.

модить. Пометв, или урина кровавал, раздутте живота, они проис- немотеиспусканте, суть худые признаки. Мога блъдная, модить. чувствительное бтенте въ артертля шеи, возвъщають бредв и приступы корти. Ежели лицо не раздувается, ежели напротивъ опадаетъ оно, прежде нежели созръють жемчужины: то это знакъ пренещастливой.

Но ежели около одиннатратато или двънатратато дня на лицъ опухоль пропадаеть, а руки и ноги между тъмъ начнуть опухать, то больной близокъ къ выздоровленію; но когда дъло не такъ идеть, т. е. не по сему порядку, то по всему должно опасаться нещастія.

Когда языкъ покрытъ чернымъ иломъ, то это неблагополучной знакъ; и то также неблагополучной знакъ, когда больной чувствуетъ ознобъ въ сильнъйшемъ степени болъзни: скрежетанте зубовъ, когда оно причиною имъетъ раздражанте первиой системы, есть худой знакъ; но иногда оно причиняется глистами, или какой нибудь болью въ желудкъ.

(Великой пошь вы началь осны худое предзнаменуеть; понось, такы какы и запоры, опасны; трудность вы мотеиспускании, пометь зеленоватой, крайны зловонной, корти послы высыпи, или во время загніенія; прервавшееся слинотетеніе у взрослыхы, прекращеніе поноса у дытей, суть болье или менье опасныя происшествія, кои могуть имыть непріятныйшія послыдствія.

O

Прежде дальнъйшаго чшенія чишай главы і и 2 сего Тома.)

ЧАЕНЪ III.

Пищеупотребление, кое на добно предписывать боль-

КакЪ скоро покажутся первые знаки оспы, то патубной простой народь тревожится, прибъгаеть къ лъкар поступокъ ствамъ, всегда съ опасностію жизни больнаго. Я ви-людей въ первыхъ дъль дътей, коимъ, уступая неотступнымъ прозьбамъ дняхъ ихъотца и матери устрашенныхъ, пускали кровь, прочища-оспы ли, прикладывали нарывныя, такъ что во время бывающей предъвысытью лихора дки натура не токмо помътана была въ ся дъйствіи, но еще и не способна поддержать или содержать жемчужины послъ того, какъ онъ выступили; почему сіи больные, будучи истощены таковыми сы-поражниваніями, упадали подъ тяжестію больны.

Когда оказываются корги, то люди тогда нахо корчи у дятся въ величайшемъ ужасъ; они стремятся утишить автей не ихъ какимъ нибудъ тайнымъ лъгарствомъ, такъ какъ суть прибы онъ были существенного бользнію: но они только таки несуть признакъ вскоръ имъющей послъдовать высыпи, высиризнакъ даже и не неблагопріятной. Какъ сіи корги проходять вообще прежде, нежели появятся жемчужины, то простой народъ уходъ оныхъ обыкновенно принисываетъ лъкарству, которое по сему и получаеть славу, кота оной и недостойно.

Всю, что нужно делать, говоря вообще, во вре- что намя бывающей предь высыпью лихорадки, называемой добно делихорадкою высыпною, состоить вы томы, чтобы боль- время бынаго держать вы прохладь и поков, давать ему нить вающей слабыхы и мокротожидительных птизано, какы- то преды вымятнаго настоя, ятной воды, процеженной сыворотки сыпью ливесяной воды и проч. Не надобно больнаго держать въ его постели, а должно, сколько возможно, ему находиться въ прямомъ положени. Надлежитъ не опускать и того, чтобъ почасту ему вымывать руки и ноги въ теплой водъ. Яства потребно ему давать легки, и стараться, сколько возможно, чтобъ онъ не былъ обезпокоеваемъ людьми или компаниею.

Скольно бы Сія бользнь иногда бываеть столь легкою, что высыпь делается такь, что и не подозревають, чтобъ благосилондишя было больно, и последстве ответствуеть натолько не чалу; жемчужины выступають, наливаются, загнивають надобно ее и созръвають такимь образомь, что больной не въ прихотямъ постели лежить, не менъе спить, не менъе также оставлять имъетъ аппетита противъ обыкновеннаго. Весьма часто случается видьть дытей (потому что у дытей только однихъ она бываетъ столь легка), которыя проводять на вольномь воздухъ все время ихъ бользни, бъгая и принимая пищу какЪбы вЪ здоровьъ; даже ть самыя, кои ее имьють ньсколько тягчае, выходять обыкновенно на улицу, как в скоро высыль совершенно кончилась, и предаются безъ пощады прихоти их в аппетита. Но не смотря на стю безпечность, многія совершенно выздоравливають.

Hemacmia, omb cero nocabayio-

Но, какЪ то мы ниже сего увидимЪ, это не примъръ, коему бы можно было послъдовать; потому что великое число изъ нихъ испытывають непріятньйтія послъдствія. Г. Тиссоть говорить, что онъ видъль цълыя толны такихъ дътей, которыя имъвъ благополучныя оспы, но только худо пользованныя, впали въ хворости различныхъ видовъ, кои весьма трудно искоренить. Не ръдко случается видъть таковыхъ пренебреженныхъ дътей, оставшихся безъ клазъ, безъ слуха, безъ употребленія ногъ и проч.

НъшЪ ничего пагубнъе для больнаго, какЪ при- опасности нуждать его оставаться на постели во время сего от остаперваго періода бользни, нагружать его крыпитель- больнаго на ными, или потогонительными лекарствами и проч. (2). постеми,

Всв сти надобья разгорячають, воспламеняють нія ему кровь, умножають лихорадку и безвременно выгоня- крышельють высыпь. Оть сего последують безчисленныя не- ныхъ. выгоды. Сти лъкарства не токмо умножають число прынжемтужинд, но еще дълають ихв сливными; и когда тельныхъ прыщи выступили слишкомъ скоро, то онв обыкно и потоговенно осядають, прежде нежели достигнуть до настоящей зрълости.

> СЪ 10 2

(2) Потогонительныя весьма полезны въ бользняхъ, кои произошли или вользни. отъ остановки непримътнаго испаренія, или пота. Они полезны еще въ коихъ въ нъкошорыхъ заразительныхъ бользняхъ, коихъ машерія имвешь пошогонирасположение стремиться къ кожъ, на примъръ въ случат яда, въ тельныя волбанняй венерический, въ ломотакъ и проч. полезны.

Но въ бользняхъ острыхъ, ежели они предписываются и употребляются тогда, когда натура не расположена и произведенію по- А въ прота, больному от оных будеть хуже; потому что как они вст чих они сушь горячительныя, то слишном в излишной жарь крови, или слиш- опасны. комъ быстрое кругообращение сей жидкости, будуть препятетыемъ испаренію.

Изъ встхъ острыхь бользней оспа есть та, въ которой простой народъ наиболье стремится къ потогонительнымъ. Онъ видить, Для чего что высыль происходить въ то время, какъ больной пответь, и что столь безбольному легче становится, когда сдёлалась высыпь: то и заключеть, разборчиво что возбуждая поть, можно поспышить сысыпью и облегчить боль- дають ихв наго; но по приведеннымъ нами причинамъ, горячительныя въ семъ въ оспъ: случав не токмо не возбуждають поть, но даже ни испарины, а напрошивъ того ее останавливають, такъ какъ дано знать въ Томъ I. TA. 2.

Почему сіе поведеніе вседневно представляєть намь печальные Бользни, примъры своихъ слъдствій. Гнойные скопы на внёшнихъ частяхъ, вользни, даже въ легиихъ и другихъ черевахъ, антоновъ огонь, гниль еъ костямь, столь обыкновенныя последствія сей бользчи, оть коихь больной почти всегда умираеть, часто оть сихъ только одникъ причинъ происходящь.

СЪ первых В знаков В оспы старухи л жарки за-В26 луждеч ніе, на давляють малольтныхь дьтей крепительными, шафкоемЪ раномв, терьякомв, виномв, пуншемв, и даже водосновывается раз- кого, и всто это для того, чтобъ, какъ онъ говосуждение рять, удалить высыпь сердца. Сія погрышность, такъ простокакЪ и множество другихЪ, ведетъ свое пачало изъ народія, злоупотребленія сего весьма справедливаго наблюдеешносительно нь нія, что оспа выходить лугше, когда кожа влажна, и сто больной тогда находится в в наилусшем в состотельным в янии, нежели когда она суха. въ оспъ.

Одни слу-Но это не есть побудительною причиною кЪ чан, въ шому, чтобъ возбуждать въ больномъ потъ. Потъ конхъ потъ поже- развъ тогда только бываеть полезень, когда выховенъ въ дишь самь собою, или есшь дейсшвіе пишій легкихь бользнях Б и мокротожи дительныхв. острыхъ.

Дъти иногда такъ бывають прихотливы, что Кормилицамъ не не хошять быть на постели безь своихъ кормилиць. надобно ложипься съ Поблажка на сіе безЪ худа не проходитъ какъ для кормилицы, такъ и для дитяти. Вопервыхъ естедёшьми, кои въ ственной жаръ кормилицы неминуемо умножитъ лиocns. хорадку дишящи; а во вшорыхЪ, ежели и кормилица заразишея лихорадкою, какЪ- що весьма часто случается, то опасность тьмъ болье будетъ для обоихъ (b).

не издобно Класть на одной постели многих в двтей; имвющих в оспу, есть подвергать их в непріятивним в последствіттобъ мно- ямъ: надобно, сколько возможно, и двоихъ не оставлять гія дъши . вЪ имфющія

бъдетвій omb more происходящихъ.

Примбръ (б.) Я видълъ одну нормилицу, ноторая, хотя и имъла сепу, но спавъ съ имвещимъ жудато соожства оспу младенцемъ, такъ эзразилась, что не токмо имбла великое число прыщей по всъмъ частямъ тъла, но еще и гинлую ликорадиу, соединенную съ множествомъ нарывовъ, отъ коихъ она елва ссвободилась. Мы повъствуемъ сей примъръ на тотъ нонецъ, чт бъ другіе остерегались отъ опасноетей сей толь заразишельной бользни.

въ той же комнать; потому что дышаніе, жаръ, осну, лезапахъ и проч. всю стремится ко умноженію лихо-жали вмьрадки, и слъдственно бользни.

Обыкновенно случается видыть у бъдных ваю нещаета, дей двух вили трех ваней, лежащих в на той же от того ностели, столь покрытых в жемчужинами, что их в происхо-кожи находятся склеенными вмъсть. Не можно взирать на сте зрълище без в содрагантя сердца. Возможноль, чтоб вараза не пристала к сим валеньким въдимячкам выстания опроисхоность поведентя сколь нелъпато, столь и безчеловъчнаго (с).

НѣшЪ ничего омерзишельные, какЪ обыкновенте у больу простаго народа низтаго класса, оставлять больна-ныхъ осго вЪ томъ же бѣльѣ чрезЪ все время, вЪ которое но часто
продолжается стя отвратительная бользнь. ОнЪ бо-перемъится, чтобъ больной когда станутъ на него надъвать нать
бѣлье свѣжее, не простудился; но отъ того про-бъльексходятъ непріятнъйштя послъдствтя.

Бълье становится жесткимъ; потому что влаж- для чего: ность, которую оно безпрестанно впиваетъ въ себя, тотчасъ составляетъ толстыя пластины, кои загру- 10 3 бъв-

⁽с) Сіе примъчаніе должно отнести и гофиниталямь, и больницамь, и воспитательнымь домамь и проч. вы ноихы случается, что многіл льти имыть ослу вы одно время. Мны случалось видыть болье сорока льтей, заилюченныхы вы одной той же заль, иои чрезь все теченіе бользии не имыли свободы дышать свыжимь воздухомь. Всякой можеть чувствовать, снолько-то сіе поведеніе опасно. Не токмо для осны, но и для всыхы другихы больней надлежало бы поставить правиломы, чтобы каждой больной лежаль такимы образомы, чтобы ни выдимы, ни слышимы быль оты другаго. (Г. ле Роз сіе намыреніе совершенно выполняеть вы планы своего гофиниталя, такы какы мы упомянули вы томы І, вы гл. 11, § 2.)

ВЪ большей части гофиниталей больной, умирающій и мертвой часто накодится вЪ щой же заль.

бъвши, раздирають нъжную кожу младенцовь. Сверьхь того оно издаеть худой запахь, всегда пагубной какь больному, такь и за нимь ходящимь. Далье, пометь и нечистоты, пристающія кь бълью, впиваемы бывають порами кожи, или входять вь состає крови, и должны отягчить бользнь, такь какь доказано вь Томь I, главь 9, толкующей о систоть.

Снольно не
шистота
вался въ нечистоть, когда онъ внутренно боленъ,
то не по сильный шей ли причины надобно обращить
внимание къ оной въ ость? Бользни кожи часто происходять оть негистоты только: слыдовательно она всегда можеть ихъ усугубить.

выгоды Ежели можно у больнаго повседневно перемынять онъ повее- былье, то прохладится, ободрится онъ особеннымъ образомъ; но это не безъ разбора надобно дылать, а былья у надывать только сухое и умыренно теплое былье, такъ больнаго какъ мы присовытовали въ Томы I, въ главы выше- упомянутой.

Предразоудокъ проещаго народа о го. нія, предразсужденіе простонародія остается въ сей зем. рячительнемь пнтеупотредей, впадающихъ въ сію погрѣшность.

Я видъль бъдных в женщинь, кои ъздили среди того, что зимы съ своими дътьми больными оспою; а других в женщинь видъль, кои просили милостыню, нося на руках свостаено выих в младенцов в, покрытых в жемчужинами; но я нина вольной когда не слыхаль, чтобъ хоть одинь умеръ из сих в возмух младенцов от такого пользован Почти не возмобольных жно представить примъров , которые бы яснъйшим в образом в доказывали, что можно по крайней мъръ без-

опасно выставлять на вольной воздухъ больных в оспою, какъ сіи.

Однако изъ сего не слъдуеть, что надобно ихъ не надобвыносить, или выводить въ публику; нынъ весьма чаносить или сто случается видъть сихъ больныхъ гуляющихъ по выводить гульбищамъ въ окрестностяхъ большихъ городовъ. Сте на публичповеденте, которое только удовлетворяетъ тщеславтю оспопрививателей, пагубно для гражданъ и противно уважентю къ человъчеству и благоустройству; потому что сти больные могутъ распространить заразу.

Яства въ сей бользни должны быть весьма лег-канія долкія и свойства прохладительнаго. Панады или былой жны быть яства въ хльбъ, вареной съ равнымъ количествомъ воды и мо-ость? лока; хорошія печеныя передь огнемъ яблоки, или вареныя въ молокы и подслащенныя небольшимъ количествомъ сахара и проч. приличны.

Питье должно состоять из равных в частей каное долводы и молока, процеженной сыворотки, ятной воды, жно быть овсяной и проч. Когда жемчужины налились, то сыворотка послё пахтанья есть весьма пригодное питье.

ЧЛЕНЪ IV.

Пъкарства, кои на добно предписывать больным в оспою.

Стя бользнь раздъляется на четыре пертода: надобно лихорадка бывающая передь высыпью; самая высыпь; различать загноенте или то время, которое натура употребля-времени въ еть къ приведентю въ зрълость жемчужинъ, и лихо-остърадка вторитиая (3).

TIONS-

⁽в) Анхорака вторичная есть собственно лихорадка загновнія: почему и обнаруживаєтся она, какъ скоро начинаєтся звіновнів и продолжаєтся чрезъ все время сего загновнія. Но сія лихорадка вторичная в бывающая предъ высытью хорошо различительны бывающая передъ въ оспакъ влагопріятных или въ добру, въ коихъ бывающая передъ

Пользование перваго времени, или времени лихорадки, бывающей передб высыпью.

HINO AO-Мы уже выше упомянули, что во время первой ликорадки во осяв довольно больного держащь прохладно, предписывашь дв- покойно, давашь ему пишія мокротожидительныя, умышамь въ вашь ему руки и ноги шеплою водою и проч. семЪ пер-Хотя сей способъ въ разсуждении младенцовъ BOM Bpeмени? есть безопаснъйшій; однако взрослые, когда они тв-Признаки. нои у взро- лосложения сильнаго и полнок ровнаго, имъють иногда елых по-нужду въ кровопускании. Пульев полной, кожа сухая казують и другіе признаки воспаленія, делають сію операцію кровопунужною; но ежели только не булуть сін признаки сканіе. крайними, що безопаснъе обойшися безъ оной. Ежели животь жестокь и полнь, то надобно употреблять мягтительныя промыванія.

Выгода

отв проотв промываній въ

еемъ первоты, кои весьма безнокоз тъ нѣкоторыхъ больныхъ,
вомъ перітакъ какъ сказано въ главъ 5, примъч. 3 сего Тома;
одъ осны рвоты, которую непристойно стараться остановить
гіацинтовою конфекціею, теръякомъ, мелиссовою во дою
и другими напитками спиртными и горятительными,
и коея еще опаснъе истребить причину рвотнымъ,
которое есть пагубное лъкарство въ началъ сей бо-

сысынью ликорадка, обынновенно перестаеть послё сей сысыпи, такь какь мы выше замётили, вы члене II; потому что вы осналь мудаго свойства и невлагопріятных или злыжь ликорадка не перестаеть послё сысыпи, а еще усиливается во время загноснія, ко-торое начинается вы третье время или вы третій періодь бользии.

И шакъ въ семъ случат узнаемъ бе шіе сей вторячной ликорадки изъ напряженности тольно припадковъ и существованія загноснія.

Пящымъ періодомъ сей бользни положимъ мы подсущение жемчужинъ, послъ коего упадають корки или чешуи; что случается между двънащатымъ и шестнатцатымъ днемъ больни, какъ- не видно будеть послъ въ примъч. в сей главы. льзни, исключая только мялое число случаевь, о ко- ихъ одинъ только Врачь можетъ судить.

Что касается до теперь упомянутаго кровопу- польза отъ сканія, то надобно оное производить, какъ скоро по- снанія, казывающіе оное признаки появятся; и ежели посль ногда оно кровопусканія состояніе больнаго останется такимъ дъльно пеже; ежели кромъ того пульсо будеть еще полньй назуется: обстоянимъ, жесточайшимъ; ежели случится сонливость, тельства, или бредъ: то надобно оное повторить въ сутки. Г. въ ноихъ тиссоть приказываль пускать кровь до четырехъ разъ надобно его повторить. Въ первые два дни изъ молодыхъ людей, кои находинамися въ такихъ же случаяхъ.

Ежели у больнаго есть сильная тошнота или что напозывы на рвоту, то надобно ему дать настого съ добно авромашковыми цвътами, или теплой воды для очищегда есть нія желудка.

позывъ на

Какъ въ началъ лихорадки, предшествующей рысму: высыпи прыщей оспы, натура обыкновенно покушается на выпоражнивание низомъ или верхомъ: то, ежели ей вспомоществовать въ томъ будуть, особеннымъ образомъ посодъйствують къ притуплению жестокости сей бользни.

Хотя пользованіе сей первой лихорадки един-какь наственно- состоить только вь прохладительномо содержаніи себя и проч. на тоть конець, чтобь предупредить излишній приливь жемчужинь; однако же когда ногда прыпрыщи начинають появляться, то наша должность тими требуеть содьйствовать нагноенію мокротожидительны начиными питіями, легкими яствами и кріпительными, ко- нають погда натура кажется остающеюся безь дійствія.

Когда пулься глубокій и подъ нальцемъ показы- Обстоявающій какъ бы ползующаго червя; когда потеря нои покасилъ, слабость и великое изнеможеніе дълають крвзывають Толя II. ирваниель пительных нужными: то мы совытуемы тогда уноимя. треблять доброе вино, которое можно давать больному вы равномы количествы воды, подкислией его
лимоннымы, или померанцовымы сокомы, или смородиннымы желеемы и проч; сыворотка сы виномы, такы же
подкисленная, также пригодна вы семы случаь.

Не надобно слишкомъ разгорячамъ больнаго. Аля чего? Однако надобно остерегаться, чтобъ слишкомъ не разгорячить больнаго; ибо тогда не токмо не будеть пособія испаренію, но еще и причинится въ оной остановка, такъ какъ мы замътили во 2 примъч. сен главы.

Пользование втораго времени или времени высыпи.

Случан, въ Иногда зъльность лихорадки сопротивляется выкоихъ прокладитель.

бя должно быть наблюдаемо, сколько возможно, строжаніе себа жав; не токмо комнать больнаго надобно быть пронеобходимо нужно.

дить его или сносить съ постели, и прикрывать
только слегка.

Когда весьма великое ворочанье или безпокойков показывающь болеутодающія. Когда весьма великое ворочанье или безпокойменчужинЪ, то надобно предписать какія нибудь болеутоляющіл легкія; но надобно давать ихъ всегда съ осторожностію.

Для вэро-

Для дишяти по кофейной ложечки маковаго сиропа (бугирі рарахегит), или діакодієва (бугирі diacodii), чрез в каждые пять или шесть часов в довольно, и надобно ее повторить, пока получено будет веласное дъйствіе; а въ разужденіи взрослаго столовал ложка выполнить то же показаніе (4).

BT

СЪ канимъ (4) Азакодзевъ спропъ есть изъ легчайшихъ наркотическихъ: онъ навоблагоразу- дить сонь, умърметь боли и проч; однако употреблять надобно его місмъ дол- только съ осторожностію, а наипаче въ ость. Мы уже описали неща-

Въ случав трудности въ мочеиспускани, называе- что долмой у Врачей странсурието (что весьма часто случается жно дввъ оспв), надобно сводить больнаго съ постели; и ежели кать въ онъ еще въ силахъ, то водить его босаго по его комнатъ, тановки Ежели же силы его сего не позволяютъ, то надобно мочи: ему почаще приподниматься на колъна, и силиться время отъ времени выпущать урину.

Когда сї и средства не удадутся, то надобно ему важность давать, болье или менье часто, глядя по тому, какъ въ обиль- будеть ему нужно, по кофейной ложечки спирта ченін ури- услащенной селитры (Spiritus nitri dulcificati) въ рюмкь ны во времего питья: ньть ничего полезнье, ничего выгоднье, мя осны. какъ обильное выпоражниваніе моги.

Когда во рту вязко, языкъ сухъ и испроръзанъ, полосианье то больному надобно почаще мыться, и полоскать се для очище бъ ротъ и горло водою съ медомо, въ которую горла. смъсь кладется нъсколько уксуса, или смородиниаго желе.

Часто случается, что больной не ходить къ Ежели въ животь застулу чрезъ восемь или девять дней первыхъ осны. поръ, то
Сте приключенте не токмо разгорячаеть и воспламеня- надобно
еть кровь, но еще и пометь, долгое время оставаяся употревъ тълъ, дълается острымь, даже гнилымв, и почительныя
даеть поводъ къ непртятнъйшимъ послъдствтямъ: и промыва
Я 2 такънія.

щастія, от весо происходящія, когда он дается кормилицами, или жны они неосторожными, и представили тому причину въ Томъ I, гл. I, предписыв 7.

Для настоящаго употребленія сего лівнарства, безпокойству быть вів налобно быть истичною причиною, сопротивляющеюся высыти и нагно- оспів. енію прыщей. Но кромів сего случая налобно от того улержаться; Безпорядки потому что оно могло бы произвести завалы вів сосудцахів, воспаленіе от воныхі, можи, и слівдственно сдівлать состояніе бользии еще куждшимів, не-когла дажели прежде: и таків мы за долгів почитаемів никогда его от сама- ют я они то себя не укотреблять, а віз нужныхів случадків призывать лів- не истатив маря.

такЪ нужно, когда животъ запертъ, давать мястительных промываній, такъ какъ предписано выше, чрезъ каждые два или три дни, во все теченіе бользни; они прохлядять и облегчать особеннымь образомь больнаго.

что двкогда петехіи или пурпуровыя пятна, синія, мать, но-или черныя, случатся и появятся между жемчужинагда появятся петрієму, сколько желудоко больнаго можеть снести.
Для дитяти:

Подкисленмая жина, Возьми наилучшей хины, - - дв в драхмы, простой коришневой воды, - - унцію, померанцоваго или лимониаго сиропа, - - дв в унціи.

По Лашынь:

Recipe optimæ chinæ, - - - drachmas duas,

aquæ cinnamomi fimplicis, - - - vnciam,

fyrupi aurantiorum, aut limonum, - - - unc. duas.

Истолки хину, ежели она въ коркв, въ мвльчайшій порошокъ; всыпь въ три унціи обыкновенной воды; прибавь коришневую воду и сиропо; подкисли сію пріемъ для смісь нівсколькими канлями купороснаго спирта (Spiritus младенца: vitrioli): сего состава дается по столовой ложків чрезъ каждой часъ.

можно предписать сте же лъкарство для взрослаго: слаго; но надобно ему принимать уже по три или по четыре ложки чрезъ каждой часъ.

Благонолучныя ства, но употреблять столь часто, сколь желудоко сего лькарсего лькар. больнаго стерпыть можеть; потому что оно всегда ства, но- почти тогда производить благополучный дыйствія: гда оно ос- почему я видаль часто петехіи посредствомь хины новательно показа- и кислыхо пропадшими, и одну лихорадку, представлявно и дано

шую ужасный видь, назръвшую весьма хорошо и налив- по пристойному шуюся доброю машеріею.

ВЪ семЪ случав пишье больнаю должно бышь пишья и крвпительнымо, каково есть доброе подкисленное ви-метва, ком но купороснымо спиртомо, уксусомо, лимоннымо со-быть съ комо, или смородиннымо желеемо и проч. Яства дол-хиною, жны состоять изъ печеныхъ или вареныхъ яблоко, изъ вишней, сливъ и другихъ плодовъ кислаго свойства.

Хина и кислыя нужны не токмо въ оспъ, со- кина раве единенной съ петехіями или признаками гнилости, но нужна мо еще и въ оспъ кристалловидной, въ коей гной или въ оспъ нристаллови или въ оспъ нристаллови или въ оспъ нристаллови или въ оспъ нристаллови или образомъ; понюму что хина, кажется, имъеть особенную силу помогать натуръ въ пріуготовленіи гноя, или, какъ называють, похвальной матеріи оспы: слъдственно она можеть быть полезною въ сей бользни и въ тъхъ, коихъ переломо зависить оть наглоения.

Я часто примьчаль, что употребление подки- выгоды сленной, какь выше сказано, хины вь оспахо, коихь ногда жем- жемчужины осьли, и кои казались впредь быть слив- чужны ными, съ пользок перемьняло цвыть и связь глоя, осьли в прочь и производило благополучный я дъйствия.

Когда жемчужины внезапно осёдають или скры внезапное ваются, или, как в говорять бабы лекарки, когда осла вхо- осёдане дить внутрь, прежде нежели матерія созрёла: тотда жемчу- жинь вверопасность бываеть величайтею. Сте приключенте ча-гаеть вы сто бываеть, что весьма надобно замётить, слёд-великую ствтемь горятительнаго содержантя себя, или лебольнаго карствь, кои выгнали наружу матерію прежде неже- от чего ли сте изипальнаго.

че проис- ли она приличнымъ образомъ приготовлена бы-

To-

Сіе состолміе не надобно см'ьшивать съ вокрытіемъ осны чрезъ разръщеніе. Что служить нь различенію вихь двухь воетодий ?

Сіе состол- (б) Прежде нежели приступимъ нъ предлагаемымъ Г. Вуханомъ лъкар.

шіе не на- ствамъ, мы почитаемъ за долгъ дать знать, что иногда оспа разсбедобно смъ- ная и весьма влаготворная не оканчивается нагновнівмъ: прыщи или

шивать съ жемчужины тогда мало помалу пропадають, и кончатся разръвокрыті- шеніемъ.

Однано въ семъ случав больной не тоимо не находится въ опасности, но еще не испытываеть и мальйшаго припадка ликорадии; напротивь того ему становится лучше часъ отчасу, по мъръ, накъ пропадають прыщи: и такъ туть не чего дълать. Я видълъ трехъ или четырекъ такихъ оспъ; больные скоро выздоравливали: одну только предосторожность за нужное почель я вяять, а имянно, прочистить ихъ въ концъ вдвое побольше предъ тъми, у коихъ прыщи по обыкновеню доходять до шагноенія.

Осна, онанинвающаява разрвиненіемь, не еснь лешучая осна. Внани сей посавдней бользни.

Да не обманываемся: оспа, о которой мы зайсь говоримЪ, не есть та, которой дано имя оспы летучей, или оспянки: онв имбеють весьма различные признали. Понолику же ихъ повседневно смёшивають, часто почитають спо послёднюю (оспянку) оспою раздёльною влаготворною, и поелику сія ошибна потворствуєть къ утвержденю, будто или можно много разъ въ жизни имъть оспу, или оспопрививаніе не предокраняеть оть оспы: то мы предложимь зайсь свойственные знаки оспы нёсколько попространнёе, нежели въ прежнемь изданіи. Сіе описаніе, дълая легчайшимъ сопрышивоноложеніе оспы сь оспинкою, не допустить ищущихъ истинны обмануться збивчивыми наружностьми.

Призмани детучей сопы или оспянии. Анхорадна болье или менье острая, но обыкновенно легкая и продолжающаяся только чрезь сутки, или но прайней мъръ от тритцати шести до сороку часовъ, сопровождаемая нездоровьемъ, тагостью, горьатостью, легкою болью головы, и иногда тошнотою, чаще всего предшествуеть высытя; но часто также ляхорадка едва ощутительна бываеть, а больные только чувствують горьатость и нездоровье.

Высыль выступаеть въ концъ перваго, и иногда во второй, ръдно въ третій день. Какъ сноро она выступила, то всъ припадни проходять, и ликорадни уже не бываеть. Больные снова получають аппетить, и не испытывають никанижь припадновь, случающихся въ настоящей остъ.

жани прыщей. Прыщи, означающие оспянку, обычновенно бывають малочисленны; однако многда довольно обильны и разстаны по всему шталу. Они вст бывають раздъльны, а никогда сливные. Въ первую мимуту они имъють краси ту оспяныхъ прыщей. Но ихъ ходъ несравкенно быстръе: они часто выступають и подсыхають въ течение двухъ Тогда надобно в в скорости приложить что долнарыеныя к в кисти рук в и к в щикалкам в жно предног в в освяз-

- нін или се-

двухъ только или трехъ дней. Иногда однако же бывають между ими крышій такіе, коихъ конецъ нъсколько медленнъе, и кои сохраняють долъе прыщей: оспяныя наружности; но ихъ число въ разсужденіи настолицихъ оспяных прыщей, есть накъ і къ 60.

Сін прыщи но большой части наполнены прозрачною водяностію. Иногда сія водяность бъльсть, и подобится нъсколько гною,
а иногда она нрыпнеть); въ ихъ основаніи весьма рыдко примъчаєтся
воспаленный (краснивый) иружокь, какой бываєть у жемчужинь
настоящей оспы; они никогда не ширьють въ центрь, какъ сія жемчужины; они не имъють, какъ жемчужины оспы раздольной, конической фигуры: но они кругообразны; ихъ діяметрь болье, нежели
вснованіе. Когда они подсыхають, то понрываются тонинькою и сукою ножицею или отонкою, и по спаденіи сей кожицы примътно
бываєть пятнышно весьма различное оть твхь, кои усматриваются
на мъсть прыщей оспы.

Ежели ито станеть изследовать сіл пятаы или следы, недь-Остающієми чрезь две после подсушеніл, то увидить, что они суть синія, ся по спабезь глубины или впадины и безь возвышенія; а остающілся после деніи прынастоящей осты бывають нурпуровыми, или віолетовыми, впавшія щей слевь центрь, и возвышенныя болье иля менье по ираямь. Пятна или ря-ды.
бины настоящей осты по крайней мърь столь же широки, сколь широки были жемчужины; а пятна остянки сораздо не столь широки,
исключая развь ть, кои больные воспалили царапаніемь.

и такъ существенные знаки летучей оспы суть и) что высыпь оназывается иногда на первомъ, чаще во второмъ, и ръдко въ
началъ третьяго дни; чего ниногда не случается въ собственно называемой оспъ, ноторая высыпаеть только въ началъ четвертаго дни,
такъ какъ мы сназали выше, естьли только не имъетъ быть она
сливною; но и тогда она сопровождается тревожущими признаками,
возвъщающими, что она будетъ жудаго свейства; 2) что пращи
нли жемуужимы содержатъ только водяность почти всегда свътлую;
з) что наконець сін прищи пропадають поздо напоздо въ четвертой день, ходъ совстмъ различной, какъ всякъ видить, оть хода
оспы. Впрочемъ оспинка ниногда не бываетъ сливною, ниногда опаскою: чаще всего бысыпь выступаетъ такъ, что больной не чувствуеть и ликородки, которая, котя бы и была, всегда легиз.

Почему, ногда прыщи подсохли, по других выхарство она Пользоване требуеть, кром одного или двухь прочищений. Все доло состоить ніевь томь, чтобь больнаго посадить на діэту во время сысыти, и не допускать до того, чтобь она взошла внутрь; до чего достигнуть можно, поступал, ежели есть нужда вы абхарствахь, щань, какъ мы совытуемь вы пользованій осты. ногъ, и поддерживать силы больнаго криительными (б).

Кровопуканіе въ от в крвопусканія, для выведенія паки наружу скрывсемь случать можеть знать, когда она пригодна, или до какого степени
быть весь больной можеть оную снести.

нымъ. Между тъмъ всегда надобно прикладывать къ надобно рукамъ и ногамъ катаплазмы, какъ имъюще силу провеста при изводить напухоль въ сихъ мъстахъ, и чрезъ сей нъ ногамъ способъ притягивать соки къ конеспостямъ (7).

мы.

TIO.13-

Предостнорожности, ноихъ требуетъ прикладыванте нарывныхъ въ семъ случать.

(6) Нарывныя весьма дально показаны въ семъ обстоятельствь: но ежели сіе принлюченіе сопровождается сонливостію, причиненною отбуснія лихорадки и пученья соновъ, то они будуть пагубны, потому что, такъ какъ мы показали въ главъ в, примъч. 4 сего Тома, дъйствіе нарывныхъ есть то, что они раздражають и производять жаръ, безъ чего они бы не могли довести до нагноенія того мъста, нь ноему приложены. Но они не могуть раздражать, не усугубивъ лихорадки и воспаленія, такихъ припадковь, кои на сей разъ надобно удалить. Сверхъ того нарывныя уменьшають сще ноличество мочи, и иногда причиняють остановну оной, ноея напротивъ надлежало бы умножить теченіе, такъ какъ упомянуль сочинитель; наконець, нарывныя дълають боль острвитею, а надлежало бы оную утишать и проч.

Какіе приэнаки нужны къ дъльному воказанію оныхъ : что надлежить предпочесть, ко-

гда ихъ

ньть ?

Осъданіе

нин сомры-

шіе пры-

И такъ въ случат сокрытія прыщей нарывныя тогда только показующея, когда при ономъ пульсь ощущается частымь и славымь; кожа суха; тяжесть приходить съ безпонойствіемь и гредомь; что обыкновенно показываеть переходь матеріи на легкія.

ВЪ прошивномъ случат надобно прикладывать горчицу съ то стомь, или мякоть съ лукомь, такъ предписано въ главт 9, примъч. 12.

(7) Вообще уходь, остдание или сонрышие прыщей, или даже медленность высыпи, сущь весьма опасные случаи, кои могушь зависты от очень различных причинь, кои отпрыть дано одной только опытности.

И макъ мы совътуемъ въ семъ случат не полагаться на себя для воззванія натуры къ своему дъйствію, но тотчасъ призвать Лъкаря, совътамъ ксего надлежить совершенно предаться. Пользование третьяго времени, т. с. лихорадки вторитной.

Опаснъйшій въ оспь періодь есть оторигная ли-Сей періжорадка; она вообще начинается, когда прыщи или одв есть жемчужины лица темньють или перемьняють цвыть; ныши вы и большая часть изъ тъхъ, кои кохищены осного, по-остъ хищены во время сей лихорадки (8).

Jones II.

ВЪ

(в) Надобно замвшить, что прыми янца должны быть нагносны и да- щей есть же переменять цветь, между темь накь прыша других дастей всегая m вла находится тольно во второмъ времени болвани, т. е. въ саисы- ве вма ии: потому что сказано выше, что первыя появленія прыщей оказы- зажной вающся сперва на лицъ, по томъ на рукахъ, а отъ нихъ на груди и случай, команъ далъе; что съ лица сходить опухоль, когда руки, ноги и торой тре-6yemb com проч. начинающь пухнушь.

ВЪ самомъ двав маковъ есть ходъ натуры въ ослв. Высыль вънъ а начинаещся съ лица, простираяся постепенно по близь лежащимъ етъ Врачамветамь. А какъ сія бользяв употребляеть оть трехь до четырехь дней къ претечению каждаго изъ означенныхъ въ в примъчании сей главы времень: то и должно изъ сего последовать, чтобъ прышя, которые сперва показались, были въ полномъ нагноснів, между тъмъ накъ тъ, нои вышли послъ, не достигли еще до своей вели-

и такъ впоричная ликорадка, которая, какъ мы сказали, Время, въ есть лихорадна нагноснія, не можеть кончиться, прежде нежели опа- ноторос леть опухоль ногь; что последуеть только спустя два или три дни продолпосль опаденія опухоли ев лица. Вв сіе - то раз тояніе времени вию жается рачная ликорадка нанпаче оназываент свою жестоность, ноторая вторичная тъмъ нагубнъе бываеть больному, чъмь жарчае его держали.

Лицо, компорое одно польно изъ масшей штал не покрывается шты паодбялами въ сей бользни, подаеть убълительныйшее въ емь доказательство: губные нагновнів на оном'в составллется такв, что вторичная ликорадка не больному; представляеть ощутительных в знановь своего бышів. Сіл ликорадна чемь бовназывается полько уже погда, ногда прыщи лица начинають пере. Абе держамвнять цвыть, т. с. иста нагносние, совершившись на сей части ли его вы тьла, начинается въ другихъ; и примъры, приводимые Г. Буханомъ излишнемъ выше сего въ члень Пі сего Тома, ясно доказывающь, что ежели бы тепль. прочіл части твла не иначе были покрываемы в восов, как в каковыми онв Доназабывають вь сост янія заравомь, тобы не извъстно было даже и имя тельство. еторичной лихорадки, ублагощей величайщее число больных въ ослав умирающихв, или по пройней мере сіл ликородка была бы шольно весьма легною.

Надобно помогать усиліям Ъ природы вземыхЪ ею выпо-DarKHMBaніякъ.

Въ семъ пергодъ натура силится помощи больному попосомв; и не надобно, подъ какимъ бы то видомъ ни было, сопрошивлящься ея усиліямъ съ сей въ намъре стороны, напротивъ того надлежитъ имъ содъйствовать: и такъ нужно трудиться въ доставлении ему выпоражниванія низомь, и подкрыпленіи силь его яствами и питіями качества прохладительнаго, мокротожи лительнаго и крвпительнаго.

> Слинотетение есть также очень обыкновенное выпоражнивание в оспв, а наипаче у взрослых в, которое также не надобно остановлять как и поноса; надлежить же содержать продолжение онаго тыми же ередствами (9).

> > Еже

Выголы отъ кислоть въ семЪ періодъ оспы. и даже во всемЪ шечении сей бользни ...

(9) Въ семъ- по наиначе періодъ бользни надобно употреблять пислоты у даже и вислоты минеральныя: такова точно была практика Галлера, Ліетода и Тиссота. Кислые спирты , говорить сей последній, имеють силу почить урину и слину сспановлять внилость и укрощать зальность жара, по словамъ Сиденгама. Г. Галлеръ, упоминая о неноей повальной волбяни, свиръпствовавшей въ Бернъ, коея свойства гнилоспи требовали инслоть, говорить: "Въ деватый день повечеру приэ казаль я положить купоросного спирта въ питье для недопущения у гнівнія и ликорадии вторичной: в в десяный день прыщи, кои были: , такого же свойства, т. е. черчые, начали желтьть: по употреблеэ ніи довольно крапкаго пріема вислошьи аппешишь оплив пришель наэ сколько спусти.

Примъръ.

Одна дбвочка шести леть съ два дни мучилась ужасною болью въ поясниць, въ спинь, въ животь и головь; сіл боль сопровождаема: была: сильною лижорадною: Родители: набивали желудовъ дишиши виномь, сахаромь и мясными бульгонами, потому что она не хотьла темь: ихв намерение было то, чтобь не дону стить ослу, коею было больно другое диши въ шомъ же домъ. Но сте пользование не шокмо не: уменьшило припадновъ, но еще усугубило жестоность оныхъ. Призвали меня: двеушну и нашель шакою , накою описаль: Я испышаль добрыя дъйствіл кислоть въ другой осло, то положиль употреблать ижь и въ сей. Я предписаль промыванія, умовенія ногь, а пишье у сдъленное: изБ двухЪ уний віолетоваго сиропа (fyrupi violarum) и одмого скрупука купоросного спирша въ двухъ фунцахъ воды.

Ежели при приближенти вторитной лихора жи пульс восетоявесьма скор в, весьма жесток в и весьма силен в; ежели боль тельства,
нарочита; ежели дышанте трудно, и ежели примъчавъ сем в
тотся другте признаки воспалентя груди: то тотчас в третьем в
надобно отворить больному кровь, количество коей дол період в
жно быть соразмърно съ его возрастом в, силами и
провонузъльносттю припадков в.

Но ежели въ сей вторитной лихорадкъ больной требують подверженъ слабости; ежели прыщи внезапно дъла-капротивъ ются блъдными; ежели конетности охолодъли: то на-чарывныхъ добно приложить нарывных и поддерживать силы тельныхъ больнаго кръпительными. Вино и даже спиртные на-питки даваны были иногда въ семъ случаъ съ удиви-тельнымъ успъхомъ.

Какъ вторитная лихорадка большею частію зави-нужда сить, ежели только не всегда, оть ухода во внутрь прочикать матеріи оспы, то не худо бы было прочикать жем-чужины, какъ скоро онь назрыють. Люди повседневно оспы такъ поступають въ разсужденіи нагноившихся тирьсеб стакъ не видло, для чего бы такимъ же образомъ не поступать въ разсужденіи жемчужинъ оспы. Напротивъ того мы думаемъ, что такое прочиканіе есть всегда средство прогнать лихорадку, и часто совершенно оную не допустить.

0 2

Жем-

Тишина мало помалу возстановилась, и прыщи на другой день появились. Оспа была сливная. Я не преставаль употреблять инслоть; я даваль то уксуса, то нупоросного спирта, увеличивая и уменьшля пріємы, гладя по сбстоятельствамь. Нанонець она принимала ихъ до совершенной эрълости жемчужинь, ноторая, нань обынновенно, последовала въ чет ертый-надесять день. Сіл оспа, к торая сперва онавалась подъ ужаснейшимь виломь, и ноторая такь была сливна, что жемчужины лица составляли одну тольно нору, не требовала другихь лекарствь, и сл ходь быль ходь оспы раздельной.

Koras u накъ на-

Жемгужины надобно прочикать тогда, когда онъ пачинають желтьть. Эта операція всего простье: а прочинать: именно, верьх в жемтужин в сръзывается ножницами, или прокалывается иголкою. Надобно начать съжемчужинъ лица, потому что онв прежде всвав других в созрывають; по томь приступить къ другимь, но мъръ как в онъ доходять до состояния зрълости.

Надобно опять икъ прочикать, по мъръ нанъ онъ наливающ.

Онъ вообще наливающся въ другой разъ, и даже вЪ третій: и такЪ надобно повторить операцію, или, лучше сказать, продолжать прочикать жемчужины, доколь онь казаться будуть содержащими гной.

e.g. Неосновательныя причины, по коимЪ этнъкивающея отъ сей •пераціл.

Ежели толь естественная операція даже доселъ была пренебрежена, то мы думаемъ, что въ томъ надобно обвинять только худо разумбемую нъжность отцовъ и матерей: они думають, что она должна причинить великую боль въ дътяхъ; и отъ такого заблужденія лучше любять видьть ихь умирающими, нежели терпящими. Сте мивите совершенно не основашельно. Я часто прочикаль жежчужины, не бывъ видимъ больнымъ, такъ что онъ не подавалъ и малъйшаго знака боли. Да хошя предположить, что она неиного больненькя, то сія небольшая невыгода едва ли за что нибудь должна считаться вЪ сравнени сЪ выгодами, получаемыми от сей операцій (10).

Выголы omb cen операціи; уменьшение боли. Которая

Прочиканте жемчужинъ не токмо не допускаетъ ухода матеріи осны во внутрь крови; но еще уменьшаетъ

есть всеобщею въ Индосшанъ.

⁽¹⁰⁾ Предлагаемый Г. Буканомъ методъ штмъ основательнъе, что онъ есть всеобщею практикою въ Индостанъ Брамины, сбыкновенно полъзующіе природных в жителей сей земли больных в осною, и вообще прививающие оную весною; сін Брамины, говорю я, имъють спицу изъ особеннаго дерева и единственно посвященнаго иъ проналыванию жемчужинъ осны и нъ выпущению изъ оныхъ гноя. Они упражняющся въ сей пранинит съ велинимъ успъхомъ, имъя особенное проворетво дълать сію операцію въ короткое время, хоти бы у больнаго было велиное множество жемчужинъ.

шаеть растягивание кожи, и чрезь то облегчаеть особеннымь образомь больнаго.

Сверхъ того оно не допускаетъ до того, чтобъ сохранение она (кожа) сдълалась впредь рябою; и сїя выгода не прасмаловажна. Матерїя, пребывая долгое время въ прыщахб, остротою своею създаеть нъжную кожу лица; почему и видимъ мы нъкоторыхъ людей, такъ обезображенныхъ, что они едва имъютъ видъ человъческой (d).

Пользование тетвертаго времени, или подсушения жемпужинд.

Когда жемчужины подсохли, и корка ихъ упала, минуны иго вообще нужно прочистить больнаго (11). Однако прочистить больнаго (11). Однако щань.

Да хотя бы произведена была вышеупомянущая операція, то Примъръ, и тогда не надобно опуснать прочищенія въ поназанную мною пору. Я пользоваль двъ оспъл за разь, коими были больны двъ сестры еще младенцы. Я прочиналь жемчужины у ебъихь, и прочиналь, причиналь три раза, на всемь пространствъ тъла. Я началь прочищать первую, какъ скоро прыщи начали желитьть, и она скоро выздоровъла. Что касается до второй, которая получила бользнь отъ

⁽d) Хотя сія операція никогда не можеть вредить, однако она нужною Она тогда бываеть только тогда, когда у больнаго находится велиное число только нужемчужинь, или когда содержащаяся вы нихы матерія столь остра жна, ненли бдиа, что подаеть случай опасаться непрілтимку послудствій, гда у больежели вогнана будеть назадь, или взойдеть вы составь прови.

⁽¹¹⁾ Когда не можно было употребить той операціи, которую сочи- жемчунитель выше совътуеть, по причинъ сопротивленія, противополагае- жинъ.
маго со стороны или родителей, когда у нихъ дъти больны, или не всегда сихъ самыхъ больныхъ, когда они нъсколько уже вэрослы: то прочи- надобно дощенія могуть тогда нъсколько замънить оную. Въ семъ случат на- жидаться добно ихъ употреблять ранте, нежели нанъ Г. Буханъ предписываеть. Я сего време, еъ успъхомъ прочищалъ, по примъру Г. Тиссота, канъ скоро лихо- ни для радка нагноенія начинала оказываться. Одной унціи манны для дъ прочищетей, двухъ унцій для вэрослыхъ, довольно вообще для доставленія нія.
въ сіе время, т. е. въ девятый день бользни, трехъ, четырехъ, нли плии послабленій нанизъ. Таной же прісмъ продолжается чрезъ слъдующіе два дни.

ежели животь его держань быль на свободь чрезь все течение бользни; ежели сыворотка посль пахтанья и другія мокротожи дительныя питія даваемы ему были обильно съ осьмато дни оспы, то пратищение не столь нужнымъ становится: со всемъ темъ никогда не надобно совершенно оное отметать.

Способъ малольтныхъ дъ. тей.

Дъшей надобно прочищать вареными слисами, въ прочищать коих водь настапвается немного Александринскаго листу и ревеню съ небольшимъ количествомъ сахара: сей жидкости дается имъ по маленькимъ пріемцамъ, пока опорознять.

Дъщей от Б пяши до. шести ATIR b.

Тв, кои повзрослъе, должны принимать просищенія нъсколько покрыне. На пріемъ дышямъ отъ пяши до шесши лъшъ дается восемь или десять грановъ превосходнаго ревеню въ порошкъ повечеру; а на другой день поутру дается четыре или пять граповъ ллаппа также въ порошкъ: а для посодъйствованія и изгнанія из желудка и кишок в сего лекарства, надобно имъ давать бульюну или овсяной воды; сей видь прогищения надлежить повторить три или четыре раза чрезъ пять или шесть дней одинъ отъ другаго.

Abmen ээрослъйи бхин

Для детей еще взрослейших в и взрослых в надобно умножить пріемь сихь прогищеній по сразмървзрослыхъ. ности ихъ возраста и ихъ твлосложения: имъ надобно их в давать подв твми же видами вв тв же времена.

Ko-

первой, то обстоятельства, котя от нее независящія, а зависящія тольно от пользовавших в оную лючей, не нопреплиствовали поступишь по сему же методу. Я ее пр част гав уже тогда, когда жемчужины подсохли, и у ней полвил сь болье припузии нарызовъ или чирьевь, изв коикв одинь став на рукв, ноего надлежало чрезв цвлые три мъсяца льчить. Количество гноя, вышедшого изъ сихъ нарывовь, въ самой вещи заставить грить, такъ какъ сказаль Г. Тиссотъ, что въ сей бользии вся кровь кажещся перемънившеюся въ гнойную матерію.

Когда случатся нарывы послё оспы, такъ какъчто наочень часто бываеть, то надобно доводить до нагное-лобно дънія, сколько можно, скорве, посредствомъ нагноевагда слутельных катаплазмово; и когда они прочкнутся са чатся нами собою, или отъ операціи, то надлежить прочи-рывы?
стить. Хина й сыворотка въ семъ случав весьма выгодны.

Ежели найдеть кашель, трудность вы дышаніи кашель в и другіе признаки тахотки, то надобно перенести другіе больнаго на хорошій воздухы, посадить его на моло-признаки ко ослицы, и наказать ему сразмырное сы его сидами тылодвиженіе, такы какы предписано вы главы 7 сего тома, толкующей о тахоткы.

Оспа часто подаеть случай кь двумь неща-воспаление стинымь приключениямь, т. е. кь воспалению горла, горла, которое не редко отнимаеть свободу глотать, и опухоли вековь, которая иногда соединена бываеть сы воспалениемо си приключения почти всегда находятся вы техь больныхь, коихь пользують горясительными лекарствами. Я ихь всегда находиль вы техь, кы коимь я призывань быль вы день высыпи, или на другой день, и коихь родители лечили по своему манеру, т. е. виномо, сахаромо, мясными бульюнами, сетевисного и коришневого водою и проч. Подкисленных полоскания тотчась утишили воспаление горла; и еже ли кто будеть следовать выше предписанному прохадительному пищеупотреблению, тоть можеть на-

Что касается до глазъ, то они не ръдко такъ опухоль и раздуваются, такъ воспаляются, такъ опухають, что воспаление въки часто скленваются вивств чрезъ все время вы-глазъ. сыпи или нагноентя, которой случай иногда обезображаеть и сти орудтя, и даже причиняеть въ глазахъ сито.

антоново огонь: и такъ когда въ оспо признаки такте будушь шажкими, то надлежить приложить къ каждому гла. зу по катаплазмв изв мякиша былаго кавба и молока, которую надобно перемънять свъжею, и продолжать это дълать дотоль, пока въки такъ разиякнуть, что мотуть раствориться. Надобно тогда же наказать больному очень легкую діэту. Ежели при открытіи въковЪ примъшны будушъ пупырышки на съромъ кружкъ глазъ или былая опухоль, то надобно продолжать катаплазмы, пока сїн міста подгноятся: тогда кладутся просшые компрессы на глаза, промоченные наперед настоемо ромашковых в и бузинных в цвытовь.

Средства Hill,

Есть весьма простое средство предупреждать сім екать сихъ приключенія, мнъ всегда удававшееся, а именно, проприключе- шив воспаления горла держащь св самаго начала сей бользни прохладительную дізту; а противъ опухоли глазв, безпрестанно почти промывать их в полотенцомъ въ смъси молока и воды шеплыхъ, или приложить кЪ онымЪ по небольшому жеребейку весьма свъжей вешчины: средства, кои надобно употреблять съ минушы, какъ скоро примъчена будеть опухоль выковЪ.

Обвоснопрививаній.

Хошя ньшь такихь бользней, которыя бы съ ₩БХЬ осповравыванія того времени, как в онв оказались, сопротивлялись св большею упорностію Врачебной Наукв, какв оспа; по ившь также бользней, вы коихы бы удобные можно было почти совствь отвратить опасность, какъ въ ней, посредствомъ весьма простаго способа, я разумью, оспопрививания.

съ давнаго Сте спасительное открытте извъстие им време- стало только съ пол въка тому назадъ; MO- подобно будучи другимъ полезнымъ изобрътеніямъ, въстию въ оно даже досель весьма не великіе сдълало успъхи. Европъ: Одмако къ чести нашего народа надобно признаться, что оспопрививание гораздо лучшимъ образомъ здъсь принято, нежели у какого нибудь сосъдственнаго народа: но оно еще не распространилось повсюду; и мы опасаемся, чтобъ оно и всегда не осталось въ тъсныхъ предълахъ, доколъ сами отцы и матери не будутъ оное производить надъ своими собственными дътьми.

Какое нибудь открытіе не можеть быть все-для чего обще или повсемственно полезнымь, доколь будеть оспопривиизвъстно и отправляемо малымь только числомь люпринято дей. Ежели бы оспопрививаніе введено было болье какь всеобще! вещь модная, нежели какь Медицинское открытіе, и ежели бы оно отправляемо было и здъсь тьмь же классомь людей, которой отправляеть его вы той земль, изы коей оно сюда принесено, то бы давно уже было всеобщимь.

Практика оспопрививанія не иначе сдълалась даже въ Англіи общею, какъ когда она производима была людьми, кои не были лъкарями (12).

Сїи люди не токмо практику онаго учинили общественнъйщею, но еще и безопаснъйшею; и дъй. Гомд II. V ствуя

⁽¹²⁾ ВЪ самой вещи мы видимЪ изЪ Исторія о сей операціи, что она введена или возобновлена была вЪ тѣхЪ земляхЪ, вЪ коихЪ нынѣ извъстна, людьми, кои менѣе всего были лѣкарями. ВЪ Константинополѣ прививаютъ Греческія женщины весьма благополучно но многимъ тыслящамъ людей; въ Бенгалѣ Брамины или священники сихъ странъ; въ Америкъ, на берегахъ Амазонской рѣки, Миссіонеръ Кармелитскаго ордена; въ Ріонегро другой миссіонеръ; въ Португальской Перуанской колоніи, одинъ Хирургъ; въ Пенсилваніи, прививаєть одинъ дворянинъ своимъ невольникамъ съ величайшимъ устѣхомъ; въ Англіп Сюттонъ, славный болѣе, нежели дватратью тысячми прививаній благополучатьщихъ, едва былъ хирургъ. Смотри тетоіге ф' lettres pour fervir à l' Histoire de l'inoculation, par m. de la condamine.

ствуя съ большею свободою, нежели практики по своему званію, они научили сихъ послъднихъ, что величайшая опасность больнаго не отъ недостатка-раченія и присмотра происходить, но напротивь отъ излишества того и другаго.

успъхъ въ Тошъ очень мало самое дъло знаеть, кто приоспопривиписываеть успъхи ныньшнихъ оспопрививанти выштей
вани не
оть ихъ способности ума въ способъ пртуготовлять больнаго
разума за- и сообщать бользнь. Правда, нъкоторые изъ нихъ, въ
висить намъренти заграбить себъ всю практику сего полезнаго
предохранительнаго средства, показывають видъ, будто
знають необычайные и неизмънные секреты для пртуготовлентя больныхъ къ прививантю оспы; но сти
мечты для того только и строются, чтобъ обмануть легковърное и слъпое невъжество.

Потребно только общее поняте и осторожвольно для ность, чтобъ имъть выбирать человъка и вести успъха: операцію; и благоразумные люди могутъ сами прививать осту къ своимъ дътямъ всякой разъ, когда къ тому благовременность найдутъ, съ тъмъ однакожъ условіемъ, чтобъ человъкъ, къ коему прививають они осту, былъ здоровъ.

ЧЛЕНЪ І.

Изложение различных способово оспопрививания.

Нужно замътить, что предлагаемое мною здъсь Успъхв въ оспоприви- мивніе не есть савдствіе умозранія, но единственваніи не за- но наблюденія. Ибо хотя не многіе Лъкари имъли висипъ сть тако-больше случаевь покушаться вы оспопрививании на всв извъстные способы, какЪ я: однако успъхъ въ сей ro-mo u шакого операціи показался мнъ толь мало зависящимъ отъ епособа. тьх обстоятельствь, кои столько уважають, т. е. от в пріуготовленія и насажденія или прививанія, что я уже за нъсколько тому льть произвожу сію операцію чрезъ отцевь и матерей, чрезъ кормилиць лиць и проч.; и я нашель, что предлагаемый въ слъдующемо примъчании способь удавался столь же хорошо, какЪ другіе, да еще сЪ тою пользою, что не имвав большую часть ихв невыгодв (е).

Оспу можно прививанть многими способами сЪ равнымЪ успъхомЪ.

ВЪ Турціи, откуда взято оспопрививанів, жен-Способъ щины сообщають осну дытямь, дылая на кожы нако прииголкою малинькую раночку, и впуская вЪ оную нь въ турци. сколько матеріи, взятой изъ созрѣвшей жемчужины.

На Варварских в берегах впущающь въ кожу, на Варварнаходящуюся между большимъ и указашельнымъ паль снихъ бецом'в руки, напоенную машерією нишку; а въ другихъ многихъ

стра. мъстахъ

Азіи и Европы.

(е) Одно критическое обстоятельство, такъ какъ часто случается, способъ заставия меня избрать сей способь. Одинъ человъкъ, лишившись отъ прививать оспы всьхъ своихъ дътей, исключая одного, ръшился привить оспу весьсему последнему. Онъ меня уведомиль о своемь намерени, просиль, ма приэт 6Ъ я увтриль мать и бабушку сего дитяти о выгодахь оспопрививанія. Но это было дъло невозможное; онъ не были увърены; ихъ весьма сирахи еще болбе умножились: и макъ онв остались закоренвлыми благопоэь своемь мивніи.

лучной.

Я не могъ принишь ослы безъ ихъ на то согласія; потому что происшедя всегда держу правиломъ никогда осны не правивань безъ желанія въ шій отъ томь участвующихъ людей. И такъ воть что я саблаль:

обетоя-

Я присовъщоваль ощцу дашь одинъ или два пріема реченю щельства. своему сыну, по томъ пойти нъ наному нибудь больному остою в заготворною, прочинуть у него двв или три жемчужины, взять матерія на клочечик в клопчатой бумаги; а накв скоро возвратится домой, то ответи своего сына на сторону, поразилранать слегка иголкою или шпильною руку, тереть то место бумагою, которая напоена Фелого, и ни о чемъ болъе не забощиться. Все было въ шочности исполнено. Оспа появилась въ концъ сбынновеннаго срока; она прошла всъ періоды или об рошья порядсяно, и бользнь была столь благотворна, стэль легка, это малинькой больной не находился принужденным в оставаться ни единаго часа на постели. Мы не имвемъ примвровъ, чтобь привитая осна следовала стель естественному ходу, какъ въ семь дишиши, даже до совершеннаго выздоровления больнаго.

странах в сей же самой Варваріи для оспопрививанія трушЪ только мъсто между большимъ и указащель. нымЪ нальцомЪ, или другую какую часть твла, матеріею оспы. Сей способъ тереть какую нибудь часть кожи матеріею осны извъстенъ во многихъ мъстахъ, въ Азги и Европъ, такъ какъи въ Варварги; сте-то называется купить оспу:

Нынашній способъ прививать оспу въ Англіи состоить въ томь, чтобъсделать две или три насечки на рукъ почти горизонтальныя, и столь поверхностныя, чтобЪ глубже кожи внутрь не входили. Сїн насъчки производящся съ помощію данцета, на коемъ находится взятая сЪ зрълой жемчужины матерія; по томъ сіи раночки закрываются и оставляются без всякой перевязи.

Нъкоторые употребляють ланцеть, покрытой сухою машерією оспы; но сей способъ не сшоль надежень: онь часто остается безь двиствія; да и не надобно его иначе употреблять, какъ развъ когда не можно достать матеріи свъжей. Когда же нужда кЪ тому приведетЪ, то надобно помочить матерію, держа ланцешъ чрезъ нъсколько времени надъ паромъ теплой воды.

СпособЪ осны безъ настчки.

Но для привитія или сообщенія оспы, довольно тольпрививать ко приложа свъжей матеріи яда, составляющаго сію бользнь, на кожу, держать ее туть чрезъ довольное время, не делая никакой насъчки, никакой раны. И такъ, кто желаеть, то пусть возметь малинькой кончикъ нишки, на примъръ длиною въ полдюйма, напоенной сею матеріею; пусть вскоръ положить ее на серелней части руки, т. е. между локтемъ и плечомъ; пусть покроеть кусочкомь, обыкновеннаго содержательного пластыря и оставить такь на восемь или десять дней: сте средство не преминеть сообщить бользнь.

Мы для того только упоминаем о сем спо-для чего собь, что большая часть людей боится ран ; и мо-предлажно думать, что чьм легче будет операція, тьм послъдній удобнье можно надъяться, что она сдълается все-способь: общею.

Нькоторые воображають, что истечение материи, его выгокъ коему подаеть поводь производимая при насычпроизводикахь рана, уменьшаеть количество прыщей, и по мыми поэтому дълается выгоднымь; но не надобно много полагаться на сто догадку: даже нычто туть есть исычень, опасное, а имянно то, что глубоктя раны часто рас-кои мотравляются, и дълаются тягостными.

Мы не видимъ, чтобъ оспопрививание почитаемо прівтныя было Медицинскою практикою въ той земль, откуда оспопрививы вы ее получили. Въ Турціи сію практику отправляване размоть женщины; а въ Восточныхъ Индіяхъ Брамины въ тогда или жрецы той земли, такъ какъ показано выше въ только примъч. 12 сей главы. Въ нашихъ странахъ сія операвсеобщимъ, иїя еще находится въ младенчествъ; однако мы накотда дъемся, что она тотчасъ сдълается обыкновенною, производиесть и полько отцы и матери сами стануть прививеть осну къ своимъ дътямъ, такъ какъ нынъ имъ цеми и дають слабительныя и проч.

ИзЪ всъхъ состояній ни одно такъ не сильно духовсдълать практику оспопрививанія всеобщею, какъ ду нымъ модямь подоковенство. Величайшее сопротивленіе, которое проваєть потивъ нее востаеть, происходить всегда отъ какихъ буждать
нибудь для совъсти камней претыканія: одни токмо простой
народь къ
духовные могуть ихъ разрушить (13); почему мы оспоприви
V 3 имъ ванію.

⁽¹³⁾ Иностранныя дуковныя особы представляють намы многіе тому Примъры примъры. Мы уже упомянули вы примъч. 12 сей главы о двухы тому, тис іонерахы береговы рыхы Амазонской и Ріонегро. Вы голландіи Г. Шесы отвышствоваль вы своемы ващитительномы опасть тверлый— нимъ

имъ рекомендуемъ не токмо трудиться въ опровержения возражений, или совъстепретыканий, кои прельщають слабыя души относительно къ сей операции, но еще внушить почитать оную должностию и дать чувствовать, сколько-то опасно не пользоваться пособлемъ, даннымъ намъ отъ Промысла сохранять жизнь нашихъ исчадий.

Скольно Тѣ, кои опускають промежь рукь пособія, моиужно от-гущія сохранить жизнь ихь дѣтей, конечно столько матерямь же виновны, сколько убивающіе ихь; и я желаль бы, прививать чтобь сія матерія зрѣло обдумана была. Сіе изслъоспу нь дованіе наконець доказа то бы, сколько-то нужно оттямь въ цамь и матерямь не опускать прививать оспы късвомалольт имь дѣтямь въ первыхь лѣтахь ихь жизни.

ЧЛЕНЪ

шимъ и удовлетворительный шимъ образомъ на сіе возраженіе, толикоиратно нотворяемое служителями религіи, что де причинять больнь въ темъ, кто ее не имъсть, или котъть отъ оной освободить того, кто въ порядкъ промысла къ оной назначень, есть покищать права Божества; а въ Англіи славный Ворчестерскій Епископъ голориль и проповъдь о пользъ оспоприянванія.

Сін примъры должны бы возжечь ревность наших в пастырей, патрістовъ и друзей человъчества; они бы должны побудить ихъ къ внушению находящимся подъ ихъ духовною паствою сін истинны: что преданность Промысян не запрещаеть намъ предохранять себя отъ золь, нои мы предвидимъ, когда извъстно изъ опыта, что ихъ можно отвратить; что ежели оспоприянчание, такъ какъ сей же самой опыть свидетельствуеть, есть средство предосвободить себя сть осты, по Промысяв не на другой конецв ниспосылаеть намъ сте средство, канъ чт бы мы имъ пользовалися; чтя сжели бы дъло не такъ было, то вев предохранительныя, вев средства предосторожности были бы в тредъ непозволеннымя; что ежели бы дъло не танъ было, то бы намъ не позволительно уже было избъгать угрожающей намъ опасности, а напротивъ надлежамо бы оставить себя поглотить наводненівмЪ, пламени, опустошать язоб: по примъру Турковъ, ноторые от страха, чтобь не воспротивиться видамъ Промысла, тысыщами и шемами погибающь во время чумы, шоль часто случнощейся въ Констанивнополь, между шемъ накъ они сами же видящь Европейцовъ, живущихъ между ими, отъ оной себя предохраняющими, 31инраясь въ домакъ съ своею фамиліею, или выбажая на острова-

ЧЛЕНЪ П.

Важныя выгоды, ощутительно происходящія отд

Докторъ Г. Кенцій изобразиль въ своей Меторіи о здравіи многоразличныя выгоды, происходящія от в прививанія осны, толь удовлетворительным вобразом в, что не оставиль болье ничего желать (f).

Мы присоединимъ къ сказанному по поводу сего то, что неимъвте осны на себъ въ первыхъ лътахъ

(f), Опасности, сопровождающій оспу приставшую от заразы, гово-Опасности, прить сей сочинитель другь человьчества, суть безчисленны, кои кои сопровет предупреждаеть оспотривностие. Натуральная оспа можеть вождають пристать въ такую минуту, въ которую тьло къ пранятію пристав, оной не расположено; она можеть пристать въ годовое время, или шую отъ слишномъ горячее, или слишномъ холодное; она также можеть при заразы осмать от предупасть нечалнно, на примъръ, когда какая нибуль опасная вещь по не предупасть нечалнно, на примъръ, когда какая нибуль опасная вещь по не предупасть поста поста излишествъ распутства, невоздержно осноправи, оста, любовныхъ плоторой, послъ непомърныхъ бавній, принужваніе.

"И такъ малая ли то будеть невыгода, когда всъ сіи неу, щастныя сбетоятельства могуть предупреждены быть оспопривиу, ваніемь? Посредствомь оспопрививанія множество людей предохранеу, ны оть безобразія, такъ какъ и оть смерти. Оть натуральной
у, осплы ск льно прекрасныхъ лиць искажено! скольно темпераменнось
у, сильныхъ и плотчыхъ подорвано, между тьмъ накъ оспопрививаніе
у, почти ниногда не оставляло послъ себя рябинъ, зніновь, сколь
у, многочисленны бы ни были жемчужины на лиць, сколь ужасны бы
у, ни были признами! Большая часть болей, толико несносныхъ въ
у, натуральной ость, весьма ръдно случается въ прививной.

"Наионець въ то время, когда заразительная осна свиръп"ствуеть, то наимъ ужасамъ должны подвергнуться тъ, кон ее
"еще не имъли или натуральной, или прививной! Часто отъ сей бо"лъзни, когда она бываеть повальною, опустошаются деревни, ие"тощаются торговые города, разоряются цълыя провинціи, и плачев"ный видъ пустыни видимъ бываетъ повсюду. Матросы на кораб"ляхъ, заразившись оною, умираютъ толпами, солдаты не имъя ни
"помощи, ни покоя, никакой выгоды, жалостиващимъ образомъ по"гибають.,

тахъ жизни своей сушь нещаетны по причинъ безпрестаннаго страха, чтобъ когда нибудь она не пришла; что иногда препятствуеть имь отправлять должности полезныя и необходимыя.

Такъ на примъръ слуги и невольни-

Мало находится таких в людей, которые бы охошно нанимали слугЪ, неимъвшихЪ оспы, а наипаче покупали невольниковЪ, кои безвременно могушЪ умерешь от сей бользни.

Лънари, взрослыя женицины.

Лъкарь, ХирургЪ, неимъвшіе оспы, какой подверхирурги, гающся опасности при пользовании сей бользни! сколь жалки женщины, дошедшія до зрелаго возраста, не имъвъ на себъ оспы!

Беременная женщина ръдко ускользаетъ отъ сей Беременная женщина: бользни; и ежели кормящійся ея млекомъ младенецъ ее получить, то какое зрълище можеть быть нещагрудьми, сшиве и жалосшиве! ежели машь будешь продолжашь и самой ел его кормишь, то съ опасностію своей жизни; а еженишомецъ. ли напротивъ отниметъ его отъ грудей, то онъ подвергнетися величантей опасности умереть.

Коликократно случается, что нъжная мать при-Машь, коея младе нуждена бываеть оставить свой домь, покинуть свонецъ 60их в дъшей находящихся в в оспь, даже в в то время, лень осною. въ кое ея попеченія наипаче имъ нужны. Ежели же матерняя любовь препобъдить страхи, то послъдствія от того весьма часто бывают в плачевными.

Я знаю одну нъжную мать, питавшую сосцами Примъръ. младенца, кои, будучи жертвою сей жестокой бользни, оба были положены въ одинъ гробъ.

> Но сти сцены столь ужасны, что не можно ихъ и представить. Отцы и матери, принуждаемыя удалящься от в домов в своими дытьми для избыханія оспы, или нехотящія привить имб оную въ младенчествь, да разсудять о плачевномь своемь состоянии,

их доводить неразумная их нь-40 жносшь.

Как в оспа нынъ слълалась повальною бользнію по-как в оспа чти во всъх странах свъта, то мы должны зани-есть поматься только тъмъ, чтобъ, сколько возможно, слъ- больнь, те лать ее благотеоривитею. Въ самой вещи, сей только над еодинь способь остается у нась для уничтоженія ея; жить и я не убоюся сказашь, хошя бы показался ушверждашь дать ее, нвчто странное, что ежели бы оспопрививание сдъла-снолько возлось всеобщимъ, то бы оно почти стоило конечнаго можно, истребленія осиы. HOIO.

Пошому что въ томъ мало нужды, совстмъ сей выголи бользнь искоренена, или сдълана столь благотвор- ды можно ною, что она не въ состояни болье угрожать жизнь, только отъ или искажать телосложение: одно другаго стоить; оспопривии основащельно можно думать, что оспопрививание до-вания. сшавило бы спо выгоду.

Число умерших в от в оспопрививания людей столь Сношение мало, что едва ли заслуживает в считаемо быть; а в в умерших в натуральной ость умираеть ихь обыкновенно по одному ральной ос. изЪ четырехъ или пяти: отъ оспопрививантя не уми-пы и прираеть и одного изъ тысячи. Далье, нъкоторые прак-вивной. шики могутъ похвалиться, что они прививали оспу болье, нежели десящи шысячамь людей, но не пошеряли даже ни единаго (14).

Jone II.

Ч.ЛЕНЪ

Можно ли силонить ивжнаго отца ив тому, чтовь онь сев ванія. лаль рану единородному своему сыну, сь нарочнымы намбреніемь, чтовь ему сообщить вользнь, которой можеть выть онь никогда и имбть не будеть, и которая можеть причинить смерть? сколь вы мала опасность ни выла от оспопрививанія, котя вы предлагаема выла потеря одного только изъ тысячи, или и менье, но отець должень ли оной подвергать добровольно своего сына?

танъ.

⁽¹⁴⁾ Вотъ то возражение, которое чинится всъми людьми, и которое Возражение мит повт риль почти такими же словами к которой весьма заслужен- противъ ной человтив, вдовейв и отець одной прехлытией дввушки:

YAEHB III.

Какія средства надобно употребить для содвланія оспопрививанія всеобщимъ

Я часто желаль, чтобь сообразовано было способное начертание для введения сей спасительной практики повсюду; но опасаюсь, что я никогда не буду столь щастливымь, чтобь видьть исполнение по оному, которое тольбы было спасительно человъческому роду. Конечно туть встрытится великия затруднения; однако дъло не совсъмь невозможное. Намърение сие велико, поелику оно касается до сохранения не менье какъ четвертой части человъческаго рода: такъ чето не надобно предпринимать для исполнения его и для достижения толико желанной цъли?

KT

ometmb.

"Такъ конечно, ствътствуеть Г. де ла Кондаминъ, ежели "сей отецъ кочетъ его предсхраницъ стъ несравненно больщей опасно"сти; ежели предрасуждение не потемняеть въ семъ отцъ свъта
"разума; ежели любитъ онъ своего сына просвъщенною любовию: та
"не долженъ неръщимымъ быть въ прививани ему осили.

Для удовлетеорительнаго же отвыта на сіе возраженіе Г. де ла Кондаминь начинаеть сперва утверждать, что половина человыченаго р да умираеть прежде оспы, т. е. вы младенчествь, такь кань доказано вы Томы І, примыч. і главы і; что изы другой половини ть, кои оть оной изыты, едва заслуживають -быть помыщены вы ечеть; что изы всыхы тыхь, кои будучи вы оной умирають, умираеть седьмой, иногда патой человый, и что величайщая опасность умереть оть оспонривновия вычислена безчисленными опытами только по одному изы трехь соть седьмидесяти шесть.

Надобно замъщить, что съ 1765 года, въ ноемъ вышла послъдняя записка, служащая продолжениемь нетории объ оспопривнении, епособъ прививать се достигь до такого степени совершенства, что извъсти славнъйшихъ Врачей всъхъ націй, а особливо Съверныхъ, доказывають то, что утверждаеть Г. Буханъ, т. е что изъ цълой тыслям тъхъ, къ ноимъ привита сепа, не умираеть и однего.

Мы читаємъ даже въ precis Historique de la nouvelle merhode d'inoculer, что сіл операція толь безопасна, что ежели бы ито захотъль праписать ей два нещастные случая, проистедшіе въ теченіе дват-

Изъ техъ, коимъ привища сспа, не умираещъ и одного изъ тысячи.

КЪ тому, чтобъ оспопривисание ввести повсюду, надобно надобно сперва истребить предразсужденія, происхо-сперва преддящія от в ложнаго понятія о религіи, и оному со-писать дупрошивляющіяся; но одни шолько духовные могушь чтобь они до сего достигнуть, такъ какъ мы уже дали выше внушами знать. Имъ - то надобно не только представлять про-простому стому народу оспопрививание как в должность, но еще попрививапроизводить его въ дъйство надъ собственными сво-ніе какъ няи дътьми. Примъръ всегда дъйствительные будеть, атло бланежели правило.

По томь надобно сделать то, чтобь всякому по томъ челов вку доставить способь прибъгать къ оспоприви- надобно саванію; въ следствіе чего рекомендуемь мы Медицин- нарямь скому факульшету прививать оспу даром в дъщам в прививать бъдных в людей: лишать сего по причинъ бъдности толь оспу данарочитую часть человьческаго рода есть варварство ромъ къ

Aa2

Еже-быдныхь людей.

дватцати тысячь оспонризизацій, то бы нашлося еще болье десяти тысячь людей противь одного, кои бы ударились объ закладъ въ пользу всякаго человъка, къ коему привита оспа. По томъ Г. де ла Кондаминъ возвращается опять къ отцу, которой сомиввается привишь оспу къ своему сыну. Къ нему - то онъ обращаеть сію рычь:

,, Дъло идеть, говорите вы, о жизни вашего сына, и вы не , котите опважиться на случай. Ежели бы доло сіе завистло от васъ, , то конечно бы это было правильно; но противъ воли вашей на-9 добно отважиться. Напрасно вы защищаете себя: вамъ остается изъ , двухъ одно избрать, или привить осту нъ вашему сыну, или не , привишь. прививъ ее, изъ трекъ сотъ семидесяти пяти, или лучше ска-, зашь, изв десяти тысячь благополучныхв окончаній, остается вамъ ,, онасаться только одного; а не прививь, болье одного будуть ру-, чаться прошивъ семи, что вы сына своего потеряете: сія посявд-, няя опасность въ пятьдесять, въ восемь соть крать болье, нежели э, аругая. Избирайте теперь, что котите, или недоумъвайте еще, еже-99 ЛИ СМ веше.

Но скажущь еще, въ накое шогда ввергнешся ошчаяние сей Къ шому, отевь, ежели при всей такой ласкательной надежав сынв его ум- кто бы нирешь от оспопрививания? — это пустой стракь! отвытетзуеть когда не Т. де на Кондаминъ; помому что привитая осно несравненно не столь имъль осопас-пы, не

Imo zonжно дълашь правишельcm Bo , будить народъ нъ ванію ?

Ежели вст средства сін останутся безуспът. ными, що правительству надобно симъ заниматься. Вст правительства конечно имъють нужную власть къ содъланію сей практики общею, и простерть ее по крайчтобь по- ней мъръ столь же далеко, доколь простирающся их владвиїя. Надежньйшій къ сему способъ быль бы тоть, оспоприви- чтобъ для прививанія осны къ детямъ бъдныхъ содержать на казенномъ кошть нъкоторое число оспопрививателей. Сте должно продолжанься дотоль, доколь оспопрививание слылается новсемыстнымь. Отъ сего вскорь бы последовало то, что привычка, которая сильные всых в законовь, побуждала бы каждого человыка прививать оспу къ своему сыну для избъжантя укоризнъ.

Возраженія прошивъ сего плана. Omermor на оныя.

Иной противь сего предпріятія возразить можеть, что бъдные не захотять от давать своих в дьтей оспопрививателямо; но не трудно отвратить сте запруднение: надобно полько давать по небольшему

на-

пристаеть она и отъ еспопрививанія.

опасна, какъ натуральная, а наипаче по тому, что тоть, кто бы ниногда ее не имъл натурально, не получить ее и оть оспопрививанія.

Да хота бы сей любезной сынЪ противЪ всянаго правдоподобія и умерь, по за что стцу на себя пенять? Будучи природнымъ нестуномъ своего сына, онъ обязанъ одно избрать для свсего сына, и благоразуміе направило его нъ шикому выбору. Въ чемъ же состоить сіе благоразуміе, естьли не въ томъ, чтобъ взвъсить выгоды и невыгоды, и чтобъ ръшительно судить о большемъ степени правдоподобія? Между тъмъ, изнъ слъпое предубъждение или закорентлость улерживала отца от в оспопрививанія, очевидность ему вопила: нов двумь опасностей, нов воихв необходимо надобно одиу избирать, избирай меньшую. Долженствоваль ли, могь ли онь претивиться сему гласу? Участь изменила его чаяню: такв ответчикь ли онь за то? - -Аругой отецъ кричитъ своему сыну: земля трясется, домъ валится; сыдь сонь, сти. Сынь выходить, земля разверзается и поглощаеть его: сей отець виновать ли? Вышеуном нутый отець находится въ такомъ же случат. Ежели его дочь умреть въ родахЪ, що станеть ми винить себя въ ся смерти? Конечно болье, нежели въ случав оспорпрививания. Онъ могъ ее не выдавать замужъ. Ежели онъ пустиль ее на опасность отъ родовъ, то не для сохраненія ем жизни; однано же, выдавь ее замужь, онь большей подвергнуль опасности ел жизнь, нежели жизнь свеего сына, прививъ ему оспу.

награжденію каждой матери, которая принесла свое дитя, и оставалась при немЪ чрезЪ все теченіе больни; сего средства довольно.

Далье, успьхъ, которой всегда сльдуеть за сею операцією, изгонить совсьмь всь возраженія, кои можно предлагать по сему поводу; даже уваженіе сей малой прибыли (награжденія) въ состояніи будеть побудить простой народь къ принятію сего плана. Они воспитывають своихъ дьтей оть десяти до двынатрати льть; и въ ту минуту, въ коюбы сіи дьти могли имъ быть полезными, часто похищаемы бывають сею бользнію къ великому предосужденію отцовь и матерей и ущербу общества.

Англійское нравительство особенно занимаєтся съ нъсколькихъ лътъ сохраненіемъ младенцовъ; оно основываетъ и содержить гофшнитали или сиропитательные домы для найденышей и проч. Но мы не убоимся утверждать, что ежели бы десятая часть денегъ, употребляемыхъ на сій заведенія, обращена была на ободреніе практики оспопрививанія между бъдными, то бы сохранена была жизнь не только большей части младенцовъ, но еще и сія практика была бы нынъ почти всеобщею въ семъ островъ.

Не можно себъ вообразить какую власть надъ бъдными имъетъ примъръ, да еще небольшое количество денегъ. Оставь же напротивъ ихъ имъ самимъ, то они всегда будутъ поступать на старинной салтыкъ, никогда не помышлля о поправленти своихъ поведенти. Впрочемъ то, что мы предлагаемъ, есть одна токмо мысль, представляемая нами тъмъ, кои одутевлены общественнымъ благомъ. Ежели бы подобное сему предпрате было одобрено, то можно бы было А а 3

тогда сообразить чертежь и способь произвесть его вЪ дъло (15).

ежегодно людей спасало оспопрививаніе!

Скольно бы (15) Доназано, что четырнатцатая часть человъческаго рода ежегодно умираеть от оспы. И такъ изъ дватрати тысячь людей, умирающих в ежегодно, на примъръ въ Парижъ, сія ужасная бользна похищаеть пысячу четыреста дватцать восемь; почему въ кругломъ годъ больных в осною въ Парижъ найденся по семи разъ сте же число, или болбе десяни пысячь людей. Ежели бы ежегодно въ семъ городъ прививаема была осна нь десящи шысячамь людей, що бы не умерле изъ никъ можеть быть тритцапи, пологая прекъ на тысячу: не предполагая прошивь всякой вброяшности двухь умирающихь привитыкь изв ста, то бы выв то одного изв трехв или четырехв соть, изъ десяти тысячь, такъ какъ доказано въ 14 примъчании сей главы, умирало только двбети людей осною вмбето тысячи четырекъ сощь дващиати осми. И танъ доказано, что установление оспопрививанія спасало бы ежегодно жизнь тысячи двухв или трехв соть людей вь одномъ только городъ Парижъ, и болъе дватцати жити тысячь въ французскомъ королевствъ, предполагая, такъ какъ думають, что столица вмышаеть дванцатую, или около, долю жителей Франціи.

> Мы со ужасомъ читаемъ, что въ въкахъ пьмы, называемыхъ у насъ варварскими, суевъріе Друидовъ слъпо приносило богамъ своимъ въ жертву людей: но и въ нашемъ въкъ, шолико очищенномъ, полико исполненном в просвъщения, называющемся у насъ философскимъ въномъ, мы не примъчлемъ, что наше невъжество, наши предразсужденія, наша колодиость ко благу человічества буйственно жерпвують смерти ежегодно (во Франціи только) тысячми людей, коих в от в насъ завистло сохранить обществу. Признаемся, что мы ни Философы, ни граждане.

Ежели извъстно, что общественное благо требуетъ заведенія оспопрививанія: що по сему надлежало бы издащь законь, обязывающій опцевъ прививать ослу нъ своимъ аттямъ. Въ Спарть, гат атти почитаемы были детьми общества, сей законь безь сомныя быль бы издань; но наши нравы столь различны оть нравовь ЛанедемонскихЪ, сколько ЛикурговЪ же въкЪ удаленЪ отъ нашего. Ободрение и примъръ, кажешся, могли бы послужить витсто щановаго закона, и можеть быть болье бы подъйствовали, нежели и самой законь.

Со встмъ штмъ можемъ ли мы желать еще сильнтишихъ ободреній, еще достоподражательнайших в примаровь предв тами, каковые намъ подали своею осебою Мать Отечества Премудръйшая наша Монархиня, ЕКАТЕРИНА II, Высочайшій и Августвашій Насаваникъ Россійскаго Императорскаго Престола ПАВ Лъ ПЕТРОБИЧЬ, и весь свыше остидемый Россійскій Императорскій Домо! Съ того гремени, какъ

Симьнъмшіе примъры не довольны кЪ побужденію простонародія къ оспопривива-H410.

КакЪ общественныя заведенія всегда подвержены другія бывають безчисленнымь затрудненіямь, когда дело средства доходить до того, чтобь быль оть оныхь успахь; предлаи как в часто они по причинъ корыстолюбія, или ошибки тъхв, на коихв возложено исполнение оныхв, не соответствують человымолюбивымь намереніямь, съ каковыми они соображены: то иы предложимь нъкоторые другіе способы, которые могуть подать цоводь быднымь пользоващься выгодами оспопрививанія.

He

мы получили достоподражаемый примъръ оспопривнения отъ толине знаменим лхв Главв, показующій решительность, мудрость, твердость, любовь ив Опечеству, далено ли распространилось оспопрививание вв Россіи? Спасеніе Россійскаго Двора, спасеніе, можеть быть, цулаго Ошечества, къ неописанному сожальное произвело впечатльне въ маломь только числь людей, да и то богатыхь, кои поспышили воспользоваться неописанными выгодами сего спасительнаго изобретенія. Простой народь, составляющий три четверти съ половиною нашей навін, остается въ разсужденіи того, что прямо предъ глазами его не нажется прибыльнымъ, веегда въ той же недъйствительности, въ пой же нечувствительности, въ той же непроникательности, въ какой были прапращуры его.

Простой и раб тъмъ только трогается, подражаетъ и, такъ И такъ сназать, перехватываеть, что достаеть ему жатов и наполняеть надобно деньгами мошлу; а почти ни мало темь, что должно касаться его привлети ума и серида. Милостивой Указъ о збавив цвны съ соли, в умень его пъ тошеній подашей, о дарованій льготь на торговлю и на дру їх вещи му прижишейскі, ошверзлешв уста кв благодарности, умв кв прозорливо- манкою сти, а руки къ трудамъ; но милостивой Указъ о хране ін своихъ прибыли. дътей посредством в оснопрививанія, толоди женія, коинской эмерцидін, оть з разы, развъ только чрезъ долгое время направинь умы на предполагаемые виды. Вездв, гдв только предохранительное средетво от натуральной осны употребительно, прибыль всегда была нобудительного причиного ив принятию онаго: вы Чернасіи и Грузіл прививающь осту для шого, чтобь сохранить красоту давидь, а поель продань ихв подороже Турнамв и Персіянамв; въ Греціи корыстолюбіе и хитрость одной женщины береть дань св ужаса и суевьрія. евоих в сограждань; а въ Гвіанъ страхъ, чтобь не погибли безвозврать но вев Индіане, ръшить на опыть оспопривнения одного монака, разумъвшаго оное кудо, или еще почитавшаго оное опаснымъ:

И такъ остающея одни токмо награждечія правительству не безнадежными средствами но введенію повсюду оспопрививанія, а презі то нь сехранению великаго множества подданныхв.

Не можно сомнъваться, что оспопрививатели могуть день оть дня умножаться; почему желательно
бы было, заведши ихь вы каждомы приходь, производить имы извъстное жалованье и отличность, дабы
они прививали оспу ко всъмы дътямы того прихода,
когда они достигнуть до извъстнаго возраста. Сей
проэкты не причинильбы великихы убытковы, а заставильбы пользоваться всъхы людей симы неоцънентымы изобрътентемы. Но два великтя препятствтя сопротивляются распространентю оспопрививантя.

Первое препятствіе сопрэтивляющееся распространенію оспопрививаніяПервымъ препятствіемъ есть естественное и врожденное во всёхъ людяхъ желаніе удалить зло столько, сколько возможно: отсюда то слъдуетъ, что какъ оспопрививаніе кажется предупреждающимъ только будущую бользнь, а само по себъ составляетъ очевидную бользнь, то люди вообще и имъютъ къ оному толь великое отвращеніе. Однако выгоды отъ оспопрививанія довольно разгоняютъ такіе пустые страхи. Кто бы въ добромъ умъ будучи, не потерпъль нынъ небольшую боль, дабы назавтра избъгнуть гораздо большаго зла, неминуемо предвидимато (16).

Вто-

(16) Мы уже выше сказали въ 14 примъч еей главы, что число людей, кои умирають не имъвь оспъл, столь мало, что едва должно поставляемо быть въ счеть: это не догадка, а дъло утвержденное опытами Врачей, кои начали писать съ того времени, какъ сіл бользнь появилась.

Сзидътельства, нои доназывають, что на всёхь людахь бываеть оспа, да и бываеть однажды въ жизниАбубенирь, болье извыстный подь именемь Разива, Арабской Врачь, знавшій и писавній лучше вські жившихь до Сиденгама, даже до Боергава о сей больяни, положительно утверждаеть, что она вываеть на вські людяхь. Авиценна, Абензоарь, Агеррсесь говорьть, что кто вы ни выль, ее не минуеть. По мніню Франастора, всявой человіть ее имбеть одинь разь вы жизни, ежели только преждезременною смертію похищень не будеть. Не безь причины, говорить форееть, Арапы и другіе великіе Врачи утверждали, что у всякаго вываеть оспа.

Вев люди подвержены ей одинь разь вы жизии, утверждаеть Сеннерть; Борелли говорить: правда, и сидаль ивиоторымы людей, Вторымъ препятствиемъ распространению осло-вторее прививания есть страхъ укоризнъ: онъ величайтую препятиваетъ власть надъ сердцами большей части людей. тивупола-Естьли младенецъ скончается, то де, воображаютъ гаемое оссебъ, всъ люди насъ станутъ бранить, чего они поправиванию стериъть не могутъ, какъ-то показано въ 14 при-

на воих в никогда не вывала сін волбянь, а других в, на коих в она выла дважды; но сін исключенія весьма рбдин противь общаго правила, что на всёх в она вываеть, да и вываеть одинь разь въ жизни. Изь многих в тысячь людей, прибавляєть Сибегій, разов тольно малое число оть оной освобождено. Ривьерь и Тулпій говорять, что изъ тысячи едва найти можно одного, которой вы въ теченіе своей жизи и оной не имбль.

Довъ утверждаеть, что она всеобща. Юнкеръ думаль, что инито от оной не исключень. Мездъ посль пятидесятильтеней своей практики писаль, что изъ тысячи людей едва одинь ее изъбгаль. Г. Ганъ повторяеть во миогихъ мъстахь своихъ писаній, что изъ тысячи едва только одинь или двое изъбгають от сей язым. Г. Скардона почитаеть дъломъ доказаннымъ, что она не щвдить и одному изъ тысячи. Г. Розенъ, первый врачь Короля Шведскаго, говорить, что весьма мало находится такикъ людей, которые бы оной изъбгали.

Г. Людвигъ почитаеть еще сомнительнымъ дъломъ, изъяты ли какіе нибудь отъ оной люди: весьма малое число людей, говорить онъ, можеть выть изъято оть сей вользни. Аглинскій Епископъ, выше-упомянутый въ із примъчаніи, говорить въ своей проповъди, что оспа есть такая вользнь, которую можно назвать всеобщею или повсемьстною, которой Провидьніе хочеть подвергнуть человъческой родь; и что число достигающихь до старости, не имъвь се, столь мало, что едва составляеть изъятіе противь общаго закона. . . .

Каной человъкъ, возэря на сіи достопочтенныя свидътельства, ужасная дерзнеть сказать, что онь не бывъ въ осло, не будеть въ ней и нартина ниногда? Дерзнеть сказать, что онь не изъ числа тъхъ нещ істныхъ, чісто ноторые съ двънатцатаго, или тринатцатаго дня бользни теряють представвею свою нровь чрезъ поры ножи, обагряя свою постелю, комнату, ляемая осм заражая воздухъ такимъ зловоніемъ, что ни отеческая любовь, ни пою приманка награжденія не могуть побудить къ тому, чтобъ подать симъ нещастнымъ помощь, наковой требуеть жалостное ихъ состояніе?

Каная женщина можеть льстить себь, что она избътнеть такого же случая, о неемь повъствуеть г. Тиссоть: Я видъль, говорить онь, и сердце мое разрывается при семь жалостномь воспоминани; я ити. сей главы. Вотъ безъ сомнтия великій камень претыканія; и доколт онъ разрушень не будеть, то и оспопрививаніе развт малые учинить только уситхи. Однако ни что такъ удобно не можеть ввести сего щастливаго переворота, какъ обыкновеніе.

Пусть

видълъ прелюбезнъйшую женщину, падшую полъ шажестно сей 60лъзни; я ее видълъ дошедшую до такой крайности, что и мнъ не иначе можно было подступиться, какъ съ напоенною уксусомъ, или гофманскими каплями грецною губою, ноею понрываль я нось и ротъ. Сте плачевное состоянте нъ щасттю не долго танется: танте бъднями погибаютъ обыкновенно чрезъ нъскольно часовъ, танъ что врачебная Наука ни малаго имъ пособтя подать не можеть.

Обынновенныя следещвія осны-

Не вст оспы, снажуть мнт, столь ужасны; я вы томь согласень: но вст онт опасны: потому что изы семи больных сею бользяйо обынновенно умираеть одинь, а иногда и два изы одиннатцати: потому что изы тьхь, нои остаются живыми оты ядовитых в ея стръль, одни на всю жизнь остаются хворыми, другие изуродованными или п трявшими одинь или многие нужные из ихы цвлости члены, трети лишаются выгоды зрвия, или слуха; а вст терлють драгоцыньтый дары природы, красоту, и часто остаются такь сбезображенными, что вотще будеть искать вы ихы фисіономіи знаковь, ихы до того отличавшихь.

Примъры, доназывающіе, что дъйствія оспопрививанія столь легии, что оно едва заслуживаеть имя бользии.

Но закроемъ завъсою сін ужасающія наршины. Докажемъ, что оспопривнавание не бользнешворно, ми опасно, ниже смертоносно; что оно едва заслуживает в имя бользчи, а се бливо съ тъхъ перв, какЪ способ в производить сное въ дъйство усовершенствованъ. Возьмемъ сему тоть примтрь, о к торомь повтетвуеть сочинитель въ примвчаній е сей главы. Туть видно, что человьнь тоть взять по случаю; что отець его, менье всего знавшій Медицину, самь дълаеть операцію, и что онъ сирызается оть сточитых в двукь подстерегателей, коихъ сильныя причины Г. Бухана не могли пренлонить къ привитно оспы. Чтожь случилось? Отець, взявши оспяной матеріи на хлопчатую бумагу, возвращается къ своему сыну; онъ ему слегка расцарапываеть руку, треть по расцарапаннему мъсту напоенною гноемь оспы бумагою, и болье ни очемь не забощится. Двв машери совершенно не знають, что между тъмъ происходить; самое дитя, надъноимъ учинена сія операція, также не знасть, на что она сдвиана Всъ находятся въ совершеннъйшей безопасности. Въ концъ предсказаннаго времени оспа (бнаруживается; но оспа шоль легная, шоль влаготворная, что дитя не находить нужды оставаться въ постели ни на одинъ часъ.

Пусть оспопрививание сдълае пся по модъ, то Единственвсь запрудненія топчась пропадупів. Одна мода во-ное срелдишь людьми съ начала свъта, да безъ сомнънтя бу-ждать всъ деть ими водить до скончантя въка. запрудне-

6 6 2

M HIA.

Другой еще перазительнайший примарь новаствуеть Докторь Поверъ Въ мальденъ, небольшомъ морскомъ поршъ въ графошат Ессекскомъ, Г. Сюштонъ, славнъйшій Оспопрививатель Аглинскій, привизаеть ослу въ одинъ день къ четыреста семидесяти людямъ, которые собранись въ сін спороны для жниківа. Въ семъ превеликомъ числь находились младенци даже менье, нежели двумвенчаые, старики выше семидесящи льшь, кормилицы съ своими пишомулми, матери съ своими дъпъми: нъскольно изъ оснопривитымъ составляли цълыя семейсива. Тв, кои пришчи для жнишва, не опускали безъ рабопо ни одного дня; и вст, не исключая даже одного, совершенно выэдоровьян. Такъ жестона ли сія бользнь?

Тимони, Пиларани, Дукасъ, Врачи Треческіе, хотя современные между собно, но различаме по везрастамъ и мивніямъ, сверхъ того непризодившие другь друга въ своикъ сочинениять, всъ согласно утверж 41 ють, что посль многихь льть, у тотребленных в ими на изысканія и опышы, коих опи были очевидными свидетелями, они никакъ не прим шлли, чтобъ сіл операців имъла грелимя последствія. съ 1751 но 1754 годъ въ Лондонскомъ гофинитальникто изъ тъхъ, къ коимъ призиша была осна, не умерь. Славный Троншенъ явно изЪненался, что ежел вбы онъ потернав кот в одного, къ коему прививаль ослу, по бы во всю жизнь свою не сталь ее прививать. Такъ опасна ли шакая бользть? смершельна ли?

Но надобно еще отвътствовать на возражение, которое сперва Оспопривипротивоположими безовътные люди, и нот ре по торьють всь люди: вание освооспопривывание освовождаеть ли оть натуральной оспы? вы самой ли бождаеть вещи оно есть предокранительное средство от сей бользни!

Исшорія, основиная не на выдумнахъ, а на самомъ дъяв, го-осны. ворять Г. де ла Коздами в, е ть наилучий отвъть на сіе возраженіе. Сь шого времета, какъ люди отпрыла глаза на посльлетвіл оспопривизанія, какъ воз двяг разобраны были ев об вихв сторонв пререканельно, никогда еще не доказано, чтобь къ человъку, къ ноему привиша была осла, приспила она въ другой разъ. Это такая исминна, коморую засвяд этельствовали Тамони, Пиларини, Перротв, Вальямов, Шлентрв, Журель, Кирипатринв, и исторую враги сего способа даже старали в испроверсить всякими способами, даже обманомь, шакь какь говоришь Киринашринь.

И такъ пусть просвъщенные люди покажутъ примъръ другимъ: сей примъръ восторжествуеть наконецъ, какихъбы затруднентй ни встрътилъ онъ вначалъ.

Ho

Докторъ Неетлетонъ принужденъ былъ публично оправлать еебя въ ложно рассъянномъ о немъ слукъ, будто одинъ изъ оспопривитымь имъ опять впахъ въ оспу и булто крайнъ оною страждеть. Еще носилась и другая молва; съ письмомъ отъ какого - то Іонеса, которой утверждаль то же о своемь сынь. Г. Журень тщательно навъдывался о семъ дълъ; отецъ отозвался, что онъ не видаль знановъ осны у своего сына; по томъ объщался сназать истинну, естьми только хорошенько ему за то заплатять; наконець сей человъкъ самъ писалъ къ Г. Журеню, и признался, что не въдаеть, что такое оспопривнеание. Донторъ Кирипатринъ приводитъ это письмо въ своемЪ сочинении на стр. 123. Онъ еще говоритъ на стр. 120 : были дъланы опыты такіе, что дітей, ив коимь привита была оспа, клали вмёсть съ дъщьми имъвшими натуральную оспу; однако нъ первымъ не приставала она въ другой разъ. Елисавета Гаррисъ, которая была изъ числа осужденныхъ на оспопрививание при первыхъ опытахъ, оказала по выздоровлени свои услуги болье, нежели дващими больнымъ оспою, но зараза ни мало къ ней не пристала.

Оспопрививаніе не явиствуеть на тяхь, на ноихь быиг оспа-

ВЪ томЪ случат дъланы опыты, возможно ли было, чтобъ нъ тому человъку, на коемъ была оспа, опять она пристала отъ оспо-прививанія; но того нинакъ не случилось, котя въ ранки впущело было большее количе тво оспянато плу противъ обыкновеннаго. Одинъ изъ сыновъ Гарлевика, тогда бывшаго велинимъ Англинскимъ Канцлеромъ, прививъ къ себъ оспу, имълъ въ признаки оспы; рана зардъла в, подгноеніе уставилось, но безъ тальйшей высыпи. Больной, не удовольствовавшись ему пред тавляемыми увъреніями, что не для чего ему болье бояться отъ сей больни, снова себя подвергнуль опыту оспопрививанія; но которой никакого не произвель дъй твія. Въ монтиелье одинъ молодой школьний далъ себя привить Г. ле Роа, тогда Мелицины Профессору въ семъ городъ; у него также всъ были признаки оспы, безъ всянсй высыпи; онъ далъ себя въ другой разъ привить, но никакого припадка тогда не оказалось.

Ежели начиная болбе, нежели съ пятидесяти лътъ, какъ оспопривновние взошло въ употребление въ Англіи, не можно предетавить ни одного оспопривитаго, къ коему бы снова пристала сія бользнь натурально, или инкуственно; ежели и во франціи всъ честные и добросовъзтные Врачи утверждають ту же истинну: то по

Но я предвижу возражение, взятое изъ того возражение, убытка, которой выдеть от оснопрививания. На оное взятое изъ легко можно отвътствовать. Мы не то предлагаемь, от от осночтобъ каждой приходъ оснопрививателемо имълъ Сют прививания: тона, или Дизмздаля, извъстныхъ уже вънчаннымъ Гла-отвътъ вамъ по своимъ успъхамъ, вознестимъ ихъ превыте простонародия. Но развъ другие оснопрививатели не могуть надъяться тольже благополучныхъ успъховъ? Пусть уловляють они такие же случаи, пусть не опускають ихъ безъ дъйствия: то всъ трудности исчезнуть. Можетъ быть въ Англи нътъ прихода, нътъ даже деревни, въ коихъ бы не было знающаго пускать кровь человъка; но кровопускание несравненно труднъе дълать: оно требуетъ болъе и искусства и знания, нежели оснопрививание.

Мы рекомендуем ванначе духовенству практику оспопрививанія. Большая часть составля одих вего особь разумьють ньсколько Врачебную Науку; почти всь знають предписывать слабительныя: а сих вто двух пунктовь и требуеть практика оспопрививанія. У непросвыщенный ших в Индый дов в прививають оспу жреды: то для чего бы Наставникам в Христіянской религіи почитать стю операцію недостойною себя, или Б б 3

какому нещастному року предубъжденные или элонамбренные люди кошать увърить въ противномъ, да и накъ до того достигнуть могуть?

Одна изъ причинъ, побуждающихъ наиболье силонашься на сін Причины, ложные слухи, есть та, что не собственно ставлть въ число оспо- по ноимъ привитыхъ того, на коемъ оспопрививаніе ничего не подъйствовало думають, худо или хорощо сдъланная операція, когда не производить ни пры- что къ щей, ни подгноенія, оставляєть человька въ тікомъ же состояніи, тьть, къ въ коемъ онь быль до того: и такъ ежели къ нему пристанеть въ коимъ припоследствій времени натуральная оспа, то не можно сказать, что вита была она вторично къ нему пристала ; потому что она еще въ первой разь оспа, мона немь. Таковы суть примеры, пред тавляемые мнимыми оспоприви жеть она тыми, кои посль сей операціи имъли оспу; а всь другія пристепнія не опять примогли устоять противь повърки.

превосходящею силы их в? Не шокмо души, но и твла всеконечно заслуживають некоторую часть попеченій Пастырскихь; по крайный мырь самой истотникв всякія мудрости, велигайшій Уситель, какой только быль между людьми, кажется сегоже мныйя.

Ежели ни Ежели ни одно изъ сихъ средствъ не можетъ одно изЪ произведено бышь въ дъйство, то самимъ отцамъ и предломатерямъ предоставляется прививать осну къ своимъ женныхЪ дъшямъ; пусть они сами избираютъ способъ оспоприсредсшвъ не удастививанія, только чтобЪ прививаемый былЪ здоровЪ и ся, то отцамъ и въ приличномъ возрастъ: то операція никогда не премашерямъ минешъ удаться по ихъ желанію. Я знаю множество надобно са- отцовъ и матерей, которыя сами прививали осну къ вивать ос. своимъ дъшямъ столь благополучно, что я никогда не пу нъ сво- слыхиваль худыхь оть того последствий. имъ дъ-

примъръ скихъ острововъ собственными своими руками привилъ удеблост, оспу болъе, нежели тремъ стамъ своихъ невольниковъ преизвовъ одинъ годъ, съ великимъ успъхомъ, не смотря на вной климата и другія неблагопріятныя обстоятельства. Я видалъ простыхъ художниковъ, кои производили сію операцію столь же благополучно, сколь и самые Лъкари.

Однако мы весьма удалены от того, чтоб воспренятствовать имъющим способы людям унотреблять искусных в людей для прививан сепь, и им послъдовать в сей бользни (ежели только можно ее так назвать). Мы то полько доказываем в, что когда не можно имъть оспопрививателей, то по сей причинъ не надлежит в оспопрививателей.

Способъ, Но не занимаяся здъсь доводами, оправдывающиисторой ми пользу отъ оспопрививания, я проту только позвоменъ быль ленія разсказать способъ, каковой я употребиль при оспооспопрививании собственнато моего сына, которой то-сочинитегла быль у меня только однав. Давь ему сперва два лемь нады
легких слабительных приказаль я кормилиць нанымь сыноить конець нитки свъжею матеріею жемчужины ос-номь.
пы, положить эту нитку на руку больнаго, и держать ее туть покрыче посредствомы придерживающего плаетыря. Сей пластырь туть оставался оты
тести до семи дней, пока оны по случаю самы свалилея.

Между ивмЪ оспа вышла около обыкновеннаго времени и была изъ числа благотворнъйшихъ. Сей весьма безопасный и удающійся во всъхъ почти случаяхъ способъ можетъ употребляемъ быть безъ мальишаго свъденія Медицаны (17).

Мы

Сей человькь, въ коемь особенная проницательность не затмила дара наблюденія, примътиль, что привываніе осты къ рукамъ (оть локтя до плеча) умножало высыть на головь, и слъдовательно оть того прои ходящіл худыя послъдствія. По Анатомиче кимъ своимъ свъденіямъ нашель онь причичу сего явлечія въ близости и симпатія сосудцовь сихъ частей съ сосудцами головы; почему для насажденія осты предпочель онь ноги (ладвен и икры): такимь-то образомь прививаль онь осту къ Герцору де Шартрь и проч. въ 1756 году; и ежели послъ того иногла оть сего способа удалялся, то по причинь нъноторыхь людей, въ

⁽¹⁷⁾ Г. Троншень уже чувствоваль, сколько - то способь прививать Сколько ослу посредствомь надсвианія препятетвуєть скорому распрострі сей способь нецю остопрививанія; онь примышаль, что страхь оть острыхь ору- сходень сь дій и причиндемая ими боль производили вы душахь дытищь и нь способомь которыхь вэрослыхь такой ужась, которой возобновлался при всякой г. Троншео о томь мысли; онь видьль, что первыхь схватывали корчи, всегда нл. опа ныя, вы таком случаь, вы коемь весьма нужно содержать душе эное устройство вы совершенной ташинь: и такь онь изы того выводить, что нещастлявые случаи, каковые подасть младенчество, такь сказать, оспоприонванія, не оть другихь происходить причичь, какь оть сихь. По сему вообразиль онь себь способь прививать ослу безь всякаго надськанія, безь всякаго колонія, безь всякаго царапанія. Слабые нарменые пластыри, покрывающіе напосниую оспяною мат рісю нить, показались ему весьма спосившествующами его намбренію. Онь такь и поступаль, и имъль вы томь успяхь.

AAA B03чувствованія всткъ выгодъ ему бышь Bceo6щимЪ.

Мы щъмъ паче распространились о семъ предметь, что настоящія выгоды отв оспопрививанія не иначе могушЪ исполнишься, какЪ по слъланіи сей пракоть осно- тики всеобщею. Доколь оно предоставлено будеть прививанія малому только числу людей, то вредно будеть общественности. Посредствомъ его зараза распространяется и сообщается многимЪ, которые бы можетъ быть безъ шого не имъли сей бользни: въ слъдствие чего найдено, что нынь въ Англіи болье умираеть людей оть оспы, нежели прежде введенія оспопрививанія; и сіе важное изобръшеніе, по которому можно спасти болъе людей, нежели всъми трудами Врачей, нъкоторымЪ образомЪ теряетЪ всъ свои выгоды отъ того, что не во всемъ обществъ принято (18).

ЧЛЕНЪ

разсуждении коихъ боялся онъ, чисбъ прикладывание нарывныхъ не /испортило ногь; а сверхъ того п *тълоденжение* составляетъ важный пункть севя содержанія и нужный для оспопричитых.

можно примътить, что способъ Г. Бухана не еснъ какое нибудь нововведение; что придерживательной пластырь, употребляемый имъ для принрапленія напоснной матерією оспыв нишки, принладывается вмасто легнихъ нарывныхъ г. Троншеня, кои однако мы предпочтительно совътуемъ; поелику нарыеныя раздражають ть части, нъ коимъ приложены, отлирая верхнюю кожицу, и производя умножение движения въ сокажъ, посебляють входу оспанаго яда, и описывають, такъ сназашь, его дъйствія.

(18) Сего мивнія придерживаются всв заравомыелящіе сбв оспопрививаніи. ВЪ одномЪ знатномЪ собранія, вЪ коемЪ предлагаемы были изЪ исторія безчисленныя выгоды, происходящія от сей операціи, многіє члены, имъвшіе противное мибніе, для подтвержденія онаго приводили мъста изъ одного письма славнаго Кавалера Пренгля о смертоносности отъ оспы сдълавшейся нарочитьйшею въ Англіи нынь, нежели до введенія оспопрививанія. Одинъ Врачь, слушавшій ихъ съ молчаніемъ, нанонецъ всталь и сказаль только сін слова: надобно прививать оспу но всьмь штыб, на коихъ ее не было, или ни къ кому.

И накъ весьма желашельно, чнобъ въ наждомъ городъ построень быль для сей операціи нарочной гофиниталь; или употребинемы были какія нибудь средства предлагаемый сочинителемъ въ сей главь; или наконець, чтобь каждой человькь самь прививаль оспу къ своимъ дъшямъ.

ЧЛЕНЪ IV.

О приуготовлениях в оспопрививанию.

Весна и осень вообще почитаются благопріят-годовых ньйшими годовыми временами кЪ оспопрививанію; по-времена, въ нои на- тому что время тогда умфреннье, нежели льтомъ, добно причили зимою: однако кажется, что надлежало бы почи-вивать остать сіи два годовыя времена наименье здравыми изъ пуветь всьхъ годовыхъ временъ.

Наилучшее пріуготовленіе или предрасположеніе къ оспопрививанію есть безъ сомньнія то, чтобъ больные напередъ находились въ совершенномъ состояніи здравія. А какъ я всегда примьчаль, что дьти особливо бывають бользненными къ концу весны и осени, нежели въ другое какое годовое время: то слъдовательно желальбы я предложить начало зимы удобньйшею порою къ оспопрививанію, котя весна по всему кажется предпочтительнье зимы.

Наиспособнъйшій возрасть къ оспопрививанію есть какой возмежду тремя и пятьми годами. Тысяча неблагопо болье сполучных обстоятельствь, кои можем мы привести, собень къ сопровождають оспопрививаніе къ дътям прежде сего прививане возраста; но не надобно также его отлагать далье нію за няти льть. По мъръ, как волоти получають болье силь, болье жесткости, и как дъти начинають питаться грубъйшими яствами: то оспа становится опаснье.

Слабое и бользненное твлосложение дьшей не Слабое и должно быть препятствиемь къ оспопрививанию. Часто бользнено оспопрививание перемъняеть таковое твлосложение и оное улучшаеть; но въ таковомь случав надобно для не должно оспопрививания избрать такую пору, въ которую мла быть преденець въ наилучшемъ состоянии находится. Надемънь толю из

лежить всегла перель сею операцією выльчивать слугай-•спопрививанию. ныя бользни.

Какая должна бышь дътская діэша прививані-EMB?

Вообще, надобно прежде учиненія оспопрививанія распорядить діэтою; однако как дытскія яства обыкновенно бывають здравыми безь приправь, состоять предвосно- только изв молока, нанада, легких в бульюнцевв, бълаго хльба, усладительных в корней, бълаго мяса, как вто нами предписано вЪ Томѣ I, главѣ 1, § 3: то кажется не великая произойдеть польза оть перемъны детской діэны.

> Но дъти, привыкиї я кЪ горячительному пищеупотребленію, имфющія темпераменть сильной, изобилующія испорченными соками, должны передь оспопрививанием в посажены быть на легкую діэту; яства их в должны бышь качества прохладительнаго, а пишье состоять изъ сыворошки послъ пахшанья, и проч.

ПередЪ оспопрививаніемЪ надлежишь про-

Для пріуготовленія кЪ прививанію оспы мы одобряемЪ два или три слабыхЪ прочищеній, кои надлежить сразмърить съ возрастомъ и силами больнаго.

Ічища шь два или шри раза. Ошь чега зависипъ успъхъ Bamean?

Успъх в оспопрививателя зависить не столько от в пріуготовленія больнаго, сколько от того способа, по коему он в поступает во время оспопрививанія. Все дело состоить только въ томь, чтобъ больнаго содержать прохладно, да еще послаблять ему животъ еспоприви- на тоть конець, дабы лихорадку содержать въ умъренномъ степени, и дабы высыпь была не столь обильна.

Тогда итть опаго бываеть

прыщей или для чего опасапься когда ености, но-жемчужинъ бываетъ мало: число ихъ гда немно-бывает в сразмърно св лихорадкого бывающею прежде и послѣ высыпи.

прыщей. ВЪ чемЪ состоить главчый сепрешъ оспоприви-

жанія?

Главной секреть оспопрививанія состоить въ расположении высыпной лихорадки, кою можно вообще держать въ надлежащемъ степени посредстомъ правилЪ,

вилЪ, данныхЪ выше сего вЪ § 1, членъ IV сей главы.

члень V.

Пользование, которое на добно употреблять во время оспопрививания.

Во время искуственной осны надобно поступать оно должет такимы же образомы, какы во время осны натуральной. Но быть Больнаго должно держать прохладно, на діэть легнаю вы кой и питіи мокротожи дительномо. Ежели появятся натуральськай нибудь неблагополучные признаки, что однако ной осныже рыдко случается, то надобно пользовать такимы же образомы, какы вы натуральной осны; никогда не надобно забывать того правила, которое положено вы

Чистительныя не менье нужны как в посль нату- важнесть ральной осны, так в и посль привитой; их в не надоб- вы частительных во упускать ни вы какомы случав (19).

посль основний прививаніде

ГЛАВА 13.

О кори.

Корь, показавшаяся въ Европъ почти въ то же сходетво время, въ кое и оспа, имъетъ великое сходство съ сею нори съ послъднею бользнію. Онъ объ вывезены съ Востока, осною объ заразительны, и однажды только въ жизни пристають къ человъку.

Жорь чаще всего пристаеть весною, а пропадаеть въ котольтомь; она ръдко бываеть смертоносною по себь, и ромь годо. В в 2

⁽¹⁹⁾ Естьли мы много помъстили примъчаній въ семъ в, то читите ей просимъ въ томъ простить, въ чемъ и ласкаемся надеждою, зная важность сего предмет наипаче для такого сочиненія, которое опредълено на пользу встять городовъ, селъ всего человъчества.

болье кор когда порядочно пользуется; но иногда оставляеть приста послъ себя нещастное послъдствие.

§ 1.

Притины кори.

Зараза. Кора, шакъ какъ и оспа; она бываешъ болъе или менъе опасною, ошносищельно къ телосложению больнаго, къ головому времени и къ климашу.

корь раздъляющь на благошворную и злошвордъльется ную. Сколь удобно увеличивается первая, столько потворную и слёдняя опасна, не только по напряженности предзлотвор- ставляемых вею признаков в, но еще по пещастным в ную. слёдствіям в, кои она нослё себя оставляеть.)

\$ 2.

Признаки кори.

Признани предшеетвующіе.

Корг, такъ какъ и другіе лихорадки, даеть о себъ знать поперемънными приступами озноба и жара, соединенными съ нездоровьемъ и потерею аппетита; языкъ бываеть бълъ, но обыкновенно влаженъ. Больной имъетъ короткой кашель, ежели можно такъ назвать; онъ чувствуетъ тяжесть въ головъ, глаза у него красные, мутны и слезоточливы. Онъ предается сну; изъ ноздрей его течетъ водяная матерія; однако кашель иногда обнаруживается послъ высыци въ глазахъ; у него есть жаръ и восналеніе.

За сими припадками следуеть изтечение весьма вдкихь слезь, и столь крайняя чувствительность вы глазахь, что больные не могуть и взглянуть на светь безь боли. Весьма часто веки у нихь так распухають, что они не могуть совершенно и глазь разкрыть. У нихь обыкновенно бывають боли вы груди, а переды высыныю часто случается рвота и поносы.

y

У дътей пометь бываеть обыкновенно зеленовать; особенные они жалуются на зуль кожи; они безпокоятся, печалятся: въ дътахъ обыкновенно случается видъть, что у нихъ идетъ признаки. кровь изъ носа прежде и послъ высыпи.

Около четвертаго дня бользни маленькія пят- время бонышки, подзіныя происходящим воть укушенія блохь, которое обнаруживаются на лиць, сперва на лбу, по том на выходить груди, а напосльдокь на конетностяхо.

(ВЪ кори злотворной высыпь двлается ранве или призчани позже; иногда разность состоить въ трехъ или четори злотырехъ дляхь. Она начинается сперва съ плечь и другихъ частей твла, а не съ лица. Всв припадки какъ прежде, такъ и послв оной, бывають жесточайшими; пульсо медленено и мало, дышанте часто, тяжесть повыше поясницы, мога бледна, бредо, корги, припрышки въ тендинахо и проч.)

Прыщи кори различаются от прыщей осны едва чыт разпримытнымы возвышениемы, которыя притомы вы конщь чешуйками падаюты; напротивы того прыщи осны осны:

ды чаются жемчужинами, кои подгнивають. Пихорадка,
кашель, трудность вы дышани не только послы высыпи не проходять, такь какы вы осны, но еще и умножаются; однако ряота обыкновенно перестаеть: сверыхы
того примычается кашель и невольное слезотечеле
вы кори, чего вы осны не встрычается.

Около шестаго или седьмаго дня, считая съ пер-время, въ ваго дня чувствованія нездоровья, прыщики принимають ное ухона себя цвъть блъдной, сперва на лицъ, а по томь дить вымало помалу и по всему тълу, такъ что въ девятой они совсъмъ пропадають.

Однако иногда случается, что лихорадка и труд неблагоность вЪ дышанти всю продолжается, а особливо ежепризнаки, причиняе- ли больной содержался на слишком в горясительной діэть. мые горя- Петехіи или пурпуровыя пятна, случающіяся в сей содержані- бользни, происходят в также от сей причины.

емъ.

Обыкновенной приобыкновенной признакъ кори злотворной; тогда жизнь
знакъ кори больнаго находится въ величайшей опасности.

ной.

Тв, кои умирають оть сей бользни, обыкновеншій день но умирають вы девятой день, наипаче оть воспаленія
вы сей 60- легкихь.

Умъренное испражнение низомъ, влажность кожи, атнъйшие обильное течение моги, суть благоприятнъйшие признаки.

Когда внезапно сыпь внутрь уходить, и больной приятные и начинаеть бредить, что часто случается вь злотворпризнани. ной кори: то больной подвергается величайтей опасности. Ежели красные прыщики побледнеють прежде тестаго или седьмаго дня, то и это неблагопріятной знакь. То же должно думать о великой слабости, о рвоте, ворачань и трудности вь глотаніи. Пурпуровыя пятна или черныя, появляющіяся во время высыпи, весьма опасны; безпрестанной кашель, соединенной сь охриплостію вь конць бользни, заставляєть опасаться тахотки.

(Прежде дальнъйшаго чтенія читай главу і и 2 сего Тома.)

\$ 3.

Пищеупотребление и содержание себя, которое надобно предписать больнымо корыю.

щель, но ВЪ пользовании сей болезни все дело состоитъ торую на въ томъ, чтобъ помочь натуре въ изгнании наружу полагань болезнетворной материи. Когда усилия натуры не довании сей пользо-вольны, то надобно давать больному пристойныя кревании сей питель-

пительныя; а когда они слишком в бойки, то надлежить умърять ихв выпоражниваніями, мокротожидительными питіями и проч. Мы должны еще заниматься ушишентемъ сильнъйшихъ припадковъ, какъ- то кашля, ворочанья, прудносши въ дышаніи.

Прохладительное себя содержание здёсь столь прохидиже нужно, какЪ и вЪ оспъ: яства должны бышь легкія, тельное сеа пишія мок ротожи дительныя; но кислыя вещесшва не жаніе; киетоль пригодны въ кори, сколько въ оспъ, потому слыя вечто могуть они придать силы кашлю; даже самое щества не полино, хошя въ оспъ есть превосходное пишье, не ней годим, пригодно бы было вЪ кори.

какъ въ оспъ. Для

Приличнъйшими пишіями сушь декокты изъ со-чего? лодки, из вкорней рожи, проскурняка и сассапа релли, на- какія долстои, съ льняным в съменем в и бузинными цвътами, съ мя- жны бышь тою и проч. из впропущенной сыворотки, ятной во ды и проч.

Ежели въ живошъ есшь запора, то надобно под-когда жислащать каждое сте питье медомв. Ежели медв про-воть зашивень желудку больнаго, то надобно прибавить въ перть. еїн нишья манны, глядя на обстоятельство.

6 4.

Явкарства, кои надобно предписывать больным корые.

КакЪ кора есть бользнь воспалительная безЪ вся-обстоякаго примъщнаго выпоражниванія крититеской машерін, тельство, такъ какъ въ ость: то вообще она требуеть крово-зываеть пусканія, наиначе когда лихорадка сильна, когда ды- нровошать больному трудно и чувствуется тяжесть въпускание. груди; со всвыв твыв кросопускание бываеть безполезнымъ въ кори благотворной.

Бани, или частыя умовентя ногъ и голеней въ умовента теплой водв способствують къ уменьшению зъльности ногълихорадки и кЪ содвиствію высыпи.

надобно Часто реота много облегчаеть больнаго. Когда мособлять натура стремится къ сему выпоражниванию, то не расть, ко- надобно оному сопротивляться, напротивъ того надествен- лежить оному пособлять теплою водою, или настоемо но обнару- съ ромашковыми цвъщами.

что надо- Когда кашель нападаеть часто, больной чувбно дълать ствуеть сухость въ горль, и дышеть тяжело: то для утишенія наш- надобно ему держать голову надь паромы теплой воля, сухо- ды, и такой же парь впускать въ себя посредствомы сти горла, в дыхальника.

трудности вЪ дышаніи?

Тогда же надобно ему дашь нъсколько спер. пацету съ леденцомо, смъшанных вмъстъ; или время от времени давать по ложечкъ масла изъ сладкаго миндаля, въ коемъ немного разпущено леденца: сїи лъкарства услаждають грудь и утоляють щекотаніе, производящее кашель.

Когда ликорадка
начинають блёднёть, лихорадка снова усилится, и
начинають блёднёть, лихорадка снова усилится, и
вается, а ежели больной кажется въ опасности, чтобъ не запрыщи на- душился: то надобно пустить ему крови столько,
чинають сколько силы его позволять, и приложить нарывныя къ
икрамь для воспрепятствованія, чтобъ матерія кори
не пала на легкія; потому что ежели хотя однажды заведется въ оныхъ воспаленіе, то жизнь больнаго находиться будеть въ величайшей опасности.

Когда вы сыпь внезапно пропадетъ. ВЪ случав, когда высыть внезапно пропадеть, то надобно употребить ть средства, кои мы одобрили въ ость, утедшей внутрь, въ главъ 12, § 1, членъ IV. Больнаго надобно подкръплять виномъ и кръпительными, къ икрамъ и рукамъ приложить нарывныя, тереть все тъло фланелью разогрътою. Можно еще приложить къ подощвамъ ногъ и къ ладонямъ рукъ горчицу съ тъстомъ.

Когда ноявятся пурпуровыя пятны или черныя, когда пото надобно подкислять питье больнаго купоросным вышем спиртом ; и ежели признаки гнилости будут укнопурпурожаться, то надобно дать хины, так как вы сов выя или петехіаль-

Болеутолительныя часто бывають нужными вь обстоякори; но ихь падобно тогда только давать, когда тельства, есть безсонница и упорной поносв, или когда кашель нои понанарочить. Для дьтей діакодіева, или маковаго сиро- болеутопа довольно: его имь надобно давать по одной или лительныя.
по двъ кофейныя ложечки, глядя на возрасть и тяжесть припадковь.

Когда корз прошла, то вообще надобно дать боль-чищань. ному одно или два протищения, кои надобно употребить такимъ же образомъ, какъ мы предписали въ оспъ.

Но ежели послѣ кори у больнаго будетъ сильной но дълать, поносъ, то надоэно стараться остановить его ногда подаваніемъ чрезъ нъсколько дней по маленькому пріемцу слѣ бользревеня поутру, а подъ вечеръ какого нибудь болеуто- жается лительнаго. Ежели сій средства не удадутся, то крово- упорной пусканіе върно остановить поносъ.

\$ 5

Пользование выздоровления отд кори.

Больные послѣ кори весьма должны бышь осто жно быть рожными въ выборъ лство и питій; ихъ яства должны яствами и быть чрезъ нъсколько времени очень легкими и въ ма-питіємь? ломъ количествь, а питіе мокротожи дительнымо, или лучше свойства послаблятельнаго, какъ - то сыворотка послъ пахтанья, простая сыворотка, такъ какъ предписано въ § 3 главы 2 сего Тома.

Они должны опасаться выходить очень скоро на Бользчи, колодной воздухв; потому что от того можеть жеть припроизойти удушье св кашлемв, одышка, или такотка, чинить холодной воздухь.

Т г

Ежелодной воздухь.

Тто налов. Ежели катель, трудность вы дышаній и другіє по двлать, признаки тахотки остающей ноель того, какы керь проногда вы
при та, то надобно выпускать изы больнаго по перемеотвремя жушкать насколько крови, такы какы мы дали знать
ем призна вы примыч. 10 сего Тома; сверьхы того надлежить
предвисать ему молоко ослицы, вывести его на воздухы чистой, ежели живеть оны вы больтомы городь,
и наказать ему разыважаться на лошали верьхомы каждой день. Оны должень довольствоваться пищеупотребленгемь, состоящимы только изы молока и растепій.
Наконець ежели сій средства не удадутся, то надобно наказать ему, чтобы оны перебрался для житья вы
предвийнія земли, такы какы предписано вы главь 7,

1, и примыч. 7 сей книги (а).

TAABA 14-

О лихорадкё кропивной.

бия чего сія лижорадка танЪ наэвана? Кропивная ликорадна нолучила сте имя от в краснаго или багроваго цвъта кожи, которая кажется какъ будто настрекана кропивою, или выкращена краснымъ виномъ,

Cim

мио», воды на коры ; спо» прививащь

(а) Некоморые пытались прививать корь, такъ нань осну; и неть въ томь сомнения, что сія практича со временемь равно будеть успетина. Донторь Гомь Эдимбургскій говорить, что онь привиль корь посредствомы крови больных другіе повторили сію операцію, но успеха не имели. Некоторые думають, что лучте можно сосбщить сію бользнь, потерши жлопчатою бумагою кожу больнаго корью, и приложивь эту бумагу нь ранкь здороваго, такъ какъ поступачеть вь остопряжений. Другіе напротивь совытують валть лоскуть фланели, приложить ее на ножу больнаго корью, оставить ее туть на все время бользни, а по томь растянуть ее на рукь, или на ногь того, кому котять сообщить бользнь.

Не можно сомнъваться, что много есть и других способовь прививать морь, такъ какъ много есть способовъ соебщать осту; не

Сія бользнь приходить во всякое тодовое время; въ котоко въ концъ льта она обыкновеннъе, и въ сле время рое годопристасть она часто къ цълому семейству, а особ-она обыкливо ежели есть дъти.

Дъти и молодые люди наипаче оной подвержены. кто оной (Сію ликорадку раздъляють на благотворную и подвержень?
злотворную, глядя по тому, болье или менье опасно-какъ разети предвъщають признаки. Мы будемь объ оной раз- дъяноть сей виль суждать подъ сими двумя видами.)

§ 1.

О лихорадкъ кропивной благотворной.

(Сей видь лихорадки кропивной, наиболье случающейся, часто бываеть столь легкимь, что больные рыдко призывають для пользованія Авкарей.)

члень І.

Признаки лихорадки кропивной благотворной.

Она, такъ какъ всъ другія лихорадки, начинается то ознобомъ, то жаромъ, безъ нарочитаго нездоровья; по томъ кожа покрывается красными пятнами, широчайшими, многочисленнъйшими, густоцьътнъйшими и не столь единообразными, какъ въ кори.

Сін пяшны продолжающся два или шри дни, и Скожью по шом в пропадающь; посль чего кожица слупливается времени продолсь тыла и упадаеть вы виды шелухи или кожуринокь жается сія Гг 2 (Пре-высыпь?

въроятно, что надеживити изъ оныхъ есть тоть, чтобъ потереть клопчатою бумагою кожу больнаго корью, а по томъ приложить бумагу къ здоровому, или впустить въ кровь небольное количестве водянистой влажности, текущей изъ носа или изъ глазт больныхъ. Вев практини согласно утверзаляють, что тъ, къ коимъ привита была норь, имъли се влаготворнъйшую. И такъ мы должны желать, что бъ сіл практина была новсемъстиве, тъмъ паче, что съ нъкотора- до времени коръ стала опасибитею.

(Прежде дальный шаго чтенія читай і и 2 главы сего Тома.)

ЧЛЕНЪ И.

Пользование лихорадки кропивной благотворной.

лъкарства. Въ сей бользни ръдко случается имъть нужду въ ней не въ лъкарствахъ; однако больному надобно оставаться очень нуж- въ комнатъ, воздержаться отъ мяса, квашенных испитково, кръпительных и проч.

Содержаніе Ему надобно обильно принимать питій прохласебя; питье. дительных и мокротожи дительных д.

Ежели лихо радка усилишся, то надобно употельства, требить промыванія, кои бы послабляли животь, или
нои показують ль. давать по малымь пріемамь селитры и ресеню, на
наретва: примърь по шести грановь селитры, да но пяти или
марчитель тести грановь ревеню, что надобно повторить два
ныя промыванія, или три раза вь день, или еще и чаще, ежели буселитру и деть нужно.

умовенія На дѣтей и молодых в людей часто в в началѣ рукв и сей бользни находит в какое - то изступленіе и терпомолимемотныя корти: тогда надобно им выть руки и нотельныя ги в в теплой водь, и давать по кофейной ложечки во
ввечеру. всякой вечер в діакодіева сиропа, пока бользнь совсьм выльчится. Сиденгам в.

∫ 2.

О лихоражкъ кропивной злотворной.

лихорадка Однако кропивная лихорадка не всегда бываеты кропивная толь благотворного; иногда она сопровождается привсегда она знаками гнилыми и злыми, и въ семъ случат она всена. Гда опасна.

ЧЛЕНЪ

ЧЛЕНЪ I.

Признаки, избявляющие лихорадку крописную зло-

ВЪ лихорадкѣ кропивной злотворной больной чув. ствуетъ не токмо холодъ и жаръ, но еще уныте, повсемъстное нездоровье и великую тяжесть въгруди. За сими припадками слъдуютъ непомърной жаръ, тошнота, рвота и боль въ горлъ.

Пулься весьма таств, но маля и густь; дышаиге скоро и тяжко; кожа жгуча, но не совсыть суха; языкъ влаженъ и покрыть былымь иломв; миндалины воспалены и съ ранками.

Когда высыть выступила, то она не доставляеть никакого облегченія, а напротивы того припадки обыкновенно напряженностію умножаются; да еще иногда приключаются горестныйте, какы то попосы, бреды и проч.

(Прежде дальнёйшаго чтенія, читай главы і и 2 сего Тома.)

ЧЛЕНЪ II.

Пользование лихорадки кропивной злотворной.

Когда кто обманется в в сей лихорадкв, и почетии опасность ее просто за бользны воспалительную, станет в лыно-ражнива-чить частыми кровопускані лми, тистительными и лыній в карствами прохладительными: то вообще сдыласть ее семь виды еще опасныйшею.

Единыя пособія, ею требуемыя, должны взя-нужда въ ты быть изъ класса крепительных и противугииль- крепииых : таковы суть вино, хина, корень Виргинійской тельных и противусерпентаріи и проч. Она вообще должна пользуема гнихьбыть какъ лихорадка гнилая злая, или какъ антоново- ныхъ.

Т г 3

огненная бользив горла, о коих в толкуется в в главах в 9 и 19 сего Тома (a).

T A A B A 15.

В лихорадкв желтной.

Когда лихорадка безпрерывная, перемежающаяся, знаки сего или отступная, соединена съ частымъ и обильнымъ вида ливыпоражниванием в желги низом в или верхом в: то жорадки. сія ликорадка называется желтною, такъ какъ мы уже показали въ главъ 4, въ примъч. и сего Тома.

ВЪ Англіи (да и вЪ Россіи) она обыкновенно окавъ кожо- зывается въ концъ лъта, и проходить въ началъ зимы. рую пору Она обыкновенные и опасные въ земляхъ жаркихъ, она часта? земли, въ особливо ежели груншъ оныхъ болошистъ, и ежели обыкновен- за великими дождями последовали большія засухи.

Ha. Люди, работающие на вольном воздух в, живукто наи- щёе въ поль, выходящёе на ночной воздухъ и росу, болье оной наиболье оной подвержены. подвер-

з бизже

chanie.

(Прежде дальныйшаго чтенія читай і и 2 главы eero Toma.)

N I.

Пользование лихорадки желтной, когда она безпрерывная.

Ежели начала сей лихора дки обнаруживаются знаобстояmeльства, ками воспаленія, то кровопусканіе дъластся нужнымь. нои поиззуюшъ кровоп у-

MANUEL

⁽а) Зимою 1774 года въ Эдимбургъ свиръпсивовала паного же рода весьма описная лиморадия; она опустошения свои чинила наипаче между дъщьми простаго народа. Высыпь обыкновенно соединена была съ жевою, и воспалимельные призначи, смешанные со многими другими свойства тыплиго, двязян пользовачие сей бользыи весьма шруднымв. Вы конца сей больями у величайшей чести больных в новелилась нарочитая опухоль вы челюстнымы желбламы, а у многихы наспосние вы едномь ухв, и даже вы сбоихъ.

Надобно шогда же посадишь больнаго на содер-пищеуножанте себя прохладительное, мокротожидительное, требление одобренное прошив в лихорадки безпрерывной - острой. ства. Еще надлежить ему давать соленаго питья, кое почаще повторять вы день, а животь его послаблять иромываніями, или слабыми тистительными, такы какы предписано вы главы 4, § 3 и 4 сего Тома.

\$ 2.

Пользование ликорадки желсной, когда она перемежаю-

Но ежели михорадка желтная есшь перемежающаяся, или отступная, то кровопусканів рёдко бываеть требленіе мужнымь. Надобно тогда предписать рвотное, такь и лекаркакь мы сказали вы главь 3, § 3 и 4, и главь 11, § ства. 3 и 4 сего Тома.

\$ 3.

Пользование лихорадки желеной оппосительно ко глав-

Ежели животь заперть, що надобно предписать кога живот слабительное, а по томь хину, которая обыкновоть заперть. Венно довершить пользование. (Ежели, не смотря на влабительное, желть не будеть течи, що надлежить предписать промывания, кои нужно повторинь, глямя по обстоятельствань. Два или три грана суртяная по обстоятельствань. Два или три грана суртяная по три унціяхь воды, коей кладется по ложкь вы каждую рюмку подсытенной соды, сысоротки, или лимонада и проч. производить часто весьма хорошія дьйствія).

ВЪ случав упорнаго поноса надобно поддержи-когда повашь силы больнаго цыплячьими бульюнами, желеемд нось, оленьяго рога; вмъсто обыкновеннаго пишья можно вну предписать бълой декоктъ. Ежели поносъ будетъ кросакросавой и соединенЪ сЪ лихорадкою, то надобно его пользовать такЪ какЪ отЪ кросаваго поноса, о коемЪ мы будемЪ говорить вЪ Томѣ III, вЪ главѣ 25, § 7, членѣ I.

когда но- Когда кожа жгуча, однако притомъ больной не жа жгуча, можетъ потъть, то надобно стараться возбудить сте выпоражниванте, давая больному три или четыре раза на дни по обыкновенной ложкъ мендерерова спирта (Spiritus mendercri) въ стаканъ обыкновеннаго его питья.

когда поя- Ежели желтная лихорадка соединена будеть съ вятся при- признаками нервными, гнилыми и проч. какъ- то слуные, гни- чается довольно часто, то въ семъ случав больной вые и пользуется такъ, какъ мы совътовали въ главахъ з проч. и 9 сего Тома.

\$ 4.

Средства, кои надлежито употреблять для предупреж-

Упомреб. По излъчени сей лихорадки надобно всячески лене каны, стараться, чтобъ опять въ нее не внасть: въ слъдемань представие чего больной долженъ, а особливо около контельное ца осени, продолжать употребление кины нъсколько лъкарство времени, хотя бы онъ и выздоровълъ; воздержаться отъ худыхъ плодовъ, отъ новыхъ напитковъ и ястеб вътротворныхо, такъ какъ сказано въ § 3 главы 2 сего Тома.

Γ A A B A 16.

0 рож в.

на какомъ Рожа можетъ приключиться на всякомъ году; обыкновен- но обыкновеннъе между притцатымъ и сороковымъ ите:

Люди темперамента много и полнок ровнаго на-кто наимпаче оной подвержены. Она часто пристаеть къ мо-болъе оной лодымь людямь и чреватымь женщинамь; на комь она жень? Она была однажды, къ тому опять очень удобно при-опять пристать можеть.

Иногда сїя бользиь бываешь самобышною или онг то существенною, а иногда симптоматитескою, ш. е. про-существенная, по исшедшею оть другихь причинь.

Всъ части лъла могутъ быть гнъздомъ сей бо-еная.

лъзни; но она чаще всего нападаетъ на лицо и ноги, Гат гнъздо сей больз-

Она чаще случается въ осени, зимою, а особли-годовое во когда погода студеная и мокрая последуеть время, въ за великою теплотою.

ное она обыкловен-

(Мы не хошим описывать всёх видов солько рож ; таковая подробность вывела бы нас из видов в границь, а впрочем была бы совсём безполезна рож как для всякаго челов вка, так и для Лькарей. Вы самой вещи, для тех для коих вы пишем в, что нужды знать, что та рож , которая охватывает в тело как бы опояскою, названа зостером ; всеобщего, которая распростирается по всему телу; перемежающегося, которая то выходит в, то уходит в, ежели всё сти виды им воть те знаки и пользуются одинаково? Но мы не должны умолчать здёсь о двух в рожах в; потому что хотя он в и благот ворим, но только им воть знаки збивчивые, и слёдовательно могут привесть практика в в погрытность.

Первая та, которую называють разолією, и ко-что такоє торую лучше бы назвать всеобщею рожею со прыщами. рожа съ Она пристаеть, говорить Г. Лістоль, къмладенцамь прыщами: и молодымь людямь.

Jome II.

Вторая та, которую называють рожею литною личная ро- или на лиць, и которая всегда соединена бываеть съ жа? Пря мое о ней сильною лихорадкого. Но, говорить Г. ле Роа, тоть поняте мало знаеть свойство сей бользни, кто почитаеть въ такомъ случаь рожу бользнію самобытного, а лихорадку пришлою или симптоматитеского: совсьмы напротивь; сія бользнь не иное что есть, какъ высыпная лихорадка, коея переломо, болье или менье совершенной, производится скопомо влажности на оболочкахъ лица, головы, щем и проч.)

S 1.

Присины рожи.

обыкновен- Рожа часто причиняется сильными движеніями нъйшая хо- или страстьми души, страхомо, гивеомо и проч. Она модь, т. происходить еще от холода, т. е. простуды (а). Ежели человъкъ сторяча тотчасъ выдетъ на холодъ, такъ что у него остановится вдругъ испарина, то весьма часто от сего пристанетъ рожа.

Непомърное пишье, упошребление бань чрезъдолгое время, все могущее разгорячить кровь, можеть къ оной подать поводъ; обычайное испражнение, совсъмъ или отчасти остановившееся, также остановка какого нибудь искуственнаго испражнения, какъ- топрижигания, щетины и проч.

J. 2 ...

Признаки рожи...

норядокъ, Ознобв, жажда, потеря силъ, боль въ головъ п. въ ноемъ шет, жаръ, безсонница, пульсв тастой, суть первые понванот. ся призна-

MHo.

⁽а) Мы не убоимся уппверждать, что изб десяти рожь дев ть произошли отб простуды. То, что въ деревняхъ называется бользнію съ глазу и просписю, есть настоящая рожа.

признаки рожи, къ коимъ можно прибавить реоту и часто бредд. Около втораго, третьяго или четвертаго дня та часть, которая имветь быть ея гнвздомь, опухаеть и становится красною; вскоръ по томъ тутъ появляются малинькіе волдырьки; тогда и лихорадка обыкновенно уменьшается.

- Один в из в различительных в признаков в рожи есть Характето, что высыпа, цвътомъ красная съ лоскомъ, при ристичеприжиманіи бълбеть, т. е. что когда пожмешь паль изки рожи. цомъ красное мъсто, то на ономъ мъстъ окажется бълое пяшно, которое туть пробудеть чрезв нъсколько времени, а по томъ опять покраснъетъ какъ и прежде. Сей знакъ часто довольнымъ бываетъ для различенія рожи отб других высыпей, на кои она походить, а особливо оть розали и всеобщей рожи съ волды раками, почитаемой иногда по ошибк в еще и корыю.

Всеобщая или всемвстная рожа открывается на Признаки первых В днях в прыщиками или волдырьками, мало всеобщей различными отъ прыщиков кори; но ихъ основанія расширяющся и соединяющся, такЪ что покрываютЪ тьло настоящею рожего, которая проходить въ девятой день, оставляя кожу покрытою чешуйками. Сія высыпь опаснъе высыпи кори, съ коею ее иногда смъшивають. Она еще почитаема была въ нъкоторыхъ случаях в нъкоторым в родом в оспы; но обыкновенно ей не дается никакого имени, такъ какъ и другимъ бользняма кожи.

Когда рожа пристаетькь ногь, то ближнія кы ней признаки мъста распухають, и кожа лоснется. Ежели боль бу- Р жи на дешь сильна, то она распространится по всей ногв, кЪ коей не льзя дотронуться безъ боли больнаго.

Рожа на лиць раздуваеть оное, делаеть его на лиць. краснымЪ, и попрываетъ его малинькими волдырьками A A 2

«Б свытою водою; опухоль простирается до одного, или и до обоих в глазв, и их в затворяеть. Больному дышать тяжело. Когда во рту и ноздрях в очень сухо, и больной сонливв, то мадобно опасаться, чтобь не приключилось воспаленте мозга.

(Она обыкновенно начинается ознобомв, послъ коего возгарается сильная лихорадка, т. е. горятка. Вначаль больной обыкновенно мучится тошнотою и позывами на реоту; он в даже иногда блюеть желтного матерією, и въ семь пункть бользни реотныя обыкновенно полезны. На второй день, или въ концъ перваго, иногда съ самаго начала, показывается красноша съ опухолью и лоскомъ на нъкоторыхъ мъстахъ носа, съ коего рожная опухоль расходишся по лицу, нъсколько по шев, по ушамъ, даже часто по головъ и подъ волосами. Въ шеченте шрехъ или чешырехъ дней стя опухоль расходится и доходить до высочайшаго ешенени. КакЪ скоро она совершилась, то лихорадка и припадки весьма уменьшаются, и иногда совстыв проходять; наконець кожа больнаго мъста облупляется и падаеть чешуйками. Сія бользнь благотворна; люди, на коихъ она была одинъ разъ, часто по томъ опять въ нее впадають.)

ма груди.

Когда рожа гнъздо имъешъ на груди, то грудъ распухаеть и неномърно твердъеть: сїи припадки со-единены съ величайтею болью и расположеніемъ къ нагноснію; больной чувствуєть сильную боль подъ мышками больнаго мъста, и часто туть дълается нарыеб (1),

Влагопрі- Ежели опухоль опадеть въ одинъ или въ два дни; ятные при- ежели тогда же жаръ и боль пройдуть; ежели кожа

⁽¹⁾ Тогда она занимаетъ только жельзистыя части, накъ - то мышки, о коихъ упоминаетъ Г. Буканъ, и особливо титьки, накъ - то часте случается, и сей видъ рожи десьма досаденъ.

начнешъ желшты и станеть лупиться: то нать бог лье онасности.

(Сей конець бользни бываеть такь коротокь вы однихы только легкихы рожахы, кои, правда, чаще всего случаются; потому что у людей пожилыхы, у скорбутныхы, или имыющихы другую какую нибудь порчу вы крови, сія бользны долговременные бываеть даже и тогда, когда она ведеты кы смерти; вы другихы случаяхы высыть превращается вы весьма упорчые вереды, а особливо на ногахы.)

Но ежели рожа распространилась и углубилась; онасные ежели гнъздо ея находится на чувствительных в мь-признаки стахв; тогда она всегда соединена св опасностію. Ежели цвътв оной перемънится изв краснаго въ синій, или черной, то надобно опасаться антонова огня. Иногда не можно разбить воспаленія, и рожа доходить до иссноснія. Въ сихв случалх иногда посль-

Умирающіе въ сей бользни обыкновенно похищаются лихорадкою, которая тогда соединена бываеть сь трудностію въ дышаніи, иногда съ бредолюи сонливостію; они умирають вообще около седьмагоили осьмаго дня.

(Рожа на лиць чыть опасные, тыть опухольсильные. Ежели она сыдеть на шев, то надобнобояться упорной жабы.

Повсемвстнай рожа требуеть пользованія присполобленнаго кь обстоятельствамь, изъясняемымь вы сей главь. Рожа на лиць требуеть такого же пользованія, какого ликорадка безпрерывная - острая (горятка), о коей мы толковали вы главь 4, § 3 и 4 сего Тома.)

\$ 3.

· S 3.

Пищеупотребление, кое надобно предписывать больным в рожего.

вышь ин вы излишнемы холоды, ни вы излишней теплоты; понемы колонемы колоды, ни вы внутры сысыть, что всегда надобно предупреждать жару. Для во всякомы видь рожи.

Что тогда Когда бользнь легка, то довольно больному быть двагть, только въ комнать, не нуждаясь ложиться въ постеногда 60- лю: испаринь надобно пособлять теплыми мокрото легна?

жи дительными питіями и проч. а больное мъсто покрыть такъ, чтобъ туть была умъренная теплота.

Яства.

Діэта должна быть легкая и свойства умъренно прохладительнаго и увлажилющаго. Больному надобно давать кашицы, панада, цыплячьяго бульюна, или варимаго съ ясменемо, растеніями и прохладительными плодами; а запретить мясо, рыбу, квашеныхъ напитковъ, всякую приправу, все, что можетъ разгорячить и воспадить кровь.

Пишье.

Питье должно состоять из ватной воды, из векокта събузинными цвътами, или сыворотки и проч.

питье и детва, ко- Но когда пульсё томень, а больной сталь уныль, гда больный то надобно подкрыплять его силы виномы, или друтяжна. гими нитіями свойства крыпительнаго. Вы семы случав надобно ему давать сагу сы небольшимы количествомы вина, питательныхы бультоновы по немногу, но часто; однако надобно остерегаться оты
всего того, что можеты разгорячить.

S 4.

Пъкарства, кои на добно предписывать больным д рожею.

Рожа не Часто въ сей бользни весьма худо дълають лытребуеть карствами, а наипаче прикладываемыми снаружи. Какъникакого скоскоро колвится воспаление наружи, то и прибъгають вывшнаго къ вывшнимъ прикладываниямъ: конечно они нужны въ прикладывания нарочитыхъ опухоляхъ, какъ-то мы будемъ говорить въ Томъ IV, главъ 52, § 3; но рожа не имъетъ нужды ни въ какомъ изъ сихъ прикладываний.

Мазанья, мази, пластыри, почти всё составы опасноети из веществъ жирныхъ болбе способны закрыть поры от макожи и вогнать внутрь влажность, силящуюся вытти вонъ, нежели открыть поры и выгнать нару-стыря и
жу оную (2).

ВЪ началъ сей бользни равно опасно какЪ произво-предостодить пасносние, такЪ вогнать внутрь влажность. Рожа рожность, по нькоторымЪ видамЪ подобна подагръ, и должна бустъ нользоваться съ ведичайшею осторожностию:

Одно токмо прикладыванте позволительно, а кантя приименно клочек в тонкой шерсти, или мягкой фланели, кладывакоим в надобно покрыть больное мысто для защищентя на позвоего от вліянтй внышняго воздуха; он возбудить легкую испарину, что весьма важно в сей бользни. В в Шотландій простой народ в прикладывает в кв больному мысту былую тряпицу св отрубями, что кажется: весьма пригодно (3).

ВЪ

Другая опасность, происходящая от наружных прикладываній вы сей бользии, есть уходь сысыпи внутрь. Рожа, говорить Г.

⁽²⁾ Вст жирныя вещества опасны въ сысыпныхъ бользняхъ; даже са- Отъ примыл мягчительныя припарки въ оныхъ часто бывають вредными парокъ, Я видъль одну рожу, хоти легную, но оть употребленія настоя съ даже мягкулиными цеттами нагноившуюся; сіг пагноеніе было весьма упор- чительно и уступило только частымъ чистительнымъ:

— ныхъ. Для

⁽⁵⁾ Держи только больное мьсто въ тепль посредствомъ или фланели, чего? или шерсти: воть всь ть лькарства, коихъ требуеть сіл бользань! Въ сей истиннъ тоть тотарки и наэръвательный катаплазмы совьтуеть только для произгеденія нагноенія, когда обстоятельства того требують.

вы сей бо
вы рожи обыкновенно пускають кровь; но эта предин пуоперація требуеть предосторожности. Хотя то извыстно, что кросопусканіе дыльно показуется, естьдобно сь ди лихорадка (жарь) сильна, естьли пулься жестока
осторожностью и упругь, ежели больной собою плотень; однако количество крови должно относительно быть къ обстоятельствамь; и одни только признаки должны рышить, надобно ли кровопусканіе повторить, или довольствоваться однимь только.

Случан, Ежели больной привыкЪ пишь крепкие напитки, въ ноихъ а гнъздо бользни находишся въ головь, то всегда скание ну кровопускание необходимо нужно.

MHO. Частыя бани (умовения) ногъ и голеней въ теп-Обенпояmeльства, лой водъ великое производять дъйствие, когда рожа кон шрепристала кЪ лицу, или поражаетъ мозго; онъ отпябують гивають соки оть головы нанизь, и почти всегда умовеній ногъ, на облегчающь больнаго. Ежели сін бани не произведущь паплазжеланнаго действія, то надобно въ топъ же намеремовъ изъ луку, гор- ній приложить катаплазлы изб луку, или тесто сб горгицею къ подошвамъ ногъ. чицы съ тветомЪ;

мягчи
шельных сще слегка послабищь живошь мястительными промыній, сели-ваніями, и малинькими прісмцами селитры и ревеню,
тры и ре- Нъкоторые Врачи вы семы обстоятельствы предписывающь селитру по весьма великимы прісмамы; но сія
соль вообще удручаєть желудокы, когда принимаєтся
по очень великимы прісмамы: со всымы тымы сіе лыкарство есть изы числа наилучшихы.

Ko-

ме Роа, есть такая бользьь, которая наипаче подвержена отраженіямь и перемодамь. И такъ надобно опасаться, чтобь не причинить сего ухода худымъ пользованіемъ: надобно, когда рожа обнаруживается, ничего на нее не прикладывать, оставить ее натурь и стараться только о поправленія состава соковь.

Когда лихорадка и воспаление очень нарочиты, то можно больному дать три или четыре раза въ день въ его обыкновенномъ питьъ по двънатцати, по пятнатцати грановъ селитры, и пять или месть грановъ ревеню.

Когда рожа, оставив в конетности, приступить чистикъ головъ, такъ что причинить бредв, или сонливость, то необходимо надобно больнаго прочистить; ныхъ, надаже надобно унотребить сильныя систительныя, когда рывныхъ
промыванія и легкія слабительныя не подъйствовали.
Надлежить еще въ семъ случав приложить нарывных
къ затылку, или подъ ушми, и тесто съ горгицею
къ подошвъ ногъ.

Когда не можно было разбить соспаленія, и на какъ и нодобно опасаться, чтобъ больное мѣсто не растра-га надобвилось, то надлежить тогда стараться произвесть напать для спосніє. Сіє савлать можно прикладываність насноиса-произведетельных катаплазлось, въ кои надобно прибавить нія нагносшафрану, также припарками и другими подобными нія: лькарствами.

Цвъть синій, черной, темной больнаго мъста, обстоявозвъщающій расположеніе къ антоносу огню, показываеть, тельства, что надобно предписать хину; надобно ее совоку въ ноихъ пить съ кислотали, такъ какъ мы совътовали въ ослъ нужна кивъ главъ 12, § 1, членъ III.

Ее надобно предписывать подъ прілтнъйшимъ больному видомъ; но никогда не надобно ее опускать: ность въ потому что от оной зависить спасеніе жизни. Еже-семь случи признаки страшны, то надобно давать по драх-чать мь чрезъ каждые два часа.

Сверх В того на больное м всто надобно приложить обмоченные в В винном в спирт камфарном в Она при-(fpiritus vini comphorati), или в В тинктур в мирры и надыалом (tinetura myrræ & aloes) компрессы; сти компрес-же снару-Том в II.

жи въ на-сы часто должно на дни перемънять. Еще можно къ больному ивсту прикладывать в вемь случав ката. man 123махъ, или илазлы съ хиного, или припаривать оное кръпкимъ девъ прицаркоктомв хиннымв же. кахъ.

Канъ наemynams. въ скор-涨方:

ВЪ теченте рожи, названной скорбутного рожего, кодоб о по- торая продолжается чрез в нарочитое время, надлежить довольно слегка прочищать и давать лекарства, кои бы бушной ро- очищали кровь и производили испарину. По разбишти воспаленія прохладительными и слабительными лёкарствами надлежить больному давать витето пишья декоктв изв потогонительных деревв: послъ довольнаго употребленія сего декокта, надобно предписать торькія вещества...

\$ 5.

Средства предохранять себя от врожи.

Тъ, кои подвержены частымъ возвратамъ рожи, должны особенно остерегаться от сильных страстей, воздерживаться от в крепких в напитково, от в яств в соленых в, вязких в очень питательных в, избъгать непомфриых в жаров в и крайняго холода, и предпринимашь довольное твлолеижение.

Яства и пишіе.

ИхЪ главная пища должна состоять изЪ молока, изъ плодовъ, и изъ корней свойства прохладительного; а питье изв легкого полива, сыворотки, подонков послв пактанья и проч.

ДОЛЖНО избъгать запора.

Долговременные запоры весьма вредны симъ людямь. Ежели они не могуть ему пособить однимь пищеупотреблениемв, то нужно имв почасту принимашь по нъскольку приемовъ ревеня, виннаго камня (cremoris tartari), послаблятельного электупрія (electuarii lenitivi), или другаго легкаго тистительнаго (таков в есть электуарии, названный Троншеневы мо мармеладомв, коего рецепть находится во всеобщей табли-11. в В Томь V, под в словом в Гроншенево мармеладо.

Г Л А В А 17.

О сумазбродстви или воспалении мозга.

Сїя бользнь бываеть иногда бользнію самобыт- Сія бользнь ною или существенною, но чаще припадкомь или сльд-чаще быствіемь другой какой нибудь бользни, какь на примърь птомати-воспалительной лихорадки (горятки), лихорадки вы-чесною, невыпной или пурпуровой и проч. (1).

Однако не ръдко случается ее видъть суще- ною земки, въ стениую въ горячихъ климатахъ, въ коихъ она наина- ноихъ она поражаетъ людей находящихся въ цвътъ воз- обыкновенраста. Люди горячте и страстные, ученые, также нъе, и люмитьющте первиой родо раздражательной, наиболье оной подвержениодвержены.

§ 7.

Присины сумазбродства или воспаленія мозга.

Сумазбродство часто причиняется бденіями, а особливо когда сіп бденія употребляются на глубокія уметвованія; непомерными попойками, вспыльчивостію,

E e 2

ne-

надобно замьтить, что, кота здёсь дёло идеть обы одномы только существенномы воспалении мозга; однако предписываемые здёсь совыты должны исполняемы быть, вы разсуждении себя содержина и лыхартвы, и вы симптоматическомы сумазыродствы, совежущно сы лыхарствами, показуемыми тою бользкію, оты коей оно произошло и воею сопровождается.

⁽¹⁾ Настоящее сумазбродето, т. е. та бользыь, которая по мивню Сколько Боергава не иное что есть, какъ безпрестанной и бъщеной бредь, за- настоящее висящій единственно оть мозгозаго пораженій и соединенный съ лихо сумазбродрадкою везпрерывною-острою, къ щастію весьма ръдко въ нашихъ ство опаклиматихъ. Сія жестоиля бользыь похищать часто больныхъ въ тресно, ногда тій или четвертой день, и никогда не заходить за седьмой. Но оно сущесимптоматическое или принадочное, т. е. произшедшее отъ другихъ ственное. накихъ нибудь бользыей воспаленіе мозга, часто принлючающееся въ бользияхъ острыхъ, а особливо упомачутыхъ Г. Буханомъ, не столь емертоносно, но долговременные; пот му что въ сихъ случаяхъ усиліе бользни нало уже на другія части, прежде нежели приступила къ мозгу.

печалью, бользнованиемЪ. Остановка обытайнаго выпоражниванія часто оное производить, какь-то потетуя у мущинь, а мвсятного очищения у женщинь и проч.

Тв, кои неосторожно подвергаются солнечному жару, а особливо ежели спять на открытомъ воздухъ въ горячую погоду съ открытою головою, часто вдругь подпадають такому воспалению лозга, что пробудясь начинають бредить, какь то мы покажемь въ Томь IV, въ главь 58.

Ежели кто по неосторожности употребляеть внутрывгонятельныя лькарства въ рожв, то часто отъ того послъдуетъ сумазбродство. Сно можетъ быть еще слъдствиемъ внъшнихъ причинъ, какъ-то ударовь, ушибоеб вь голову и проч.

6 2.

Признаки воспаленія мозга.

Признаки, кои обыкновенно случающся пред вос-Признани предшепалентемб мозга, суть боль въ головъ, краснота въ ешвующіе. глазахЪ, огонь вЪ лицъ, сонЪ прерывающійся или совсьмЪ пропадшій, великая сухость на кожь, запорб и немотеиспускание, небольшое провотечение изъ носа, журчанте въ ушахъ и крайняя чувствительность въ нервной системв.

Признаки . ющіе вос**маленіе** Мозга.

Когда воспаление мозга составилось, то признапоназыва- ки онаго совстыв бывають такте же, какте въ воспалительной лихорадкв (горяткв), кои показаны выше вЪ главъ 4, § 2 сего Тома. Правда, въ сумазбродствъ пульсв часто бываеть слабымв, непорядотнымв, дрожащимв, но иногда жесткимв и сжатымв. Когда один в только мозга воспалился, то пульса обыкновенно мякока и маль; но когда воспаление касается и оболотекь мозга, какЪ-то пін-матерь и дуры-матерь, тогда пульсв вывает Б. жестокв.

Характеристической признакъ сей бользии есть признани къжность слуха, от коей больной съ особенною тон-различность слышить; но сей признакъ не долговремененъ. Пругой признакъ, равно общій, есть біеніе или скаканіе шейных и висотных артерій.

ЯзыкЪ часто бываетЪ чернЪ и сухЪ; однако больной рѣдко жалуется на жажду, и даже отвергаетЪ пойло. Его умЪ занимается только тѣми предментами, кои поразили его на канунѣ его болѣзни; иногда погрузившись въ глубочайтее молчанте, встаетъ онъ вдругъ и кажется бѣшенымъ.

(У больнаго безпрестанной бредв; кротчайший человькы дылается вздорливыйшимы; оны часто сскакиваеты сы постели; то оны кричиты, то поеты; отвыты его безалаберны, такы какы и вопросы. Глаза его вертятся какы бурколы; руки его дрожаты; оны ловиты мухы; выдергиваеты изы одылы набивку. Мота, естьли не остановилась, то бываеты свытла, и вы такомы случаь весьма худое предозначаеты.)

Безпрестанное дрожаніе, припрышки тендиново, Признана остановка моги, упорная безсонница, непрерывная пер-опасные хота, скрежетаніе зубово, которое должно почитаемо быть видомъ корги, суть опасные признаки.

Котда сумазбродство приключится послё воспалеміл легкихв, или кишокв, или горла и проч: то оно вообще емертельно; потому что оно причинено переходом в соков в св сих в частей на мозгв. Отсюда то происходить нужда в выпоражниваніи во всёх в воспалительных в бользнях в и опасность от вогнанія соков в внутрь.

Благопріятивний признаками суть испарина, или Признани пото свободной и обильное кровотегеніе из в носа, прівтные.

Е е 3

потетуй, мога въ великомъ количествъ, оставляющая на днъ много подсъда. Иногда сіл бользнь кончится поносомо, а у женщинъ кровотегеніе по изъ дътородныхъ частей болье или менье великимъ.

Сія бользив Как Б сїя бользив часто кончится смертію требуеть в немногіс дни, то требуеть величайтей носпыти нособій. ности в в предписаніи лькарств В. Ежели она продлитимя чего ся, или худо пользована будет в, то часто превращаєтся в в умопомізтательство, или в в нькоторой род в дурачества, остающагося на весь в в к В.

Прежде дальныйшаго чтенія читай главу і и 2 сего Тома.)

\$ 3.

Пищеупотребление и себя содержание, кои надобно предписывать внавшимо во сумагородство или ев воспаление мозга.

Канія суть Пользованіе сумазбродства представляєть два поназанія, показанія, наппаче заслуживающія наше вниманіе, т. мыв предетавляе- е. уменьшить количество крови, находящейся въ мозмыя? гу, и поудержать быстроту сей жидкости въ сосудцахо головы.

удалять Больному надобно быть въ величайшемъ спокойотъ боль- стви: камнания, шумъ, все, что можетъ поразить наговсемотущее его чувства и помутить воображение, отягчаетъ сио бопотрево- лъзнь, даже излишний свътъ вреденъ; въ слъдствие жить; чего комната больнаго должна быть нъсколько темна, держать ни въ из-

мищиемъ Однако не надобно доходить до того, чтобъ тепат, ни больнаго лишать бесёды съ пріятнымъ ему другомъ, немъ холо- могущимъ рвзвеседить и успокоить его духъ; также дъ, не надобно держать его въ очень глубокой темнотъ, раз есе- дабы она не повергла его въ черную меланхолію, ко-

торая и безъ того часто бываеть слъдствить ней вы излащению бользни.

Надлежить, сколько возможно, развеселять боль- ть, ни въ наго, угождать ему во всяких случаях в. Противо- темнот в. рыче оскорбить его душу и отягчить бользнь. Даже непротиво въ таком случав, когда онь будеть просить невоз- рычть, но можных вещей, или вредных в, не надобно ему отказывать на отрызь; напротивь же того надлежить ему то, поблажать ему объщанием оных в, как в скоро получены бучто издуть, или приведением других в извинений. Больному вредным восколько им в желанной вещи, нежели когда совсываему отказано будеть.

Крашко, надобно употребить все то, что нанонент его забавляло тогда, когда онб быль здоровь: почему употренадлежить ему разсказывать забавныя исторіи, играть что его въ музыку, употребить все то, что можеть льстить забавляло его страстять и удовлетворять его душт. Боергавь въ состоя по поводу сего предлагаеть многіе способы, какь то, ніи здраповодить небольшой шумь, пуская воду капля по каплт въ таль въ тазь, и побуждая больнаго, чтобь онь считаль разы ударовь оть каплей и проч. Одноголосной тонь, ежели будеть прінтень и непрерывень, можеть навести сонь, и слъдовательно сдълаться полезнымь.

Яства должны быть легкія, и наиначе составля-каніл долемыя из в мучных веществ В. Панадо, подслащенной жны быть смородиннымо желеемо, или лимоннымо сокомо, кашица, печеные перед вогнем в или в компотахо плоды, желей, конфекты и проч. пригодны.

Питіе должно быть слабое, мокротожи дительное и прохла дительное, как в то сыворотка, ягная вода, или декокто из в ягменя и тамариндово. Гамаринды делают в сте пишье не токно пртативащимь, но еще полезнайшимь; потому что они послабляють.

\$ 4.

Привод, кои на добно предписывать больным внав-

выгоды

выгоды

выгоды

выгоды

выводы

вывод

Когда сте кровотегенте само от в себя не случитпроизвести впущентем в вы коздри соломины, или другаго какого раздражательнаго тыла.

кровопукровопусманіе из облегчаеть голову; но как обстоятельства не всемейных разволяють производить сію операцію, то мы
совьтуемь кровопусканіе из шейных жиль.

(Кросопусканія, необходимо нужныя въ семъ случат, производимы быть долженствують только искусными руками: и такъ мы совътуемъ даже и тъмъ, кои привыкли отворять кровь, каковы суть цирюльниники, никогда къ онымъ не приступать, а препоручать дъло искусному Хирургу.)

Когда пулься и силы больнаго шак в упали, что тельства, он в не может выдержать провопускания ланцетом в мои требують то надобно припустить пілецця к вискам в не вільнув нь только высасывают в кровь по степенный сразмырвискам ности, но еще, будучи очень близко припущены к вольному мысту, вообще скорье облегчают вольнаго.

Потетуйное тетение шакже весьма полезно: Для Важность произведенія онаго всячески надобно стараться. В поче-Ежели больной подвержен был в потетую, и сте вы- шечени. поражнивание остановилось: то надобно употреблять всь мьры для вызванія его.

ВЪ следстве чего надобно кЪ задиему проходу Средство припустить пілвицо, посадить больнаго на паръ теп произволой воды, наставлять раздражательныя пролыванія, піввицы, вставлять севги, составляемыя из в меда, алое и бу раздражазуна (2).

промыва-ВЪ случав, когда сїя бользнь причинена бываеть нія, свычи. остановкою какого нибудь выпоражниванія как в есте надобно ственнаго, такъ и искуственнаго, какъ-то мвсяс- остановивныхв, прижиганій, щетинв и проч. надобно вызвать сін шімея вывыпоражниванія, сколько возможно, скорье, или на мь-пражниванія, или сто оных в поставить другія. вмвсто

Живошъ надобно послаблять острыми промыва- ихъ савиї ями, или сильными тистительными. Надлежить пред-гізписать селитры по малымъ приемамъ, но часто при-послабнимаемымъ; ее должно давать распущенную въ пить жи-Jones II. боль- мываніями, Жж

вошь про-

⁽²⁾ Для составленія эдісь упоманутых в собув надобно взять отдирокь тельными тряпицы, или пристойное количество жлопчатой бумаги, или малинь и пр ч. кую грушу величиною въ меньшой палецъ, или ребрышко капусты и проч, запасшись напередъ медомъ, въ которой распущены алое и вузунь. Вь семъ составъ надобно обмачивать во многіе пріємы ту или другую вещь. Когда тряпина или бумага изсколько высохли и получили некоторую твердость, то надлежить ихъ скатать шакимъ образомъ, чтобъ одинъ конецъ быль пошире, а другой поострве. Что касается до ребрышень напусты, малиньких в грушь и проч: то имъ предписанъ особенной образецъ.

Сін собчин, длиною въ два дюйма, вставливаются въ задній проходь. Надобно еще сделать ту предосторожность, чтобъ привязашь кЪ концу собчекь, которой наружь, понинькой счурокъ или двь ссученныя нишии. Сей снуронь оставляется наружь, дабы, когда антиперистальтическій движеній кишокь втянуть свічи вовнутрь, то бы можно было ихъ вышащить посредсивомъ сего снурка.

обрить го- больнаго. Можно ее предписывать по двѣ драхмы, ж мову боль- даже болье, на сутки, ежели будеть крайность.

опрыснивать ее день тереть ее теплою смъсью уксуса и розовой воды. класть но- КЪ вискамо надобно прикладывать обмоченныя въ сей вы теп- же смъси салфетки.

мую воду, пострен Ноги его надобно опустить въ теплую воду, и мую укеу-покрыть ихъ катаплазмами изъ мякища хлѣба и моло-еомъ, и предписы-вать цъль-прибавлено будетъ въ воду нѣкоторое количество ныя бани. уксуса, такъ какъ мы совѣтовали въ главъ 4, ∫ 3 сего Тома. Надлежитъ не позабыть положить воду въ глубо-

кой сосудь, такъ чтобы она доставала до кольнъ больнаго, естьии только можно. Надобно еще посадить больнаго въ цъльную баню (въ ванну по горло); а когда сумазбродство произошло отъ разръжентя крови и излишняго оной прилива къ сосудцамъ головы, то водъ надобно быть болье холодной, нежели теплой. Въ сихъ то также случаяхъ великте практики прикладываютъ льду къ головъ сумазбродныхъ, пустивъ напередъ кровь изъ ноги.)

Ежели бользнь савлается упорною и не усту-Обстояжельства, пить симь лькарствамь, то надобно покрыть всю гонои поналову нарывными. Прикладывание нарывных требуетъ зываюшъ марывныя. великой осторожности. КакЪ надобно воздержаться при пользовании сумазбродства от всякаго лекарства влкаго и раздражательнаго: то надобно опасаться, чтобЪ шпанскія муки въ большомъ воспаленіи мозга или его оболотеко не придали большей напряженности корти волотей, не умножили бреда и не причинили кортей: это мивніе Гофмана и Багливія. Сей последній утверждаеть, что онъ, будучи въ Римъ, видълъ мущинъ болве умершвленных в, нежели спасенных в нарывными; но что они спасительные и безопасные были женщинамъ.

И такъ мы думаемъ, что нарывных должны предоставлены быть до сумазбродство, въ коихъ воспаление обологеко мозга не велико, и кои зависять отъ скопа грубыхъ соковъ въ сосуднахо сего герева. Они приличны еще тогда, когда надобно вызвать наружу какую нибудь ушедшую внутрь высыль.)

ГЛАВА 18.

O различных видах воспаленія глаз или о глазной бользни.

(Глазнал бользив можеть быть бользнію существенного, т. е. напасть на кого нибудь такого, которой никакой другой бользии не имветь; а иногда она бываеть симптоматитеского, т. е. слъдствіемь аругой какой нибудь бользии, какь-то венеритеской, золотуки и проч: почему сія глава и раздыляется на два параграфа. Мы начнемь сь глазной боли существенной.)

§ 1.

(О воспалении глазб или бользни глазб существенной.

ВЪ сей бользни одни только оболотки глаза, наи-Тивзко сей паче же былкован, поражаются воспалениемо, такъ что бользни оно, такъ сказать, есть только внышняя бользнь глаза, не перемыняющам существенно сего орудия такъ, какъ темиая вода, внутреннее, быльмо и проч. кои суть настоящия бользни орудия зрыйя, и о коихъ мы будемъ толковать въ Томы III, въглавы 46, у г. Совсымъ тымъ воспаление глазо часто бываетъ опаснымъ; оно иногда нортить сте орудие, какъ-то мы ниже сего увидимъ)

ЧЛЕНЪ

ЧЛЕНЪ І.

Причины воспаленія глазв существеннаго.

Воспаление глазо можеть причинено быть причинами внышними, какы-то ударами, соромы взошедшимы вы глаза и проч; оно часто приключается оть остановки какого нибудь обытайнаго выпоражнивания, оты неосторожнаго лычения какихы нибудь старинныхы вередово, оты престания течения изы какого нибудь прижигания, или остановки легкаго утренняго пота, пота на ногахы и проч.

Долговременная ходьба или стояніе во время росы, а особливо когда холодной вѣтръ дуетъ съ съвера; внезапная остановка испарины, а наипаче сгоряча, суть также причины, весьма удобно могущія произвести сію бользнь.

Глядъть долго на снъгъ, или другія очень бълыя тъла, пристально смотръть на солнце, на свътлой огонь, или на другой какой блестящій предметъ, вытти внезапно изъ глубокой темноты на блестящій свътъ, равно суть такія дъла, кои могутъ причинить сію бользнь.

Но ничто такъ удобно не можетъ произвести соспаления глазв, какъ бдъние, а особливо читание, или инсание за сальными, или восковыми свъчами.

Неномърное унотребление спиртных в напитков в излишество въ любовномъ плотоугодии, также доводять до воспаления глаз в. Вдкой дымъ, выдетающий изъ обработываемых в металлов в накоторой род в курения, и менитические пары нужниковъ, равно ихъ поражаютъ.

Иногда воспаление глазб зависить оть венеритеской порти (Французской срамной бользни), часто оть оть золотухи, или оть подагры; оно еще можеть произойти оть ръсниць, которыя, взошедши внутры глазь, ихь раздражають.

ВЪ другихъ случаяхъ оно есть бользнь поваль-оно иногда ная, наиболье свирынствующая посль дождливой пого-бываеть бользнію ды. Я часто примьчаль, что оно дълалось прилипти-повальною вы из, а особливо для шьхъ, кои живуть въ одномъ и зарази-домъ съ больнымъ.

Оно еще пристаеть къ тъмъ, кои живуть въ кто нандомикахъ низкихъ и сырыхъ, или кои дышать воздукомъ мокрымъ, а особливо когда они не привыкли къ
такимъ жилищамъ. Сте воспаленте равно пристаетъ къ
дътямъ, у коихъ неосторожно подсушена была паршивость или короста на головъ, теченте изъ ушей,
или другое какое нагноенте сего рода. Наконецъ воспаленте глазъ часто приключается послъ оспы, или
кори, особливо же между младенцами, имъющими расположенте къ золотухъ.

членъ п.

Признаки воспаления глазб существеннаго.

Воспаление глазо соединено съ острою болью, жаромъ, краснотою и опухолью сихъ орудий. Больной не можеть сносить свъта; онъ чувствуеть то колющую боль, какъ бы глаза его укалываемы были спицею, то кажутся ему они наполнены маленькихъ черныхъ точекъ, или видить предъ собою летающихъ мухъ. Глаза его омочены жгучею влажностю, обильно истекающею, какъ скоро посмотрить онъ вверхъ.

Пулься вообще скоря и жестока: есть нъсколько и лихорадки; когда бользнь сильна, то ближнія части распухають и въ висотных артеріях чувствуется нарочитое біеніе и проч.

Ж ж 3

Ko-

Когда воспаление глаз легко, то удобно на выпользование, а особливо когда произошло от внышних в причинъ.

Послва. Но когда оно сильно и продолжается съ давняеты вос- го времени, то часто оставляеть на глазахъ пятны; глазъ, но- оно потемняеть зрън и часто доводить до настоягла оно щей слъпоты.

Благопріяшные иризнани.

Когда у больнаго легкой поносо, то это доброй знакь; и когда также воспаление переходить съ одного глаза на другой, какъ бы по прилипсивости, то и это не худой знакъ.

Непріятвые признаки. Но когда бользнь соединена съ сильною головною болью и она упорна, то надобно опасаться, чтобъ больной не лишился эрънія.

(Прежде дальный шаго чтенія читай главы і и з сего Тома).

ЧЛЕНЪ III.

Пищеупотребление и себя содержание в воспалении глазв

Діэта, естьли только воспаленіе не произошло от золотушной порти, не можеть быть слишкомь строгою, а наипаче въ началь больной должень воздержаться от всего горятительнаго.

канія дол- Сладкія расшенія, слабые бульюны, овощи въ жим бышь овсяной кашицъ, сушь единсшвенныя ясшва, въ сей бользни приличныя.

Питье должно состоять из в ягной воды, или из настоя сб мятого, или обыкновенной сыворотки.

Надобно Комната больнаго должна быть темна, или глаза боль- глаза его закрыты какимъ нибудь покрываломъ, наго при недозволяющимъ свъту въ оные ударяться; однако такъ,

такъ, чтобы оно не прижимало глазъ. Онъ долженъ от велопасаться глядъть на свъть восковой или сальной наго свътевъчи, на огонь, или на другой какой блестящій предпредмета, меть. Надобно еще ему укрываться от всякаго вистъ всяка. да дыма, какъ-то табачнаго и от всего того, то дыма и что можетъ заставить его чихать, кашлять, или блевать.

Надобно держать его въ совершенномъ поков и надобно употреблять вст усилтя къ тому, чтобъ онъ не ис-быть ему пытывалъ никакого сильнаго движентя какъ въ душт, н тъломъ такъ и въ тълъ; наконецъ надлежить ему, сколько и духомъ. возможно, не сопротивляться сну.

ЧЛЕНЪ IV.

Пвкарства, кои на добно предписывать больным в имвющим в воспаление глаз в существенное.

Стя бользиь есть из исла тьхв, вы коих на-вными ружныя лькарства часто бывають весьма вредными. Аткарства часто бывають весьма вредными васто бывають весьма для изльчентя глазных бользней: лькар- жые вресства, кои вообще суть только что коллирти, мази ны, нежеми другтя наружныя приклядывантя, которыя, удавные и другтя наружныя приклядывантя; по-

Кровопусканте всегда нужно, когда воспаленте кровопуглазб сильно. Надобно его производить, сколько воз- снаніе въ
можно, ближе къ больному мъсту. Изъ взрослаго можно; гдъ
но выпустить отъ десяти до двънатцати унцій крови изъ шейной жилы, и повторять сїє кровопусканте, дълать:
глядя на усиліе признаковъ. Ежели найдено будеть неудобство въ выпущанти крови изъ шеи, то надобно

выпустить такое же количество оной изЪ руки, или Аругой части тъла.

Польза отъ піввиць, припущен. ныхъ къ виснамЪ или вънамЪ.

Часто припущають піленця къ вискамв, или къ нижнимъ въкамъ съ великимъ успъхомъ. Въ такомъ случав надлежить оставить кровь течи изъ ранотекв чрезЪ нъсколько минутъ; и ежели она скоро остановится, то для произведенія большаго теченія прикладывающся кЪ тому мъсту обмоченные вЪ теплую воду компрессы, вивсто коихъ могутъ употреблены быть салфетки. Ежели воспаление всю не проходить, то надобно повторить стю операцтю насколько разъ (1).

Мокротожи дительныя и послаблятельныя лъкар-Важность въ моетва ни подъ какимъ видомъ не должны быть опукр пожискаемы вЪ сей бользни. дишель-

и бхин И такъ больной долженъ чрезъ каждые два или послаблятельных три дни принимать по небольшому пріему глауберовой соли и виннаго камия, или декокта изъ тамариндовб лънарствахЪ. и александрійскаго листа. Ежели находить онь сій Приличныя елабитель- лекарства противными, то небольшое количество ревеню и селитры, нъсколько послаблятельного электуаріа, Mbis. или другое какое тистительное легкое, выполнять то же показание.

Предпо-Вольной долженъ въ то же время обильно пить Amame APовсяной воды; таго, сыворошки, или другаго какого нъйшія мокрото- мокротожи дительного питія слабаго, и всякой вечерь, жидитель- ложася спать, по большой рюмкъ сыворотки сълегкимъ виномЪ для возбужденія испарины.

Ноги

способъвы. личество крови пія-

улебной (1) часто случается, что піненцы не сосуть болье крови; петому что онв налимись, и такъ стпадають. Ежели будеть нужно следать гуенать простое средство, а иманно: стръзать у пінский ножницами конецъ квоста. Кровь, ими етливаемая, будеть чрезь сіе отгерстіе уходить; и по мерь, канъ онв находить себя будуть тощими, то стануть опоть наливать вицами. ся, высасывая опать кровь изв частей, ив ноимв приложены.

Поги и голени надлежить ему почасту на дни умовена ногъ.

опускать вЪ теплую воду.

Толову надобно ему выбривать два раза или три надобно въ недълю и тотчасъ вымывать ее холодною водою. рить голомы уже видъли, что сте лъкарство часто произво- ву имыть дитъ добрыя дъйствтя и примътнымъ образомъ.

Ежели от сих в лакаретв воспаление не прой-когда и детв, то надобно приложить нарывныя кв вискамв, гат надобнили за ушми, или кв затылку, и содержать чрез в на дывать на сколько времени истечение посредством укрощенной рывныя: нарывной мази (2).

Я никогда не видываль, чтобь, когда ихъ про- Они обындолжали прикладывать чрезь довольное время, не разулаются,
гоняли они самаго упорнъй паго воспаленія глазв; но ногда ихъ
для достиженія до сего, часто нужно бываеть дер- чрезь
немалое
жать истеченіе сте чрезь нъсколько недъль.

время

Когда бользнь ведется съ давняго времени, то держать. получаются истинно необычайныя дъйствія отъ ще- темины, продернуной на затылкь, между лонатками, а въ сей особливо на семъ послъднемъ мьсть (*). 6ользни.

Продергивать (т. е. подпускать за кожу) ее продергиналобно вдоль спины между двумя лопатками; пере-вать и вязывать же два раза въ день съ приложентемъ желтой перевязымази базилика (vngventum flavum bafilicum). Я ви-вать больныхъ ослъншихъ съ давняго времени, которые возвратили зрънте посредствомъ щетины, положенной упомянущымъ мною образомъ.

Когда щетина пропускается поперет в шен, то скоро очень затворяется, да и бывает в бользненный шею Томв II. 3 з

(*) что такое щетина, о семъ толкуется въ пятомъ томъ подъ словомъ щетина.

⁽²⁾ Т. е. мазь, въ ною входить менте шпанских мухь. Вмтсто оной можно употребить мази вазилина (vnguentum basilicum), которзя поощряется порошкомь сихъ самихъ мухь, а кладется болье или менте, по степени дъйствительности, каковой желають ей прядать.

и досадивншею, нежели когда кладешся между лопашками вдоль; а впрочемь она оставляеть по себъ непріятной знакъ, да и менье выгоняетъ матеріи.

что надобно шогда двлашь, и боль ма велини?

ВВ случав, когда жарЪ и боль вЪ глазахЪ будуть очень велики, надобно приложить къ симворукогда жарь діямв катаплазму изв мякиша хлеба и молока, смвшанную съвесьма хорошимъ Прованскимъ масломъ, или глазъ весь- съ свъжимъ коровьимъ масломъ: по крайней мъръ надобно ее приложить на ночь, а поутру глаза промыть теплою емъсью изъ воды и молока.

- Ежели больной не можетъ уснуть, такъ какъ Обстоятельства, часто случается, то можно сму дать въ вечеру пятнатцать или дватцать капель лаудана (3), или двъ зываюшъ ложки діакодіева сиропа, болье или менье, глядя на сношворныя. возрасть больнаго и усиліе припадковъ.

Послѣ того, какЪ воспаление прошло, то, ежели Средство унрвплашь глаза слабы и зрвнее нвжно, надобно промывать ихъ глаза послъ того, накъ повечеру и поутру небольшимъ количествомъ провосналение хладной воды и водки, полагая одну часть водки на прошло. шесть частей воды. Надобно постараться вымыть весь глазъ есю смесью, и держать его въ оной чрезъ несколько времени. Я, вообще сказать, ничего не нашель, чтобъ

предостнорожностію надобно ихЪ предписывашь?

СЪ накою (3) Предписываемый здъсь Г. Буханомъ пріемъ есть сильнъйшій, наной шольно можно вдругъ дашь на сіе ленарешво. Мы уже показали, съ наною предосторожностію надобно предписывать антисмаэмодическія; сіи предосторожности наппаче касаются до наркотических в или льиаретвъ, въ кои входитъ oniymъ, которой есть основаниемъ сего (лаудана). "Извъстно, говоритъ Г. Ліетодъ, что всь наркотическія , явкарешва, кои многі: авкари во эло упетребляють, всегда бывають ,, опасными, когда употребляются безъ разборчивости и долгое время. ,, Правда, они доставляють скоропреходящую тишину, которая иногда , бываеть весьма драгоцина; но они м гуть покрыть зависою боэ, ятань, и прикрывъ ее маскою, часто сдтлать страшитишею. Добрые ,, практики замътили, что множество больней, кои бы кончились безъ-, незузетных в последеный, отв элоупотребления сихв лекарствв сле-, лались жестокими и даже смершельными.

лучше укръпляло глаза, какъ сте лъкарство, или какъ вода и уксусв, и можно ихв почитать столь же способными укръплять глаза, сколько самые хвалючнъйшіе коллиріи.

Надобно почаще осматривань глаза больнаго, да-осторожбы примътить, не загнулися ли какія нибудь ръсни-ность, коцы внутрь, и не колють ли онь ихь: ежели такь, должно то немедленно надобно ихъ подстричь. (Когда воспа- имъть во ление произошло просто от удара, полученнаго въ всякомъ тлазъ, то довольно больному пустить кровь одинъ воспаления или два раза, глядя на силу воспаленія, и прикладывать кв глазу разбивательных катаплазмовв.

Когда воспаление прошло, то надобно протирать глаза напоенными теплымъ виномъ компрессами, въ кое прибавляется нъсколько капель коммандора бальзама, и по томъ сін компрессы оставляются привязанными на оныхЪ.) Оно упор-

но, когда проискозохошухи.

О вогналении глазб симптоматическомб или произше д-дить отъ шемв отв другой вользии. Діэта и

Когда воспаление глазв происходить от в золоту-питье въ -семЪ слу-

хи, то оно обыкновенно бывает в упорным в (4). ВЪ семЪ случав дізта больнаго должна бышь не то, что столь строга; ему можно позволить пишь насколько говоришся слабаго негуся, или время от времени немного ви-затев о на, смъщаннаго съ двумя претьми воды.

глазной болъзни, зави-

При- сящей отв золошухи,

Надобно сказать восбще, что никогда не можно вылачить сего чеснимъ рода глазной волбани, естьли папередъ не выльчена будеть та бо- воспаленіабзив, от ноторой сія глазная произощла. ямь глазъ.

⁽⁴⁾ Ежели Г. Буханъ береть завсь въ примвръ симптоматического должно еоспаленія глазь що, которое происходить оть голотуки, що сіє по относить. той причинь, что оно чаще бываеть сатаствіемь сей посабдней больз- ся но ни, нежели накой другой. Но то, что онъ здёсь говорить, равно дол- всёмь дружно относиться къ той глазной бользни, которая зависить оть пода-гимъ симгры, венерической колбани и проч.

хина есть Пригоднъйшее лъкарство есть хина, которую пригоднъй можно принимать въ существъ, или приготовленную нее аъкарслъдующимъ образомъ:

Возьми наилучшей жины, - - - унцію, Корки былой корицы, - - - двы драхмы;

По Лашынь:

Recipe optimæ chinæ, - - - vnciam.

Corticis cinnamomi albi, - - - drach. duas-

способь ее Истолки все это вы порошокы; вари его вы изготовдвухы фунтахы воды, пока останется одины только фунты; прибавь мёлко изрёзанной солодки полунцію; оставь настанваться на полчаса; процёди.

пріємъ. Сей жидкости надобно больному давать три или четыре раза въ день по двъ, по три или по четыре ложки въ день, болье или менье, глядя на возрастъ больнаго.

Надобно Не льзя сказать, чрезъ сколько времени наупотребдобно продолжать употребление сего лъкарства; явть ее чрезъ дол. потому что у одного человъка выльчение отъ онаго гое время. можетъ послъдовать скоръе, а у другаго долъе: но вообще надобно его употреблять долгое время, естьли желательно, чтобъ оно произвело прочное дъйствие.

Минераль.
Ной зойоно (athiops mineralis) развъ ръдко не выльчирожности, ваеть упорнъйших воспалений глазо, даже тъхв, кои
съ нановы- произошли от в золотухи, ежели принимаем вудеть
ми надобно по приму и чрезъ приличное время. Въ том сомнъвывать вашься не льзя, что сте лъкарство и другтя приугонанъ его, товлентя изъ меркуртя могуть быть особенно полезнынъ и всъ
ными въ упорных воспалентя го глазо; но они никогда
другтя
меркурт не должны быть предписываемы, какъ развъ съ велиальныя чайшею предосторожность, или Лъкарями.
пріуготовъ-

женія.

\$ 3.

Средства предохранять себя отб воспаления глазв.

Люди, подверженные частымЪ возвратамЪ сей прижига. бользни, должны носить безсмыно прижигание на ка-ніе. комЪ нибудь плечь.

СверхЪ того весною и осенью должны отво-крозопурять себъ кровь и принимать систительное. сканіе и прочищеніе

Они должны наблюдать строжайшую діэту, весною и как Б-то воздерживаться от в крипких папитков и все-осенью. Строгая го могущаго разгорячить, а наипаче остерегаться от в діэта. росы, просиживанья ночей за картами, за бумагою, или чтепіем (а).

ГЛАВА 19.

О жабв,

Г. е. о воспалении горла; о бользиях дантоновоогненных в горла, или о злотворной жабь; о простой жабь или ненастоящей.

Имя жабы дано всякой бользни разных в частей что ознагорла, которая затрудняеть и препятствуеть или бу: дышанію, или глотанію, или и тому и другому изь сихь работв вдругь; однако такь, что гньздо боли находится внь желудка и легкихь, а выше сихь геревд.

Сїя бользнь описана у сочинителей подъ множе- врачи обые втвомъ различныхъ именъ; но, говоритъ Г. Ліетодъ, иновенно сіи варварскія имена суть паче школьное педанство, котъ сію нежели рычь практиковъ. Довольно знать, что упо- бользнь ги-

⁽а) Поелику простой народъ обынновенно бользив сію льчить почіни только коллирінми или прамочками, то мы описали въ V Томъ подъ словомь коллирій ть льнарства, которых наиначе одобрены суть.

требительный шее у Врачей слово, означающее стю болызнь, есть ангина (angina).

S I.

О восналительной жабь.

вь кото- Сія бользнь весьма обыкновенна въ Англіи и рую пору часто соединена бываеть съ опасностію; она часто она часто и кто оной случается зимою и весною, и люди, для коихъ она болье под- пагубница, суть молодые темперамента многок роснаго. вержень?

Гибздо воспалишельной жабы.

(Тньздомы жабы можеть быть каждая изы тькы частей, кои совокупно составляють то, что называется горломы иля гортанью, какы-то лякоть неба, язысеко, миндалины, отверстве дыхательного горла, покрытка его, самое дыхательное горло, корень языка, пищепрвемное горло и проч. Иногда она пристаеть кы одной только части; но чаще ко многить вдругь: оты сего-то произошли различные виды воспалительных жабо, толико размноженных у сочинителей, кои суть только разности той же бользни, всегда опасной и часто смертельной; но которая таковою бываеть болье или менье, относительно кы части и числу частей, ею поражаемыхы.

Гивздо сей бользни не всегда открывается, ко-Канъ поступать гда только растворяется роть у больнаго. Надобно для узнаноступить подалье; надобно поприжать концемь ложнія гитада ки корень языка, и взявЪ свѣчу, разсматривать и просей бользникать, сколько возможно, подалье. Часто даже сте Часто разразсматриванте, чинимое съ величайшимъ старантемъ, сматриваніе ничего ничего взору не представляеть; что подало поводь къ великому разлъленію жабы на шу, въ коей опуне представляеть холь видна, и на ту, въ коей опухоль не видна: и взору. стя последняя, начиная съ Иппократа даже досель, почитается смершельною от встх практиков Ъ.)

ЧЛЕНЪ

ЧЛЕНЪ І.

Раз Авление воспалительной жабы.

(И такъ мы надъемся привести всъ сти раздълентя въ слъдующте виды, означаемые каждой свойственными ему признаками.

- т) Когда воепаленіе пристаєть къ мышцовой знани первнутренней обологкь дыхательнаго горла, то жарь, ваго вида, боль и лихорадка очень сильны бывають; и ежели занимаю-воспаленіе не дойдеть до близь лежащихь частей, хательное то не возможно примътить опухоли, какь бы кто ни горлостарался. Но должно о ней подозръвать изъ усилія нами исчисленныхь припадковь: далье, голось бываеть острымь, и когда больной кочеть говорить, то слышится нъкакое свистанье; вамилите бользненно, часто и трудно, пулься маль и дрожащь и проч. Наконець смерть скорье или медленные приходить, по мърь того, какь близко воспаление подходить къ верхиему отверство дыхательнаго горла и къ покрывальщу его (т. е. къ тому мьсту, гдъ у нась лежить просто называемый кадыка.)
- 2) Когда воспаленте находинся въ ларшикст (възнани вног началь дыхательнаго горла) и мышцах глоттиса, то раго вида, больной находится въ величайтей опасности, чтобъ не у ноего удущился. Признаки ночти такте же, какте въ первомъ; еть начано наипаче оное означаетъ жестокая боль, когда боль ло дыханой хочетъ говорить или проглотить; голосъ весьма пельнаго горла. острой и дрожащтй и проч. Здъсь равно не возможно открыть опухоль: почему сей случай опаснъе всъхъ.
- 3) Когда воспаление касается мышицо костотки трети гои дной и служащих в къ принодниманию ларинкса, видь занито дышание довольно свободно; но проглатывание бо маеть мышум лазненно, а особливо при первомъ глоткъ. Сей слу-косточки

тіоняной и чай гораздо чаще бываеть, нежели два предыдущіє. маринка; Ежели воспаленіе касается только упомянутыхь нами частей, то не можно примътить опухоли: почему и опасно оно и по трудности въ проглатываніи, и по тому, что оть нето часто влажность упадаеть на легкія.

4) Ежели только один варинке (начало пищебы в фаринке, совтавляютей четдышанте котя довольно свободно, но проглатыванте
трудно и вскор в не возможно бывает в. Принятыя
яства назад выходят в ноздрями, падают в иногда
в дыхательное горло, и чрез то причиняют ужасной кашел в. Больной ни пить, ни всть не может в:
от в сего происходит в истощанте всего твла. Однако
когда благовременно больному подана помощь, то сей
случай не столь опасен в, как в прежде упомянутые.

5) Наконецъ, когда воспаленте пристало къ язытбы на ку, къ миндалинама, къ задней мягкой части неба,
ва минда- или къ его мышицама, то опухоль можетъ примътна
линахъ, на быть. Дышанте трудно; больной можетъ только дызадней ча- шать ноздрями; онъ не можетъ проглотить иначе,
сти неба, какъ съ величайтею болью; онъ харкаетъ безпрестанноторам но; онъ чувствуетъ острую боль во внутренности
етъ пътой уха, да иногда дълается и глухимъ. Когда нътъ лихорадки, или хотя и есть, да только мало, то сей
случай не опасенъ; но онъ весьма опасенъ, когда произошелъ отъ венерихеской бользии.

Извъстны еще два вида жабы. Первая называется кортного - паралититеского, потому что она происходить оть паралита огудій, служащихь къ глотанію и дышанію; но она еще можеть причинена быть и сывихомо одного или многихь позвонково шен.

6) Когла жаба произсшла от в первой причины, знаки жато дышание остается свободнымЪ; потому что мно- вы нерчжество мышиий, служащих в къ сему льйствию нату-стой видъ ры, находишся ниже гивзда бользни: по глотание крайнъ трудно, естьли только не невозможно. Сему подвержены полупаралитные. Нъкоторые больные умерли отъ невозможности что либо проглотить. фанъ Швитенъ повъствуеть объ одной сорокопятильтней женщинь, которая сидъвъ однажды за столомъ и наслаждаясь совершеннымъ здравјемъ, внезапно впала въ шакое безсиліе, что не могла ничего проглотить. Она не чувствовала ником боли, да и не примътно было никакой опухоли. Ей даваны были многія лекарства, кои ее не могли совство вылъчить. Въконцъ девятаго ићсяца вей еще у ней оставалась некоторая трулность въ глотании, а особливо какой нибудь жидкости; а развъ только проглатывала она вдругъ пять или десять унцій и съ жадностію. Ежелиже было меньше, и пила она по немногу, то не могла совстмъ пропускать вЪ желудокЪ питье.

Жоргная жаба, причиненная паралитель орудій дышанія и глотанія, требуеть лькарствь противь паралита, кой мы предложимь въ Томь III, главь 45, 53, члень II.

Другая жаба, происходящая от вывиха одного или многих вейных возвонков вейных весьма радка; потому что она всегда смертельна. У млиденцов могуть ее причинить корти, кои в простомы народы называются родилиом за у взрослых в сильные приступы терной немоги. Как в скоро трудность вы дышании и вы проглатывании покажуть стю бользиь, то надобно прибытнуть кы искусныйшим врачамы.

⁷⁾ Второй видь жабы, здёсь упоминаемой, на Знаки жазывается жабою кортион-улушающею; однако она са бы корчтой-улу-Ломб II. И и ма шающей;

седьмой и ма по себѣ не смершельна. Она весьма часто бываетъ посятдній слъдствіемъ истерики и ипохондріи, и лъкарства на нее тѣ же, кои приличны въ сихъ бользняхъ. Смотри Томъ III, главу 45, § 12 и 13.

ЧЛЕНЪ ІІ.

П ригины воспалительной жабы.

Она обыкновенно происходить оть техь же причинь, оть коихь прочія воспалительныя бользни; почему она и есть следствіеть остановки испарины, и всего того, что можеть разгорячить и воспалить кровь.

Воспаление горла часто происходить оть того, что забывають покрыть шею, естьли къ тому привыкли; что сгоряча пьють холодные напитки; что вздять на лошади, или расхаживаются противь холоднаго съвернаго вътра; наконець оть всего того, что можеть очень сильно простудить горло и ближнія его части.

Оно еще можеть приключиться оть опущентя кровопускания или другаго какого нибудь обычайнаго выпоражнивания.

Высокое пѣніе или чтеніе чрезь долгое время, и все то, что можеть нанести усиліе мышцамв горла, можеть также причинить жабу. Я часто видаль, что сія болѣзнь была пагубною гулякать, которые пробывь долгое время въ теплой комнатъ за бутылками, и пѣвъ пѣсни изо всей силы, выходили по томъ на росу неосторожно.

Мокрыя ноги, мокрыя также платья, лежаніе на сырой земль или подль отвореннаго окошка, лежаніе на сырой постели, житье вы нововые проенных в

меколхв, суть также причины могущіл нодать поводь кы сей бользни, такы какы уже дано знать вы Томь I, главь 12, § 3 и членахы оты оной зависящихь. Я знаю такихы людей, у коихы всегда болиты горло, естьли они хотя мало пробудуть вы нововымытой комнать.

Аства вакія и раздражательныя также могуть раздражить горло и причинить жабу. Сія бользнь можеть еще произойти от косточекь, или другихь острыхь вещей, остановившихся въ горль; от жгучихь вапоровь металлическихь, или минеральныхь, расходящихся по воздуху, какь-то мышьяковыхь, сурмяныхь и проч; наконець сія бользнь часто бываеть повальною и прилипсивою.

ЧЛЕНЪ ІІІ.

Признаки воспалительной жабы.

Воспаление горла узнается глазами, т. е. смот- Знаки рънйемъ. Больныя мъста дълаются красными и опух- предше- ствующие, далье, больной жалуется на трудность въ гло- тании; пульсб у него скорб и жестокб, соединенный со всъми другими припадками лихорадки (горячки)

Кровь, выпущенная изъ жилы, обыкновенно по- знаки крокрывается бълесою пластиного, а харкотина водяни- ви и карста или вязка.

По мфрф, как воспаление и опухоль усиливают признаки ся, трудность также вы глотании умножается. Боль утверливдоходить до утей: глаза кажутся красными и лицо раздувается. Больной принуждень бываеть только сидъть, бояся, чтобь не задохнуться; оны безпрестанно чувствуеть тошноту или позывы на рвоту, и когда пьеть, то птемая имы влажность часто не вы желудокы проходить, но назады выходить носомы. Наконець больной ча-

И и 2

cmo

сто умираеть съ голода от одной только невозможно-

жизые при чита, но ежели дышанте еще свободно, то не для чего много бояться. Когда опухоль покажется наружь, то это доброй признакЪ.

нещостине Дышанїе тяжкое, соединенное съ болью въ грувые при- ди, возвъщаеть великую опасность.

> Нътъ ничего столь опаснаго, говоритъ Иппократъ, какъ жаба, въ коей ничего спасительнаго не выходитъ наружу; и такъ тогда, когда окажется на затылкъ, подъподбородкомъ, или на груди жаба, или опухоль, то эти признаки возвъщають, что бользнь ихъ изъ внутренности вышла наружу.

> Но ежели эта опухоль, эта рожа вдругъ пронадетъ и уйдетъ въ грудь, то надлежить онасаться смерти, а особливо ежели больной не харкалъ.

> Когда жаба есть следствием другой болезни, которая уже привела въ слабость больнаго, то его сестояние тогда весьма критическое.

Больные, имъющіе жабу, но горло сухое и каркотины мало, находятся вЪ опасности. Надобно всего опасаться вЪ разсужденіи тъхЪ больныхЪ, которые, будучи вЪ жабѣ, не харкаюшЪ скоро созрѣвшею матеріею.

Пъна во рту, языкъ толстой, лице блъдное и смертные искаженное, суть смертными знаками.

Читай напередъ главы в и 2 сего Тома.)

ЧЛЕНЪ

ЧЛЕНЬ IV.

Пищеупотребление и содержание себя для тако, кои боль-

Пищеупотребление въ сей бользни должно быть по всему таковымъ же, каково описано въ колотът и воспалении легких выше, въ главъ 5, § 1, членъ III сего Тома.

Яства должны бышь легкими и даваемы по ма-канія доллому количеству; пишье должно бышь обильнымь, жиы бышь мок ротожи дительнымо, поощреннымь кислотами. пишье?

Весьма нужно содержать больнаго на свободь и Больной въ поков; сильныя страсти души и великія движенія колженъ быть въ тьла пагубны. Онъ долженъ говорить только въ полго-поков и то-

Когда больной лежить въ постели, то надоб-химть по головъ его быть приподнятой повыше противъ должна быть воветь вышела»

Паче всего нужно шет его бышь въ шеплт; по- что долмему около оной надобно обвершти свернутую во жно
иногіе ряды фланель. Это одно токмо средство, кооноло шен
гда оно благовременно было, часто разбивало легкія для содерболи горла. Мы не можемъ умолчать объ очень обыкжанія оной
новенномъ способт Англинскихъ крестьянъ: когда у нихъ въ шеплт;
болить горло, то обвивають около шен шерстяной
чулокъ, которой туть остается на всю ночь. Сте
средство толь спасительно, что во многихъ мъстахъ
почитають его шаманствомъ, и чулокъ прикладывають съ особенными обрядами.

Какъ бы то ни было, только надобно признатьея, что сте средство хорошо, и что никогда не надобно его опускать. Когда такимъ образомъ обернуи и 3

тая жел пробудеть цвлую ночь, то не надобно ее оставлять неприкровенную; но покрыть ее платкомъ или кускомЪ фланели, пока воспаление совсымЪ пройдетЪ.

Хорошія **дъйствія** ошъ смородиниаго желе.

Желе изЪ терной смородины почитается хорошимъ лъкарствомъ въ боляхъ горла, и заслуживаеть въ самой вещи сте одобренте. Для получентя дъйствія от сего желе, больному надобно безпрестанно имъть его во рту и по немногу только глотать. Его можно также распустить въ обыкновенномъ пишьъ больнаго, или давашь его другимъ какимъ нибудь образомЪ. Ежели не случится сего желе, то на мфсто его можно употребить желе из в смородины красной или шелковицв.

Выгоды способЪ его двдашь,

Полосканые въ сей бользни также весьма пригодотъ поло- но. Оно дълчется изъ небольшаго количества уксуса и меда въ водъ, или прибавляя на полфунта грудиаго декокта двъ или три дожки меда и столько же желе изъ терной смородины. Симъ составомъ ротъ полощется три или четыре раза въ день.

> Ежели больной мучится сязкими мокротами, то надобно поострить сте полосканзе кофейною ложечкою нашатырнаго спирта (spiritus salis ammoniaci).

> Иногда въ сихъ случаяхъ похваляется полосканые, дълаемое изъ декокта малинныхъ листовъ или корки; но когда кто можетъ достать какое нибудь вышеупомянутое желе, то листья становятся излишними.

Нътъ почти бользней, въ коихъ бы умовение ныя дъй- пого и голеней оказывало примътнъйшее дъйствие, какъ етвія от в в сей: и так в не надобно оных в никогда опускать. Ежели сЪ начала бользни больной держанъ бу-Средства деть въ тепль; сжели около шеи его обвернуть бупредупре**дешЪ**

деть кусокь фланели; ежели будеть онь у себя жазнь мыть теплою водою ноги и голени; ежели діэта бу въ сей 60-деть легкая, а питья мокротожидительныя: то сія въ сей 60-бользнь развь ръдко усилится, или не часто дълаться будеть опасною.

Но ежели пренебрежены будуть вст средства, то припадки усилятся и нужно будеть присигупить къ дъятельнъйшимъ лъкарствамъ (1).

ЧЛЕНЪ V.

Пекарства, кои на добно предписывать больным воспалительного жабого.

КакЪ воспаление горла есть бользыь весьма ос-когда и трал, весьма опасная и иногда похищающая больнаго откуда внезапно: то надобно, какЪ скоро примъчены будутъ пускать къ тому признаки, пустить кровь изъ руки или луч-кровь? ше изъ шейной жилы, и повторить сйю операцию столько разъ, сколько обстоятельства того потребують (2).

Ha.

⁽¹⁾ Канъ воспаление, естьли котя нъскольно будеть нарочито, препят. Важность ствуеть совсъмь, или затрудняеть глотание: то наружныя пособія наружвесьма важны въ сей бользии: и такъ съ самаго начала бользии не на- ныхъ лъдобно опускать ни одного изъ средствь, предлагаемыхъ сочништелемт: нарствъвъ надлежить употреблять фланель или чулокъ, не опускать полосканья, сей бользи умовенія ногь и голеней, за нои надобно приниматься три или че- ни. тыре раза въ день чрезъ полчаса, чрезъ три четверти часа, чрезъ часъ, такъ накъ мы предписали выше.

⁽²⁾ Снольно ни важно кровопускание въ сей бользии, однано не надобно разгуждеповшорять его неосторожно. Аецій точно утверждаеть, что Архигень ніе о
толь снорыжь и толь обильных вровопусканій въ жавь боллся, чтобь обильных в
оть того матерія не пала на легкія. Фернель и до него бывшій Трал- кровопуліань взвысили сіе разсужденіе. Я могу увырить, говорить Т. де Бор- сканіяхь
же, что я видыль кровопусканія разгонявшія боль горла и остановляв- и сильных в
шія харношину, но легкія посль засоривались.

[&]quot;Я говорю то не, да еще и хуже, о сильных в проносных в ныхв. " можно тольно разва изключить рестное.

Легијя прэжосныя.

Надобно также слегка послаблять животь. На сей конець надлежить больному давать вивсто обыкновеннаго пишья декокто изб виных в ягодо и тамариндово, или малинькіе прівицы ревеня и селитры, такъ какЪ мы совътовали въ рожъ. Пртемы надобно размърять съ возрастомъ больнаго и продолжать ихъ, пока произведуть желанное дъйствие.

Жорошія дъй нивія

Я часто видьль весьма хорошія дыствія оть оть мине-минеральнаго кристалла или пересищенной селитры,

кошо-

Поняние о × 28 ₺

Крашко, жава, въ высочайшемъ степени воспалительная, чаето не иное что есть, какъ сильное движение натуры, которая старается найти въ горяв проходъ, дабы чрезъ то освободить легиія и около лежащія части от в засоренія. За бурею иногда сябдуеть весьма благополучная шишина.

Сіе воспаленіе состоить въ засореніи сопляномь, мокротномь, и, такъ сказать, илетчатомъ. Мъсто, въ коемъ находится сіе засереніе, от в сильных выпоражниваний можеть остеть или опуститься; и сіс-то есть камень претыканія, упоминаемый у Иппократа, насательмо упадка жавы.

Рвотное , жанное благовре-MeHHo, MOжетъ бышь спаоншельно.

мы видбли, что Г. де Борде, охуждая сильныя и часто повторяемыя выпоражниванія, исключаеть реотное. Воть на чемь онь основывается: "Раотное, данное благовременно, во начало и посло перва-, го провопусканія, можеть отвратить препатеть естественному , жоду сей больни, и содъйствовать соэрвнію; сіе двло всв Ленари э могушь доказашь.

"Я помню, что въ месмъ малольнетвъ отецъ мей многократз, но подаваль шишину и возерищаль надежду цвлымь деревнымь, въ , конхъ повальная колбэнь горла преизводила ужаснъйшія опустешенія: , рестное было первымъ въ си и пособіемъ. Сіе лънарство въ сей болъэ, эни кажется мит пристейнтишимъ виду природы, нежели провопу. у сканіе и проносныя; оно опверлеть проходы менроты, харнотины , и влажностей, наводняющихъ роть и горло, ногда бользнь благопоэ, лучно кончишся ...

1744 и 1745 Года въ Беарнъ, моей отчизнъ, было много жавь, ств коихв многіе люди, а особливо двин умерли: я нви торыхь спась рестиымь даже изв числа твхв, нои находились в пр йности, 1745 и 1746 года была въ М нтиельт повальная жава, въ к ей больным весьма смело давали рестное, накого бы они возраста или мола ни были. Смотри le Perg de la Cloture, année 1770, р. 13.

которую больной держить во рту и проглатываеть по развате мврв, какь она растаеваеть. Сей кристалля произво- присталя или счидить выпоражнивание слины, а чрезь то замыняеть щенной сеполосканые, и вы то же время содыйствуеть кы умень- литры; шению лихорадки, носпышествуя отдылению моги. способь употребНадобно еще тереть горло больнаго два или лять ее.

Надобно еще тереть горло больнаго два или лять ее. три раза въ день небольшимъ количествомъ летусей чей мази. мази (linimentum volatile); что почти никогда не минетъ произвести доброе дъйстве (3).

Jones II.

Iï

To.

(5) Воть неноторой родь усполосвательного кальзама, ноторой, по сви- Рецепть детельству многих людей, авлаеть чудеса вы воспалительной жазы на успоносрецентомы онаго одолжены мы Г. Шомелю, ноторой вы traité des вательной plantes vinelles. Тоте III, раде 93 & fuiv изъясняется такимы образомы пластырь Сей видь кальзама сообщены мят однимы моимы другомы наны обнародосенреть семейства. Я видалы удивительныя оты онаго дыствія вы ванной Г. жазы и коляхы горла. Воть способы его составлять:

Возьми зеленых вистьев ввлены - деленых вистьев песьяго наыка по фунту.

Вари въ шести фунтахъ Французскаго вина дотоль, пона остаиется тольно четыре фунта, или около; процеди и выжми сильнее; прибавь въ этоть сокъ стольно же хорошаго деревнивато масла; вари все это на легномъ огнъ дотоль, пона останета тольно половина, старался, чтобъ масло не подгорело и не почернело; слей по томъ потихоньку въ муравленой горшокъ. То, что останется на днё сковороды, надебно обскоблить и смёшать съ вальзамомь, что въ горшне; по томъ простудить, и напоследокъ потихоньку перелить вальзамь въ бутылки.

Симъ вальзамомъ посредствомъ мягнаго перышка намазывают- Способъ ся жельзы горла послъ одного или двукъ кровопусканій, ескели онв упстребнужны. Сіе мазаніе, повторяемое чрезъ два часа, пособляеть подгное-лять егонію, часто случающемуся безъ сего лънарства въ девытый уже день, и выльчиваеть въ три дни опаснъйшую бользнь.

Остающієся подонки по слитін вальзама, такъ какъ сказано, не выбрасываются попусту, а дъластся изъ оныхъ пластырь съ равною частію растопленнаго на огит желтаго соска, каторой собершенно смъщивается съ подонками: сей пластырь очень сильно разбивает в

упомянутой *кальзамь* не токмо разбиваеть и утоляеть боль, но еще весьма пригодень нь ранамь и вередамь: я даже видъль отв него хорошія двиствія вы ломотахь и сціатической коли.

Тогда же надобно хорошенько покрыть шего Нужда въ добромъ шерстью, или фланелью, чтобъ холодъ не проняприкрытіи калъ сквозь кожи, которая особеннымъ образомъ умягшенчается от сих в прикладываній.

Есть много других в наружных в лакарствв, по-**ХВЗЛЮНЫЯ** явкарства, хваляемых в противъ сей бользни, какъ- то ластоткины но кои ничемь не енвзды, припарки изв жагры, называющейся Уудинымо лучше при-ухомо, изъ песьяго кала и проч; но какъ они не замарокъ изъ служивають никакого предпочтения противъ обыкномолока и венных в припарок в, составляемых в изв мягкаго хавмянища ба и молока, то и не будемъ болье объ нихъ говобвлаго живба. ришь.

Гваяновая Нъкоторые похваляють геаяковую камьды какы камбаь; собственно двиствующее лекарство прошив в сей бользни. епособЪ ИзЪ. оной составляется электуарій следующимъ обупотребразомЪ: вашь ее.

> Возьми гванковой камбли (дитті диајасі) въ порошкъ полдрахмы; сившай съ довольнымъ количествомь бузичнаго роба (гов fambuci), или съ смородинныма желеема для прикрытія сего порошка.

> Сей пріемъ дается за разъ и повторяется, глядя по обстоятельствамЪ. ДокторЪ ГомЪ.

воспалениях горла очень сильных в можно ВЪ нароdxidmur получить великую пользу от в нарывного, приложенные жабахЪ къ запылку, или за ушми; и когда бользнь будетъ над бно еще сильные, то надобно покрыть ими весь затылокы прилоошь одного уха до другаго. би вшине запылку

Сколько

времени

держашь мечение

нарывныя. По сняти нарывнаго нужно содержать течение изъ мъста, къ коему оно было приложено, посредствомъ поощренной мази, описанной выше въ главъ 18, въ примъч. 2 сего Тома, пока воспаление совсъмъ изъ раны ? пройдеть; потому что ежели рана подсожнеть, то больному надобно будеть опасаться, чтобь опать вы оное не впасть.

Когда жаба пользуется упомянутым в нами образом в, то ръдко случается, чтоб воспаление дошло до насноения; однако иногда случается при всъх в стараниях в для предупреждения онаго.

И такъ когда воспаление и опухоль всю остают что надобся, такъ что явно можно примътить, что послъ-но дълать; дуетъ насноение: то надобно пособить ему, впуская когда воспаление въ гордо больнаго посредствомъ вдыхальника или боль-довдеть до той воронки паръ теплой воды, прикладывая снаружи нагноения: млегительныя припарки, и приказывая больному держать во рту безпрестанно винную леоду.

(Нъкоторые жалуются, что эта лгода ихъ жжеть и умножаеть боль: почему вмъсто оной должны пить теплую воду, или теплое молоко, или теплую смъсь молока и воды, которую надлежить имъ держать, сколько возможно, подолъе. Иногда больному не льзя разинуть рта; тогда надобно впускать сти жидкости чрезъ ноздри.)

Иногда отверстве или прочкнутве парыва пред-канъ нашествуемо бываеть столь нарочитою опухолью, что лебно пизахвативь проходь вы горай, не даеть ничего проглотить. Вы семь случай оны непремённо погибнеть, гда не
естьли не будуть поддерживать его другимь способомь. льзя ему
Одно только остается средство спасти ему жизнь, а
имянно наставлять ему питательныя промыванія или
клистиры, состоящія изы бульюновь, кашицы, молока и
проч. Были примёры, что больные симь образомы питались чрезы многіе дни, пока лопнуль парыва, послів
чего опять они получали здравіе (4).

I ï

Сія

⁽⁴⁾ Ежели полько опухоль препятствуеть проглатыванию, то надобно узнать по мъсто, гдъ она находится. Ока иногда бываеть очень не вели-

что надоб.
Сія внутренняя опухоль не токмо можеть прено тогда
пятствовать глотанію, но еще и дышанію: въ семь
когда опу. случай спати больнаго можеть одно токмо вскрытіе
коль мб. дыхательнаго горла; и какъ сія операція, называемая
шаеть глобронхотомією, часто успётна была, то въ такихъ
отчаянныхъ случаяхъ никто не долженъ отлагать ни
одной минуты для произведенія оной въ дъйство. Но
какъ только Хирургъ можетъ оную делать, то безполезно оную описывать.

\$ 2.

О боли горла съ антоновымо огнемо и вередами, или о жабъ злой.

жабы извъстиве въ Съверныхъ чаоной подверженные,
и годовыя
времена,
въ нои она
времена,
въ нои она
волье подвержены, нежели взрослые, женщины болъе,
наше слунажели мущины, люди нъжные болъе, нежели сильные и плотные. Она особенно примъчается осенью,
или послъ сырыхъ и жаркихъ погодъ.

члень І.

Причины жабы злой или жабы св антоновымб огнемв и вередами.

Вараза. Сія бользнь примьтно прилиптива, и обыкновенно переходить от сообщенія. Одинь только человыкь часто сообщаль ее цылому семейству и даже цылымь

велика, котя нажется много безновонть больнаго. Щупая пальцемь, можно ее удобно насти; и ногда она созръла, то мальйшее давленіе пальцемь ее прочинаемь. Ежели она не прочинается оть легнаго давленія пальцемь, то разумной Хирургь прочинеть ее ланцетомь, наставленнымь на палочну, и покрытымь посредствомь тонинькаго полочна по всему пространству, выключая только кончикь.

жымъ деревнямъ: и такъ надобно стеречися отъ разговоровъ, или стоянія подлѣ больнаго сею болѣзнію человѣка; потому что отъ сей неосторожности не мокмо свою жизнь можно подвергнуть опасности, но и своихъ друзей и знакомцевъ.

Все, что можеть причинить лихорадки гнилыл и всв причизлыя, можеть равно произвести боли горла сб антоновымо огнемо, какь-то нездоровой воздухь, испогнилыхь
ртивштеся съвстные припасы, неопрятность и проч.
что показано въ главъ 9, § г сего Тома.

члень и.

Признаки жабы св антоновымв огнемв и вередами.

Стя бользнь начинается то жаромь, то озно-признани бомь. Пульсо тасто, но концентрировано и неровено, и предшеобыкновенно остается таковымь же чрезь все теченте бользни.

Больной жалуется на великую слабость и тяжесть въ груди; онъ унылъ и готовъ упасть въ обмороко, естьли его посадять; у него есть тошнота, часто соединенная со рвотого или съ поносомо: но сти два признака обыкновеннъе бывають у дътей. Глаза красны и влажны какъ въ кори; лицо распухаеть.

Мога сперва блёдна и сыра, но она становит-обынювенся желтве по мёрё, как вользнь длится; язык вобы выше прина вообще влажен в, что различает в стю бользнь от вани у жабы просто воспалительной.

Ежели кто посмотрить въ горло, то увидить признаки его раздувшимся и весьма покраснъвшимъ; однако туть во внутже примъчаются пятны блъдныя, синія, пепеловидныя горларазсьянныя то туть, то тамъ; иногда видно только одно широкое пятно какъ муха, фигуры неправиль-

I i 3

ной,

ной, былоблыдное, окруженное кружкомъ весьма краснымъ. Сін бълесыя и синія пяшны скрывають поль собою толикое же число вередовб.

Особенные признаки

Особенной въ сей бользни признакъ есть разсей больз- цв в таніе или н в которой род высыпи, которая выходишь около втораго или третьяго дня на шев, рукакЪ, пальцахЪ, на груди и проч; но тогда выпоражниванте низомъ и верхомъ обыкновенно перестаетъ.

> У больнаго часто бываеть небольшой бредо; лице кажется весьма часто иссеченным в какъ бы лозою; внутренность ноздрей красна и воспалена; онъ жалуется, что у него во рту пахнетъ мерзко, и его дыханіе зловонно.

> (Голосъ у него охриплой и томной, но не такъ какЪ вЪ насморкахв, а такЪ какЪ вЪ венеритескихв вередахв горла, шакъ что изъ сего одного знака Врачи распознали стю бользнь, говорить фотержилль.)

Признаки, различаюпліе сію восналительной.

Жаба св антоновы мб огнемв различается от воспалительной жабы реотого и почосомб, соединенными жабу от иногла съ оною вначаль, свойствомъ вередово, покрышых вы былесою корою или синею, непомырною слабостію больнаго, всёми другими признаками лихорадки гнилой, кои описаны выше.

Нещастные признаки.

Опасные.

Нещастные признаки суть упорной поносо, крайнее безсиліе, помушившіеся глаза, синій или черный цвътъ пятенъ, частые ознобы или дрожь съ пульсомо малымв и дрожащимв; когда высыпь на кожь варугъ пропадеть, или посинветь, а изв носа и рта пойдешь кровь, що опасность весьма велика.

Благопрі-SHARR.

Но ежели около третьяго или четвертаго дня окажется умвренной потв на шев св пульсомв ровнымв, хошя и малымв; ежели верхушки вередово покажутся въ благопріятньйшемъ видь; ежели пятны внизу будуть хорошаго краснаго цвъта; ежели дышаніе станеть легче; ежели глаза оживуть: то по всему можно надъяться благополучнаго перелома.

(Больные часто чувствують долгое время слёд-призития, ствія оть сей бользии послё того, какь она прошла; остающіе- они остаются слабыми и томными на многіе мёсяцы, эдоровле- и сохраняють перемёну въ голось и трудность выни- глопаніи иногда чрезь многіе годы.)

ЧЛЕНЪ Ш.

Пищеупотребление, кое на добно предписывать больным в жабого св антоновым в огнем в.

Больнаго надобно держать въ поков и большую Больному часть времени въ постели; потому что стоя подвер- надобно тежать въ постели.

Яства больнаго должны бышь силовозставлятельныя канія доли питательныя; ему надобно давать кашицу извету святы быть красным вином в, студень изв мясв, крыкіе бульюны и питія: проч; нитье должно быть такого же свойства и качества противувиильнаго, как в-то негусв св красным визнання ном визначеном визначеном вином вином вином и проч. что уже п предписано в в глав в 9, \$ 3 сего Тома.

ЧЛЕНБ IV.

Пъкарства, кои надобно предписывать больным ка-

Пользование сего вида жабы должно бышь со-ская разветь различно ошь пользования воспаления горла лично пользования воспаления горла лично пользования, просижають, просижають, просижають, просижають, просижають сей жабы сты испыта, только что разслабляющия больнаго, должны пользоваты бышь запрещены. Лыкаретва прокладительныя, какы на веспалительной жабы:

качестві, Одни только лекарства крепительных и развепотребных селяющіх можно безопасно употреблять, да и не настважь. Добно пхъ никогда и опускать.

чаль началь напозывъ на реоту, що для очищентя его желудка
предпинадобно ему дать зеленаго каго, или вмъсто каго росать, еже- машкосых в цевтов в, или влагословеннаго волкца въ тенми у больнаго есть
наго есть
количествъ, не очистять желудка, то надобно дать
рвоту? больному отъ пятнатцати до осмнатцати грановъ
илекакуанги въ порошкъ, или другое какое легкое
рвотное.

Полосканье Когда бользнь не опасна, то надобно больному когда 60- полоскать рот полоскать рот полоскать потоскать рот полоскать рот полоскать потоскать пот

Когда признаки бывають страшными, верхушки знаки бывають вередово широкими и густыми, и дышеть больной застрашны- пахомы премерзкимы, то надобно предписать следуюми. щее полосканые:

> Возьми корня контраерем полунцію; вари его чрезъ нёсколько времени въ шести унціяхъ груднаго декокта; процеди; прибавь рейнскаго уксуса двё унціи, белаго меда, мирной тинктуры по унціи.

Способъ Сего состава больному дають не только для полоупотреб- сканья, но еще должно часто впускать его въроть для очищентя онаго по малымь пртемамь, прежде нежели употребить онь что либо изыпитья, или изы летов. Сей способы особливо должены употребляемы быть для младенцевь, кои еще не знають сами полоскать

pomo.

Авкарство весьма спасительное въ семъ случав пары, ком состоить въ томъ, чтобъ почаще впускать въ ротънадобно больному посредсивомъ едыхальника и опрокинутой впуснать большой воронки теплой паръ смъси, составляемой изЪ уксуса, мирры и меда.

Но когда признаки злости дойдуть до высочай-что надоба шаго степени, и бользнь будеть возвыщать опасность, то но предииединое тогда остается лекарство, от коего можно когда бонадъяться пользы, а имянно хина. явзнь на-

> ходишся чайшем Ъ

степени Хину; споссбЪ ее

> предписы 82M%.

сывань,

Ее можно давать вЪ существъ или вЪ порошкъ, на высоежели желудок в больнаго может в оной снести; а ежели не можеть, то употреблять ее следующимь образомь: элости?

Возми наилучшей хины, - - унцію, Виргинійской серпентаріи, двь драхны.

По лашынь:

Recipe china - - vnciam, serpentariæ virginianæ, drachmas duas.

Истолки все это; вари въ фунтъ съ половиною воды, пока останется только фунть; прибавь кофейную ложечку купороснаго эликсира (elixirii vitriolici.)

Сего надобно давать больному по малинькой чашечкъ кофейной чрезъ каждые три или четыре часа.

Нарыеныя весьма полезны въ сей бользни, а нарывныя; особливо когда пульей и силы больнаго ослабли; они гав икъ прикладываются кЪ горлу, за ушми, или кЪ запылку, приклады-

Когда больной умучился унорною реотою, то что надобчрезЪ каждой часЪ надлежишЪ ему давашь по двъ лож-но двишь, ки соленаго голена (julepii salini). Настой съ мятого и когда больнебольшимъ количествомъ корицы вместо обыкновен-чился рвонаго пишья въ семъ случав весьма пригоденъ, а особли- тою: Jones II. KK

во ежели приложено будеть такое же количество красенаго вина.

моносомь. Когда поносо нарочить (5), то надобно больному давать два или три раза въ день, или чаще, ежели нужно, величиною по мушкатному оръху діаскорділ или Японской конфекціи.

когда ной- Ежели случится кровотегенте изъ носа, то нось деть кровь надобно почаще ставить надъпаромъ горячаго уксуса, а питье больнаго подкисливать купоросным спиртом или розового тинктурого.

когда случится трудность вы мотеиспускании, чится то надобно животы пригрывать теплою водою и три ты моче- или четыре раза вы день наставлять млегительных испуска- промывания.

время про- Когда бользнь поутихнеть, то надобно послачищать бить животь легкими тистительными, какь-то манного, Ялександрійскимо листомо, ревенемо и проч.

Что надоб
Ежели послё бользни остается великая сла
но двлать, бость, нарочитое уныніе, ночныя ликорадки и дру
ногда по

изавченія гіе признаки такотки, то больному надобно пробользни должать употребленіе хины, кою надобно совокупить

ост. ется

слабость,

уныніе и

прочі лекарства, да еще молочная діэта вмёсто всякой пи
щи, и еерховая взда, суть наипригодивишими сред
ствами къ возвращенію потерянныхъ сплъ.

€ 3.

⁽⁵⁾ Надобно весьма осмотрительну быть, говорить фотержилль, въ разсуждени ноноса: Общиновенно, онь перестреть на первых двух днях приступа реоть; но ежели онь продолжается далье, а особливо у взрослых в, то надлежить стараться остановить его; а иначе произведеть онь весьма досадныя следстви: и так в в семь случат надобно больному давать всякой разь, как в онь пойдеть на дворь, то наи другое изъ предписаниых в г. Буханом ленарствь.

mero asince ausgou a Jon 3. Trace arrandomice

О бользни горла простой или в ложной жабь.

(Здысь толкуется о заваль или засореніи частей, Собить находящихся близь горла, каків-то язытка, минда-и знаки линд, заушных, подтелюстных, наконець всых простой. жельзя, пропущающих слину. Сей заваль называется ложного жабого; потому что она не соединена сь признаками воспаленія, описанными вы члень ІІ, у т сей тлавы.

Причины сего вида жабы сущь шѣже, кои описаиы вЪ членъ I того же § 1 сей 19 главы.

ЧЛЕНЪ І.

Признаки боли горла простой.

Стя бользнь, обыкновенный шая из в тых в, кои признаки пристають къ горлу, обыкновенно начинается съ ка-предшествующе кой нибудь мин далины, которая от втого дълается толстою, красною, больною и не иначе позволяет в глотань, как в съ величайшею болью: иногда боль бываеть въ одной только сторонь; но обыкновенные переходить она на язытек в, а оттуда къ другой миндалинь. Ежели боль не тяжка, то первой обыкновенно становится легче, когда ко второй миндалинь пристала боль.

Когда онь объ воспалены вдругь, то боль и не-признани здоровье бывають весьма нарочитыми; больной не иначе боли герможеть глотать, какь съ величайтею трудностію, стой укони чувствительность толь великою бываеть, что ча-ренившейство, раздражительные люди впадають въ корси вся-ся-кой разь, какь скоро только стануть глотать слину или другую какую жидкость. Ипогда даже больные трезъ многіе часы остаются въ невозможности что

нибудь проглошить. Задъ неба и корень языка слегка красны.

Признаки жарактеристическіе. Многіе больные трудніве проглатывають жидкія вещества, нежели твердыя; потому что жидкія вещества требують большаго усилія оть мышицо для проглатыванія. Слина еще трудніве проглатывается, нежели другія жидкости, потому что какь она нісколько вязка, то течеть не столь удобно. Сія трудность віз глотаніи, соединенная сіз количествомі составляющейся слины, производить то харканіе почти безпрестанное, которое тімь болье безпокоить ніскоторых больных нто щеки внутри, весь языкь и губы часто облупливаются.

Сте имъ также не даетъ и спать, но это не худо; сонъ мало полезенъ въ лихора догных бользняхъ; и я видълъ, говоритъ Г. Тиссотъ, что тъ, кои почитали свое горло почти совсътъ вылъченнымъ, вставали послъ нъсколька часовъ сна съ великою въ ономъ болью.

Пихорадка въ семъ видъ бользни бываетъ иногда весьма сильною, и ознобо часто продолжается чрезъ иногіе часы; за онымъ слъдуетъ нарочитой жаръ и великая боль въ головъ, иногда сопровождаемая сонливостію. Обыкновенно повечеру немалая бываетъ лихорадка, но иногда очень мало или ничего поутру.

Легкое начало боли горла часто случается предъ ознобомо; но обыкновенные она оказывается уже послы, въ то же время, въ кое жаръ.

Шея иногда нъсколько распухаеть, и иногда больные жалуются на боль довольно сильную въ ухъ больнъйшей стороны; она ръдко бываеть въ обоихъ ушахъ.)

члень и.

Пользование простой боли горла.

(ВЪ семЪ видѣ боли горла часто мы принужде-обстояны бываемЪ пускать кровь; да сего не надобно нико тельства, гда и опускать, естьли пульсо жестоко и полоно: кровь зываютъ отворять надобно заранѣе. Рѣдко случается нужда вЪ провопуповторенти кровопускантя; но никогда болѣе трехъ снашее. кровопускантй дѣлать не должно.

Боль горла простая часто выльчивается без в что надобкровопусканія; и сіе бы почти всегда случалось, есть но дългть ли бы больные, как в скоро почувствовали нервые прищенія знаки оной, покрывали себ в шею весьма тепло; ежели нровопубы ноги и голени вымывали теплою водою; ежели бы снанія: употребляли какія нибудь промыванія, и ежели бы обильно пили кое нибудь из в питій, описанных выше, в в глав в 5, § 1, член в III сего Тома.

Но люди не заботятся о началах сей больз-нерадыйе ии, так как и всякой другой; они отлагають поль о началь сей больззован сей больззован дотоль, доколь бользнь их дойдеть до та-ни и встхъ кого степени, что не можно им будет отправлять других дъль; и тогда почти не возможно обойтись без к ровопускан , которое, правда, часто прогоняет зло, ежели больной будет много пить и больное мьсто держать, сколько возможно, теплье.

Когда трудность въ глотаніи не соединена съ уто надобострою болію, то, какъ она тогда происходить толь-но дълать, ко отъ засоренія жельзі горла, требуеть только того, чтобь больное мъсто держано было въ тепль. Больной часто должень полоскать себъ роть какими нибудь лъкарствами, которыя бы слегка раздражали жельза, какъ-то декокто изд винных ягодо, уксуса и меда, въ которой иногда можно прибавлять К к 3 нъсколько горгицы, или нъсколько капель спиртных в напитково.

Когда есть Но весьма надобно опасаться от всего послёдпри прости наго полосканый, естьми кота некоторые окажутся
паленія. знаки воспаленія: ибо тогда надобно поступать такь,
какь мы сказали выше, въ члень V, в і сей главы.)

Сей видь боли горла вы простомы народы называется различными именами, для излычения коей иные больнаго приподнимають кверху за волосы; а други забивають нальцы поды челюсти: си средства и мноия другия часто бывають опасными, или по крайней мырь безполезными (В).

\$ 4.

Срелства предохранять себя отд различных видовд

emporan

Люди, подверженные воспаленія мо горла, должим для предохраненія себя от оных жить весьма умъренно.

или честыл прочищеля.

Тъ, кои не похотять покориться симъ законамъ, должны почаще прибъгать къ просищентямо, или къ аругимъ сыпоражнивантямо, дабы выгнать излишество соковъ.

Надобно имъ еще стараться, чтобъ не простудиться, и чтобъ они воздерживались отъ ястов и авкарство вязательных и раздражательных.

Сильное твлодвижение, умножая быстроту и силу крови, особенно располагаеть къ восполению горла,

⁽β) ВЪ семЪ - то видъ воли горля совътую я употреблять извълный у простаго нашего нар да взваредъ изъ меда, илюкем и стручноваго периа; онъ, естьля тольно нътъ воспаленій, весьма пригоднымъ быть можетъ — Вирсчемъ умъренно теплой сокъ илюкем, смъщанной съ водою тольно, можетъ вездъ употребляемъ быть.

и особливо ежели кто вскорт по томъ пьетъ холодные напитки, или вдругъ выходитъ на холодъ: и такъ тт, кои желаютъ предохранить себя отъ сей болъзни, должны говоривъ высоко, пъвъ, бъжавъ, пивъ напитки теплые, или дълавъ другое, что можетъ разгорячить кровь, или придать скорость кровеобращенто въ сей части, не иначе прохлаждаться, какъ постененно, держать шею потеплъе противъ обыкновеннаго и проч.

Я часто видаль людей, подверженных воли гор-польза ств ла, которые от оной совство освобождались, непрестания на подобіе вы тем и ногы сталстуха, или сапоги теплые, или фланелевой камзоль: сін средства вокажутся малозначущими; но они производять превосходныя дъйствія. Правда, опасно их оставнть, естьли сдълана кы онымы привычка; но не выгоды, происходящія от употребленія оных презы всю жизнь, конечно не могуть наровнь поставлены быть сы опасностями от пренебреженія оных влены опасностями от пренебреженія оных влены быть сы опасностями от пренебреженія оных влены быть сы опасностями от в пренебреженія оных влены опасностя опас

Иногда по прошестви воспаления горла жельзы что на добостаются распухлыми и дълаются жесткими и но дълать, и часто от проше-повторительнаго прикладывантя раздражательных и сти востразбивательных дъкарствь умножается только опа-паления жельзы остеность. Въ семь случав остается только дълать, таются чтобь то место держать въ теплъ, и больному при-распухлычка казать полоскать себя два раза въ день декоктоли изд ми синных леодо, подлисленнымъ нъсколькими каплями эликсира или спирта купороспаго (6).

LAA-

⁽⁶⁾ Сін припадни остающся наиначе тогда, ногда бользнь худо была пользована. Никогда не случалось, що прайней мерв я того не знаю, говорящь Г. Тиссоть, чт бь соспалительная жава, кор що пользования, нончалась антоностть оснеть, или опрыплостью жельзь; но я быль свидытелемь, что и то и другое случается, ногда кот ть возь будить насильной поть вначаль сорячительными лъкарствами.

ГЛАВА 20.

О насморкь; о различных видах кашля и о удушьв.

§ I.

О насморкв.

Мы уже дали знать вЪ Томѣ I, главѣ 12, § 3 и членахЪ, отъ оной зависящихЪ, что насморкъ происходитъ отъ остановки испарины. Мы старались показать тому причины; и такъ не будемъ здѣсь объ оныхъ говорить. Мы не станейъ также приводить здѣсь различные оной означающёе признаки, потому что они почти всѣмъ извѣстны.

Понятіе, Но мы за долгъ почитаемъ дать знать, что какое должно имъть
о простуми лихорадоко, которыя различествують оть нъкомахь торыхъ, нами выше описанныхъ, а особливо отъ
колотъл, отъ воспаленія легкихо, оть жабы, одною
только напряженностію (1).

Никто от От насморка никто не освобождень; он не онаго не смотрить ни на возрасть, ни на поль, ни на телоизбътаеть: сложение; ни лъкарства, ни пищеупотребление не могуть климаего предупредить: насморка бываеть во всъх климахь бы- матахь, и при великой осторожности не возможно ваеть напредохранить себя от онаго во всяком времени. Правда, человъкь, живущий въ одинаковом растворе-

⁽¹⁾ Здёсь дёло идеть только о той простуде, которая собственно называется насморномь; гнёздо сей бользии находится во внутренности
ноздрей, надноздерных ямкахь. насморны есть заваль, часто слегка
воспалительной, вы оболочнахы, покрывающих собою сій впадины.
Сей заваль, прачиняемый остановною испарины, называется у простаго народа только тогда насморномы, когда соединень оны сы нашлемь; но нашель есть другая бользиь, ноторая чаще всего бываеть
слёдствіемь запущеннаго безь пользованія насморна: о нашлё мы будемь говорить вы § 2 сей главы.

ніи воздуха, можеть никогда не простудиться, т. е. никогда не получить насморка; но какь никто не можеть, да и не должень подвергаться такому единообразію, то испареніе подпадаеть всёмь перемёнамь, причиняемымь вы тёлахы перемёнами теплоты. Со всёмь тёмь надобно признаться, что когда сїй перемёны бывають не очень нарочиты, то онё не могуть разстроить здравія. Для произведенія сихь дёйствій надобно имь быть ощутительными.

члень І.

П ризнаки насморка.

Тяжесть въ груди, слабость, къ которой человъкъ до того непривыченъ быль; боль въ головъ, тажесть во всъхъ близь носа лежащихъ частяхъ, завалъ въ ноздряхъ и проч. подаютъ причину думать, что испарина остановилась, или лучте сказать, что человъкъ тоть получилъ насморкъ. (Вскоръ больной не можетъ сморкать; но изъ ноздрей у него течетъ влажность свътлая и закал, которая мало помалу густъетъ, по мъръ какъ разбивается или расходится завалъ; онъ теряетъ обонянте, вкусъ, аппетитъ и проч.)

ЧЛЕНЪ ІІ.

Пищеупотребление и содержание себя, кои на добно пред-

Больной тотчась должень приняться за діэту, яства или по крайней мъръ уменьшить количество яство и воздержаться от всякаго кръпкаго напитка, Вмъсто мяса, рыбы, янць, молока, или другаго какого яства питательнаго должень он кущать одни только легинькія похлебки, телячьи и цыплячьи булью питье. ны, папады, кашицу и проч. а пить только ястую во-

му в полеменную медомо; или настой съ мятого или лынянымо съменемо, подкисленной померанцовымо или мимоннымо сохомо; или декокто ясменной съ солодкого, съ тамариндами; или другія питія прохладительныя, мокротожидительныя и кислыя.

въ чемъ долженъ востоять уживъ? Ужинъ наипаче долженъ быть легкимъ; больной за симъ кушаньемъ долженъ употреблять по немногу поссета, или кашицы, подслащениои небольшимъ количествомъ меда: туда же можно приложить нъсколько сушенаго хлъба. Ежели медъ противенъ желудку, то надобно, подсластить сто кашицу кассона долъ или малымъ количествомъ меласса, а вето это подкислить смородинны из желеемъ. Люди, привыкште къ квашенимы напиткамъ, вмъсто кашицы должны пить сы воромку съ виномъ, которую надлежитъ подсластить вышеупомянутыми веществами.

Вольной должен вы постели долже продолжен вы тивы обыкновеннаго и стараться вспотыть слегка;
дежать вы что исполнить не трудно около утра приниманіем вы тескольких в чашек в чаю, или другаго какого нибудь мокротожи дительнаго питія. Я часто видаль, что это только одно средотво вы одины день прогоняло насморя выроятно стоилы жизни больнаго, или го крайней мыры продержаль бы сго вы постели чрезы ны сколько мысяцовь.

подът ; ет пора тепат воды ; епособь употребаавть егое (Аругое весьма спасительное и скорое средство освободиться отв насморка, состоить въ томь, чтобь вдыхать въ себя паръ теплой воды, или теплой настой съ какими нибудь мястительными или ароматитескими растеніями, каковы суть бузинные цевоты, роматковые, или иссопные листья и проч. Сей настой взливается на горячую сковороду, надъ коею

мадобно держать голову, покрытую евернутою вдвое салфеткою, такъ чтобы весь паръ шелъ на лицо; или впускать въ ноздри носъ вдыхальника, а по недостатку его узкой конецъ воронки.)

Но ежели кто допустить злу укорениться от належния фрочками, то покушентя, послё того чинимыя для средства предупревыльчентя, остаются часто тщетными. Колотье, вос-жагть паленте легких, смертоносная тахотка, обыкновенными следствів суть следствіями запущенных безь пользованія на насморка, емерково, или худо пользованных везь пользованія на насморка, емели бу-дуть

Ежели бы люди восхошвли, как в скоро окажутся блюдаемые первые признаки насморка, пожертвовать, т. е. упо-чему подтребить несколько времени на содержание себя в вергаются своем в дом в в поков, в тепль, на діэть, то безы их пресомнения предупредили бы они некоторую часть не зирають: щастных в последствий, происходящих в от в остановки испарины.

Множество людей покущаются выльчиться от вырумие насморка питьем пьяных выпитков в; но этот тых в, ком опыт в слишком в отважен в, даже дурацкой Правда, выльчить он в может в иногда удаться, внезапно возстановив в насморк испарину; но ежели св насморком соединен в нъко-упиванся торой стенен в вспаленія, что часто случается, то напитки крыткіе и пьяные напитки не токмо не уменьшат в бо-ми. ли, но еще ее и умножат в соспалительную ли-хорадку (в в горятку.)

(Аругіе люди принимають терьяку, конфекціи, терьякомь, ратафіи и проч; сіи средства равно пагубны по тъмъ же причинамь. Герьяко можеть пригоднымь быть въ насморкахо, даже въ кашль, но только въ конць: рань онь можеть причинить воспаленіе въ легкихо, или въ горль; когда принимается онь въ конць насморка, то ла 2

ужину надобно быть малому, да и сварившемуся въ желудкв.)

Нещаст-Когда рабочіе люди, жнвущіе дневными труданыя поми, по нещастію получають насморко, то трудно, слъдствія, или почти не возможно имъ просидъть дома въ тепав производиодинЪ или два дни и приняшь лъкарства: отъ сегомыя насморкомЪ то происходить то нездоровье ихъ въ последствии въ рабовремени, от котораго они принуждены бываютъ -ои бхив дяхь, ком оставаться дома должайшее время, и даже дълаются нене комять способными поднимать тяжкія работы. нъскольно

дней успоконшься HIM. Или кои это презичитая насморнъ болтзнію

MO10.

Далье, тв изъ работниковъ, кои имъютъ споеть рабо- собЪ употребить сти средства, когда получають они насморко, часто презирають это делать. Они показывають видь, что ни во что ставять насморкв; и рающь, по пока могуть ноги волочить, не хотять остаться дома по причинъ только, какъ они говорять, простаго насморка: от в сего-то погибает в толь великое число люочень лег. дей изъ сего класса отъ слъдствій сего нездоровьица; пошому что насморкв, такъ какъ презрънный непріятель, от отсрочков усиливается, и наконецъ дълается непобъдимымъ (2).

Насмориъ такія же производишъ сабдетвія въ пушешествениикахъ по шъмъ же причинамъ.

Сіл истинна обнаруживается повседневно и между путешественниками, которые опасаясь опустить хошь одинъ только день, подвергающь жизнь опасности оть продолжения пути, котя и имьють сию бользив, даже вЪ самую жестокую погоду.

OA HA

⁽²⁾ Въ самой вещи, говорить г. Тиссоть, не оть насморка жюди уми раюшь, пока онь есть только насморяв; но когда они его запускаюмъ, т. е. оставляють долгое время безъ пользованія, що онь ввергаеть ихь въ грудныя болтани, нои ихъ убивають. Насмории увивають людей колбе, нежели плаа, отвытствоваль ныноторой Врачь своему другу, которой ему говориль: я слава Богу эдоровь, да тольжо у меня насморав.

Однако надобно признашься, что можно иногда опасности слишком в бояться насморка. Челов вкв, из в леткаго на-отв излисморка запирающійся в в очень теплой покой и піющій насморка обпльно теплые напитки, дает в повод в чрез в то к в болзни-такому разслабленію твердых в, что посл вывает в весьма трудно доставить им в прежнюю упругость.

ВЪ сей бользни не надобно безЪ нужды выходить на большой холодь, но надобно также предостерстаться от излишества теплоты; ть, кои запираются въ очень теплыхъ поколхъ, не выльчиваются; да и какъ имъ выльчиться? Сїн покон, не говоря о опасности, происходящей при оставленіи оныхъ, производять въ человькь насморхъ, такъ какъ крыпкіе напитки, дълая въ легкихъ легкое воспаленіе.)

И такъ въ сей бользни, когда только бользнь съ діэтою и погода позволяють, пристойно соединять съ выше-надобно соединать умъренное расхаживаться, вздить верхомъ, въ каретъ и проч. тълодвичасто упорной насморкъ, сопротивлявшійся всъмъ лъ-женіе, каретвамъ, уступаетъ діэтъ, и пристойному тълодименто, когда продолжаются они чрезъ довольное время.

Надежное средство возстановить испарину, есть польза от то, чтобь вымывать ноги и голени въ теплой вод в умовенія каждой вечерь; но не надобно ей быть очень горячей, ногь; степенотому что она тогда будеть вредна. Не надобно леты, поникогда того допускать, чтобь вода сія была теплье требны въ парнаго молока, и больному вскор в посль сего вида ба-сей воды. ям надлежить лечи на постелю.

Онускать ноги въ теплую воду, держаться по-сокращестели, пить овсяной или ятной воды, или другой ніе того, что надобкакой жидкости излегка теплой, прогонить скорье кор-но двавть ту, и возстановить надежнье испарину, нежели всь въ пролл з вопристемьных, мотогонительных лекарсива Антекарей. Вопр все то, что надлежить делать вы простомы насморка; и ежели кто будеть такы поступать благовременно, т. е. заранее, то развы рыдко его не вы-

ЧЛЕНЬ III.

Явкарства, кои на добно предписывать больным насморкомо, которой не уступаето діэтв.

не когда припадки не уступають діэть, пищепроисходящій оть употребленіго, питіямь теплымь и мокротожи дительупорнаго ны мо, то по всему можно опасаться, чтобь не приклынасморна. чилась какая нибудь другая бользнь, какь-то восналеніе легкихо, горятка и проч.

И такъ ежели пульсё жестоке и тасте, ежели вывыства, кожа жгуча и сука, ежели больной чувствуеть больной поизывають вы головы, или вы груди: то надобно пустить ему провопу- кровы и дать порошка слабительного и прохладительного, одобреннаго противы лихородки крописной вы главы 14 сего Тома, гды на полы написано: селитра и ревень; оны должены принимать его чрезы каждые три или четыре часа, пока опорознить.

Надобно еще приложить нарывное кЪ затылку и чрезъ каждые два часа давать больному соляной смеси (тіхтига falina): кратко, пользовать его такъ же, какъ бы онъ быль въ легкой лихорадке. Я часто видель, что сіи средства, употребляемыя вначаль, разгоняли бользнь въ два или три дни, даже и тогда, когда были всъ предшествующіе признаки лихорадки воспалительной, или воспаленія легких (3).

ЧЛЕНЪ

Врекразсужденіе

^(5) Мы просимъ читателя внятнъе разобрать предлагаемые здъсь Г. Бужаномъ совъты. Онъ не согласенъ съ бабушками - авнариами и тою нол-

ЧЛЕНЪ IV.

Надежных средства предохранять себя отб насморка.

Величайшее средство предохранять себя от в насморка есть то, чтобь избытать, сколько возможно, крайностей теплоты и холода; и когда кто разворячился, то не иначе прохлаждаться, какъ только постепенно.

(Но не такъ-то поступають подверженные отвать жаться имь вы великой теплоть: это такая отибка, излишней которая подрываеть еще болье ихы здравіе. Располо-теплоть женіе кы насморкама происходить оть тото, что для предисходить оть тото, что упрежденія испарина удобно приходить вы разстройство, и тогда насморна. чыть болье кто по-тьеть, тыть болье таковое расположеніе должно умножиться. Воздухь, людьми дышемый, будучи безпрестанно теплымь, разслабляеть и размявчаеть кожу, которая буду-

толью, праздных в людей, ист рые безарестанно ответают вольных в простаго своим в присутствем в и совытами. По мныто ихв, умовенія ного народа, и просопусканія не суть приличными льнарствами в в насморяв; они насательно сперва утверидають, что умовенія ного оттягивають насморяв на до чользомення; а не разсуждають о том; что они суть велинями средствами ванія нами возстановленії испарины; и что возстановленіе сего выпоражниванія сморна. одно токмо можеть вначать выльчать насморять.

Что населеня до просопуснанія, що они положительно говореть, что оно умерщилисть. Кань они не могуть судить о различ Неть исныхь степенихь, до нановыхь сін бользнь дойти можеть, що они ключивмь нажется только бользнію легною вы противность тому, что на- тельтаго
ми сказано вы предыдущемы пымвичнія, и о нозываяся, не извыстно, лыстротва
на наномы уметвованія, дума оть, что просопуснаніе вы ономы со- для той
в тымь протигно.

или дру-

Но умные, разсудительные люди, поступающе по извъстнымъ гой бользшачаламъ, знають, что нъть исключительнаго льнарства на течую ни: приили иную бользаь; что признаии бользан суть истинаме поназатели знаии суть льнарсть, и что въ наной бы то бользан ни было, напь сноро ока- поназатежут я признаии соспаленія, то кросопусканіе е ть силья вішее сред-ли льство, могущее сопротивиться безпорадкамъ оть того происходащляю, карствь. будучи безпрерывно орошаема небольшимъ потомъ, не можеть болье устоять въсвоей должности; и какъ легчайшая причина можеть остановить стю испарину, даже сей пото : то человькъ безпрестанно опять впадаеть въ насморко, коего хочеть избъгнуть.

И такъ не остается другаго способа къ предохраненію себя оть наслорка, какъ познакомиться съ воздухомъ, избъгать жаркихъ покоевъ, уменьшать мало помалу свое платье (т. е. изъ очень теплаго дълать не очень теплое, постепенно), наблюдать умъренное тъло деиженіе, такъ какъ мы дали знать въ Томъ І, главъ 12, § 3, член. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VI и VII, въ коихъ толкуется о всъхъ сихъ предметахъ удовлетворительнъйшимъ образомъ.)

ý 2.

О различных видах кашля.

ЧЛЕНЪ І.

© грудномв, т. е. происходящемв изв легкихв кашав.

Кашель обыкновенно есть следствием насморка, которой или худо быль пользовань, или совсемь запущень, такь какь сказано выше въ примен. и сей главы. Когда онъ становится упорнымь, то не безъ причины можно опасаться нещастныхъ последствий; потому что онъ изъявляетъ слабость легкихо и часто бываетъ предшественникомъ гахотки.

Признаки груднаго кашля.

(Грудной кашель, естьли хотя нёсколько силень, обыкновенно бываеть съ лихорадкого, которая иногда продолжается чрезъ многіе дни. Сей кашель сперва бываеть сухб; и доколь онь находится вы семь состояніи, то больной часто чувствуеть легкое колотье во боку перемежающееся, тажесть и некоторую боль во горяв: но мало помалу харкотина начинаеть выходить, оть которой кашель и тажесть умаляются.

Урудной кашель долье продолжается, нежели на Сколь колсморкв, которой, когда только не запущень, а поль го продолзовань быль по предписанному въ предыдущемъ у способу, не болье двухъ или трехъ дней длится; а гру-нашель с дной кашель по крайней мъръ продолжается пять или шесть дней.

Ежели онъ продлишся долье, що можещь имы канія оты печальный продлишся долье, що кашель непренето нещастанно отражаеть кровь вы голову; потому что оны происхолишаеть сна, отнимаеть аппетить и мышаеть пище- дать слы, варенію; потому что безпрестанныя трясенія легких стыя, кооть онаго разслабляють сіе терево (легкія), которое слыващись слабый имы мыстомы, служить, такь сказать, выыстилищемы всых соковь: оть сего то ды шаніе лылается короткимы и принужденнымы; тяжесть вы груди обнаруживается, и оказываетсл внутренняя или тахотная лихорадка; тыло болые не питается; больной падаеть вы слабость, изнуреніе, безсонницу и проч. и часто очень рано умираеть.

Изр сего видно, сколько-то нужно не почитать за бездылицу грудной кашель, такъ какъ ежедневно поступають; потому что онъ можеть произвести плачевтытия слыдствия. Ныть никого, кто бы не могь представить какого нибудь человыка, умершаго отъ запущеннаго безъ пользования или кудо пользованнаго насморка, или груднаго кашля, такъ какъ доказано выше, во 2 примыч. сей главы.)

Пользование груднаго кашля, соединенного св лихорадкою.

Признани, Ежели кашель силенъ, ежели больной молодъ и нои поназывають плотенъ, ежели пульст жестокт и скорт, ежели боль провопувъ головъ нарочита: то кровопускание нужно.

Кои не по
Но ежели больной слабъ и твлосложенія хилаго, казывато кровопусканіе продлить только бользнь. Когда больтоть онаго ной свободно харкаеть, тот да оно безполезно и часто даже вредно; потому что оно вообще клонится къ уменьшенію сего выпоражниванія, какъ-то доказано въ главъ 6, примъчаніи 2 той же главы.

Aiama.

(Больной должен'ь последовать во всёх'ь пунктах'ь діэтв, предписанной для насморка выше сего, вы члень 11, у 1 сей главы; и такы должень оны принимать яства и питія только усладительныя, опускать и мыть свои ноги каждой вечеры вы теплой воды, вдыхать вы себя восредствомы вдыхальника пары теплой воды и проч: и вы противность древнему предразсужденію, почитавшему бани или умовенія ногы какы весьма опасными вы сей бользни, они, говориты Г. Тиссоть, великое приносять облегченіе больнымы, уменьшая лихорадку, боль голосы и кашель. Промывания также весьма полезны, естьли у больнаго запоров.

Промыва-

Умовение ногъ.

Пользование груднаго кашля безд лихорадки, но соеди-

Когда кашель не соединень ни съ какимъ видомъ лихорадки, однако харкотина густа и вязка: то предписываются лькарства грудныя и разбивательныя, каковы суть пріуготовленія изъсциллы (морскаго лука), изъ аммоніалеской камъди и проч.

Солюція, Диссолюція, т. е. распущеніе аммоніатеской кат. е. рас- мізди, таким в образом в должна ділаема быть, как в пущеніе мы совітовали в главі 5, у г, члені IV, гді на полів полѣ написано: диссолюція или распущеніе аммоніате-ской намъской камѣди. Сего распущенія надобно больному давать дипо двѣ ложки три или четыре раза вЪ день, болье или менье, глядя на возрастъ и темпераменто больнаго.

Пріуготовленія сциллы могуть даваемы быть Сциллитиподъ многими различными видами, каковы суть слъдующіе: ческія люкарства.

Смъщай: сей смъси дается больному по двъложки два или три раза въ день.

Сиропо, дълаемый изъ равныхъ частей ли. понна-грудной го сока, леденца и меда, также весьма пригоденъ въ разбивасемъ видъ кашля: больной можетъ его принимать по сиропъ. ложкъ, когда захочетъ.

Пользование груднаго кашля безб лихорадки, но соеди-

По когда харкотина или мокрота бёла, водяни-ленаренна сна и безевязна, то ещи лекаретва не токмо не бу- усладидуть полезными, по еще и вредными; въ семъ слу- тельныя и мав усладительные опіяты или электуаріи, лекаретва масляныя и склизистыя гораздо пригоднёе.

Больному надобно почасту пить настоя, делае- Птизана. маго из Б цветов в полеваго маку и корня рожи, или из Б листьев Б мать и матихи.

Можно ему еще давашь два раза вы день по ко-парегорифейной ложечкъ облегчительнаго эликсира, названнаго ческой эликсирь. парегоритескимо, вы рюмкъ его пишья.

Dyx-

M M 2

настой съ
фуллерово настой шпанскаго сока (т. е. солодковачитиченимъ го экстракта) равно пристоенъ въ семъ случав; сего настоя можно давать по чайной чашкъ три или четыре раза въ день (4).

Пользование груднаго кашля безб лихорадки, но соеди-

Солодновой есять, даме в св с хір мв, б. два мическій лепе нечки, шпанской сокі.

Когда кашель происходить оть вакой мокроты, раз гражаю цей горло и глотку, то больной должень безпрезтанно держать во рту какія нибудь сладкія грудныя лепешетки, какь-то солодковой корень, сахарнои ятмень, какія нибудь бальзамитескія лепешетки или кружки, шпанской соко и проч. Сін лекарства, притупляя вакость и остроту мокроть и замыкая ихь раз дражательныя начала, утоляють кашель (а).

TIOAB.

Олинъ только случ.й, которой показываemb Atнарства RIGHERDEM и склизиcmbin. Ошибки, RIGMUNNE въ упошреблении сихъ льи решев. РожаныхЪ кружновъ,

вчменя съ

сахаромТ.

(4.) Надобно замѣтить, что Г. Буханъ предписываеть лъпарства масляныя и спананстыя только въ семь случаь, то е ногля грудной кашель ссединень съ харкотиною водянитою и безсвязисю; въ других случа хъ, а оссбливо когда харкотина густа и вязка, они былибъ весьма вредными; потому что они придали бы оной густоту, которую надсбно разбить: однако петседневно иначе пеступають. Всякой предписываеть масло изъ сладкаго миндаля и сиропь изъ рожи, нанъ си ро онажется кашель, не размышляя, какія онь понавываеть свейства. Привязанность къ симъ хъхарствамъ, педаерживаемая къ нещестью тъми, кои мъщаются лъчить, есть одною изъ главныхъ причинъ того, что кашли толь долго тянутся и становятся неизлъчимыми, накъ - то мы понажемъ ниже, въ примъчніи 5 сей главы.

То, что мы сназали о ленарствах в масляных в склизистых, равно должно отнестися нъ рожанымъ пружкамь, къ сахару съ ячменемь, къ солодиосому соку, къ груднымь лепешечкамь и прочиоскъ число велино.

Мы надтемся, что естьли хоти мало раз удьть о свойствахь, различающихь харкотину въ грудномь кашав, то не впадуть болте въ погръщности сін; и что ежели оптергнуть упомянутыя въ т б сел главы предразужденія, то удобно и скоро будуть себя выльчивать сть насморка и кашая, какого бы они вида ни были.

Масляная (а) ВЪ прежнемъ изланіи сего сочиненія я одобриль прошивъ сихъ раздражаю имуль іл. тельчыхъ упорныхъ вашаей масляную эмульсію съ прибавленіемъ въ оную съ прибавленіемъ въ оную съ прибавленіемъ въ оную съ прибавленіемъ въсто алкаличе-

CKG.

Пользование кашия безб ликорадки, но содержимаей мокротами упадающими на легкия.

ВЪ кашав, причиненномъ упадающими на легкія льигретва, мокротами и отъ того бывающемъ упорнымъ, нужно етос б- ствующія не токмо употребить присовътованныя выше сего монр то- дъкарства противъ хархотина густыха и заякиха, но харкавію, еще сдълать прижиганіе, или произвести другое какое набудь выпораживаніе.

Въ сихъ самыхъ случаяхъ я часто примъчаль вож пластырь дельнный дыствия отъ пластыря изъ Бургонской изъ вурсонской смолы, приложенниго между двумя лопатками.

Я предписываль сте простое лектретво противь польза от упорнейших во многих случаях и для него во весьма различных весьма различных темпераментов столь успешно, дах исчито оно никогда мне не изменяло, когда только не наючая, было явных внаков вереда вы легких в.

Для составлентя сего пласты ря надобно взять легихъсмолы величиною съ мушкатной оръхъ, разгладить
его тонинькою пластинкою на мягкой кожъ величиною
съ ладопь, и приложить межъ плечь. Сей пласты ръ
снимается чрезъ каждые два или три дни, вытирается и опять прикладывается; но чрезъ каждыя двъ недъли надобно возобновлять его, т. е. прикладывать
свъжій.

Какъ сте лъкарство просто и очень дешево, то для полупо этому можно будеть видъть многихъ людей, ставящихъ оное ни во что; но я не боюся утверждать, зы надебчто изъ всъхъ лъкарствъ, представляемыхъ намъ вра-но носить М м 3 тебвремя.

скаго обывновеннаго спирта; и млогіе прівтіки сказіли миз посль, что леніемь въ сія омульсія, припрівленная тінимь образомь, была превосходнымь оную парельнарствомь въ семь случаь, имьющая въ высочайшемь степени всь ть горическакачества, нои я ей назначиль. Когда не можно достать сего оливсира, го элинсито вмьсто онаго можно употребить срізмьрное ноличество тебличе- ра, или
ской тинитуры или лаудана ликанда.

тебным веществословіем вы пать ни одного столь дайствительнаго почти во всах видах видах вашлей, как всте. Правда, оно не всегда вдругь производить дайствіе; но ежели оно продолжаемо будеть чрезь насколько времени, то будеть успатно, между там как вольшая часть других вакарство останутся тщетными.

Невыгода от сего пластыря есть только облять та, что он причиняет зудв; но сего уважать только тольным получаемых впрочем выгодах в, от высходященего больным получаемых впрочем в него больным получаемых впрочем пластырь, пошереть то мъсто, гдъ он приложен был в, сухим в полотенцом водою и молокол водою и

Правда, когда кто хочеть его покинуть, то рожности, должень взять накоторую предосторожность; однако жно взять ему не чего будеть бояться, когда мало помалу ври остав- будеть уменьшать величину пластыря, а совствы помени его. кинеть развы только вы погоду теплую или весною (b).

ЧЛЕНЪ II.

О желу догном в кашль.

Кашель можеть произойти не отводного только тока мокроть вы легкия, но и отв другихы причины:

тебаической тинктуры, т. с. лаудана ликвида.

⁽b) Нъкоторые люди жалуются, что смоляной пластырь весьма кръпно пристаеть нь ножь, и что трудно его отвъ нее отдернуть; а
другіе жалуются, что трудно его на себь удержать. Это происходить от различных видовь смоль и спосеба, коимъ разглаживають
его по кожь. Восбще, я примътиль, что тогда лучтій быль успъхь,
ногда туть прибавлено было пъснольно воску и растирали его, снольно можно, холодивинимъ (у).

⁽у) Я могу увър пь, что нашь сапожной сарь ничемь не хуже сей Бургонской смолы; онь и самь по себь много авиствуеть; но ежели составлень будеть съ терпентиномь и восномь, то тогда будеть еще лучшимь.

въ семъ последнемъ случав грудиыл, т. с. для леекихо, лекарсива не приличны; и такъ въ кашле произшедшемъ или отъ слабости желудка, или отъ дряни, завалившейся въ семъ теревъ, сиропы, масла, склизи, всъ бальзамитеския лекарства противны.

П ризнаки желу логнаго кашля.

желу дотной кашель различествуеть отверу дочьть размисе, т. е. причиняемаго порчею вы легких, тымы, кичтется что вы семы послыднемы больной кашляеть при вамы ной кашель шании, т. е. вы то время, какы воздухы входить вы отв групцается, чего вы желу дотномы кашель не случается.

(Желудогной кашель острве, звончве и короче, межели грудной. Кажется, что больной только выкидываеть воздухь, въ чемь кашель сей весьма различень оть груднаго кашля, въ коемъ, такъ какъ дано знать, больной кашляеть, вдыхая въ себя воздухв.

Желу дотной кашель обыкновенно соединень съ болье или менье бользненнымь чувствиемь вы желу д-къ и спинъ. Когда оны силень, то причиняеть иногда реоту, а особливо когда произошель от испортившихся материй и находящихся вы желудкъ. Когда оны происходить от слабости желудка, то оны сухы, или и выходить мокрота, но водяниствя и вы маломы количествъ.

желу догной кашель гораздо болье нападаеть, онь сбыкнежели как в обыкновенно думають: он в особливо у нъжным в ньжных в и слабых в женщин в примъчается. В в сих в женщилюдях в он в обыкновенно есть слъдствием в худых в нам в и пищеварений, или какой нибудь другой бользни, в в коей проч; его употреблено много мокротожи дительных в лъкарствв, разслабивших в желудок в.

TTOAB.

Пользование желу дотнаго кашля, произше дшаго отб скопа дряни вб семб теревь (желу дкв.)

показаніе. Пользованіе сей бользни состоить въ томь, чтобъ очистить желудоко отъ собравшейся въ немъ дряни; а когда она выгната будеть, то укръпить его.

Въ слъдствие чего надобно сперва дать больнорвотное и
торьное чистиму какое нибудь слабое рвотное, какъ на примъръ
двънатцать или пятнатцать грановъ ипекакуанги, такъ
тельное. какъ предписано въ главъ 3, примъчани 4 сего Тома,
а по томъ какихъ нибудь горькихъ систительныхъ.

Свещенная И такъ, давши напередъ одно или два рвотвинктура. изжно дать лъкарства, названиаго священного
тинктурого (tinetura Jacra) одну или двъ ложки, два
раза въ день, или каждой разъ, когда только нужда
будетъ послабить животъ. Больной долженъ употреблять сти лъкарства чрезъ нарочитое время.

Способъ ее Сїю тинктуру можно и самому дълать слъдуюпріуготов- щимъ образомъ:

Возьми порошку етеры-пикры (pulueris hieræ-рістæ) унцію; настаивай его въ фунть бълаго вина чрезъ нъсколько дней; процъди и храни для употребленія (5).

стію могла просидеть, или простоять чрезь изсколько часовь; она

TIOAB.

Примъча- (5) 1777 Года, въ мъсяцъ Мајъ позванъ я быль къ одной сороколътивіе.

ней дъвицъ, ве ьма слабой и нервной; она страдала упорнымъ нашлемъ съ прошлаго белинато поста. Она при первыхъ знанахъ сей болъзни иснала поссбія; но накъ ей предписываля только воду, въ ноторой варено было телячье мясо, масляныя питін, грудныя лепешечви и проч: то нашель сдълался болье желулочилить, такъ что въ концъ двухъ съ половиною мъзлиовъ, какъ я къ ней въ первой разъ пришель, она выблевала всъ лства и даже нъкоторую часть питья. Она крайнъ похудъла, не спала и ед слабость была такова, что она съ трудно-

Пользование желу доснаго кашля, произходящаео отб слабости желу дка.

ВЪ кашль, произшедшемЪ отЪ слабости желудка, хина хина весьма дъйствительна. Больной долженЪ ее или жевать, или принимать вЪ порошкъ, или сдълавЪ изъ оной тинктуру съ другими горькими желудкокръпи-тельными веществами, употреблять.

Jomo II.

Нн

(Bb

чувствовала раздираніе въ желудкт и въ спинт, ногда только кашляла, а кашляла она почти безпрестанно. Сей кашель быль короткой и сукой; ел пульсь быль маль, сжать, но не резов; въ ней всегда быль колодь, и она говорила о себт, что она находится въ безпрестанномъ озновъ.

Я сперва ей предписаль сыворотку сь виномь, коей пить вельдь, сколько можно, болье, понемногу, но часто. Она изблевала
ньсколько только глотковь, которые проглатывала она очень скороспьшно; потому что находя сей напитокь прілтнымь, она не
преставала его пить. На другой день ей поназалось полегче; я ириказаль ей продолжать то же питье и еще вь третій день. На четвертой день больная была примътно здоровье, и кашель назался не столь
частымь; но еще всю оставалось крайнее от сращеніе къ яствамь и
во рту у ней было вязно. Всь сін причины побудили меня дать ей
двънгтутть грановь пекакуанги въ рюмкъ роматковаго настоя, и
сей самой настой вмъсто запиванія во время дъйствія реотнаго.

Ее рвало три раза; и хотя она немного двліла усилій, но потрясенія ее много утомили. Спустя два часа дань быль ей бульбонь, которой уставился; по томь вы тоть же день она опять принялася за сыворотну сы виномы, которую продолжала употреблять вы шестой и седьмой день; вы осьмой день предписаль я ей драхму ревеня, настоеннаго вы рюмкы ея сыворотки.

Она очень хорошо очистилась; по том в посль полудни вельль я ей дать вы два различные приема по рюмочкы добраго вина малаги, вы ноемы она обмачивала нофейной сухарикы, что ей поназалось очень вкуснымы. На другой день приняла она желудкой рытимельнаго порошка (pulveris stomachici); она продолжала его употреблять вы своей сыворомый чрезы цылой мысяць.

Кашель, боль въ желудав и спинъ и слабость мало помалу прошли; силы возвратились нечувствительно, и аппетить гораздо прежде оставления сихъ лъкарствъ сдълался таковымъ, каковъ былъ до болъзни.

желулно- (ВЪ семЪ случав хину можно предписывань слъкрвпинель- дующимЪ образомЪ:

Возьми существенной хинной соли, -- драхму, Ревеня въ порошкъ, -- полдрахмы,

По Лашынь:

Recipe salis essentialis china, - - - drachmam, Rabarbari in pulvere, - - - drachmam semis.

Смъщай, раздъли на девять равних в пртемов в. Больной по одному такому пртему должен в принимать ежедневно передъ объдом въ ложкъ супа, т. е. по-хлебки. Пртемы надобно сразмърить съ обстоятельствами.

Я часто употребляльсте лъкарство, и могу сказать, что не льзя найти лучшаго противы слабости желудка и противы бользней внутреннихы и упорныхы оты оной произходящихы; но ете лъкарство надобно продолжать чрезы многте мысяцы безпрерывно, какы-то можно было ете видыть вы примычанти предшествующемы. Желудосной кашель, о коемы здысь идеть дыло, мометь почитаемы быть зависящимы оты двухы вышеупомянутыхы причины, т. е. оты мокроть собравшихся вы желудкы, и оты слабости сего терева; потому что какы не было приложено старантя кы изгнантю первой причины, то родилась вы больной и вторая оты непомырнаго питья слабаго и водянистаго.)

члень III.

О кашав первномб.

Кто водверженъ нервном у нашлю ?

жонЪ.

(Явереной камель чаще бываеть силитоматическимв, нежели существеннымв; онь почти встрычается только у людей сапорныхв и младенцовь; но какь сій послыдніе довольно оному подвержены, п

какЪ не можно основательно поставить ихЪ вЪ классъ людей, страждущихЪ вапорными бользиями: то надлежитъ различить сей кашель отъ того, которой составляетъ предметъ съъдующей статьи.

Мереной кашель бываеть сухой, такъ какъ и чемъ сиз желу доснои; но первой съ перехватами, и вмъсто то-ствуеть го, чтобь быть яснымь и звонкимъ, такъ какъ первой, стъ желу-онъ вмъсть звукъ томной, кажущійся идущимъ из-дочнаго далека. Впрочемъ, онъ нападаеть по приступамъ, кои кашая возвращаются часто по порядочнымъ пертодамъ, какъ-то чрезъ столько-то и столько часовъ прежде или послъ объда, послъ сня, передъ сномъ и проч.

Во младенцах в можно бы было его смвшать св думиго удушьемв, о коем в говорено будет в в в в з сей гла- денцов от вы, ежели бы сей последній кашель не был в доволь- удушья, но означаєм в удвоеніями, кои не примечаются в в червном кашль.)

Пользование нервнаго кашля у взрослых в и у младенцов.

Упомянутыя въ предыдущихъ членахъ лъкарства пищеунобыли бы совсъмъ противными въ семъ: великое лъкарство требление.

тутъ есть оптумъ. Но надобно сперва приказать больному, чтобъ онъ перемънилъ воздухъ и пошелъ житъ
въ деревню, ежели живетъ онъ въ городъ. Сте наставленте столь же нужно и въ удушът, какъ-то
мы покажемъ ниже, въ § 3. Далъе, надлежитъ ему предпринимать столько тълодвижентя, сколько силы его
позволятъ; а младенцовъ надобно выносить каждой
день на вольной воздухъ и носить ихъ: обоимъ же
падлежитъ вымывать въ теплой водъ руки и ноги; умовента
сте умовенте особеннымъ образомъ будетъ содъйствовать къ утолентю сего вида кашля.

Между тъмъ надобно предписать болеутолитель волеутоныя; но вмъсто мыльных пилюль, парегоритескаго нывь-Н н 2 эликсира и проч. кои не что иное суть, какъ примаскированной опгумо, надлежить давать десять, пятнатцать, дватцать, дватцать пять каплей лаудана ликвида, болье или менье, глядя на обстоятельства. Больной должень ихъ принимать, когда будеть на постели, или когда кашель будеть его безпокоить, такъ какъ предписано въ главъ 18, примъч. 3 сего Тома.

ЧЛЕНЪ IV.

О симитоматическом в кашав.

Когда кашель есть следствием другой бользни, то его не можно выльчить, естьли наперед не выльчена будеть та бользнь, от коей онъ произошель.

О кашль, слъдстви проръзывания зубовб.

Надовно И шакћ, когда кашель произошель отв труднаго песлабить зубопроръзывания, то надобно послабить животь, наднадовк- съкнуть десны (6); сдълать наконець все то, что нуть десны.

Что такое (6) Т. е. пораспроръзать ланцетомъ десну, отворить кожу и дать надсъканіе: проходь зуву: симъ средствомъ разверзается ножа и отнимается толь больза оть больза оть больза оть, которую чувствуеть десна и близь лежащія него. части, и исторая одна есть причиною множества нещастій, соєдитенных в съ зувопроръзываніемь, т. е. когда зубы сами собою пр рызываются. И такъ сія операція весьма важна; потому что она предупреждаеть и льчить здъсь упоминаемый сочинителемь кашель, а наипаче корчи, кои убивають толь великое число младенцовъ.

Минута оное производить. Но для благополучнаго окончанія сей операціи надобно се производить только тогда, когда зубь, такь сказать, изь десны наклювывается, т. с. тотда зубь, тотда кожа десны, зубь покрывающая, столь утончилась, что можно совершенно оной видьть сквозь десны: потому что ежели сія операція произведена булеть ранье, то опасно, чтобь сдъланная ланцетомь раночка не стала заживать, прежде нежели зубокь вышель; и тогда боль будеть еще большая по той причинь, что рубцы раны дълають кожу жесточайшею.

спосившествуеть къ легчайшему выходу зубовь изъ де ень: это только одно остается средство уполить кашель, какъ-то мы будемъ говорить въ Томъ IV, главь 51, § 11, гдъ толкуется о трудномо зубопроръзывании.

О кашав, савдствии глиств.

Также, когда очь произошель оть елиств, то одни токмо лькарства елистовыгонятельныя, горькія, масляныя промыванія и проч могуть его выльчить, каковыя мы предписываемь въ Томь III, главь 30 тол-кующей о тереях или глистах в.

О кашль, слъдстви беременности.

Женщины весьма подвержены кашлю въ послъднихъ мъсяцахъ ихъ беременности. Сей кашель обыкновенно выльчивается кравопусканіями и нъсколькими легкими тистительными. Далье, онъ должны избъгать яство въпротворныхо, и носить платье только уютное, которое не должны сжимать: впрочемъ мы отсылаемъ къ IV Тому, главъ 50, § 3, гдъ толкуется о беременности.

О кашль, предшествующем в признакь подагры.

Кашель бываеть не токмо следствиемь другой бользии, но еще и предвъстникомь будущей. Симь образомь подагра часто предвозвъщается неугомоннымь кашлемо, которой мучить больнаго за многие дни прежде перваго приступа оной.

Н н 3

КакЪ

Между пъмъ, пока кожа не довольно еще упончилась, и даже для достижения до сего степени тонкости, можно често въ день касатьея зуба грецною губною, обмоченною въ смъси шеплой воды, молока и меда; даже можно туда же прибавить нъскольно каплей лаудана ликонда. Далъе, весьма корешо вложить въ уста младенца глот къ упомянутой смеси и стараться, чтобь онъ, скольно можно, белъе провержиль въ устажъ; а чтобь онъ и мосолиль, то дамъ ему палочку солодии и проч.

КакЪ сей кашель обыкновенно проходитъ при его выльпервомъ приступъ по дагры, то надобно его произвеетоитъ въ сти; на сей конецъ, коненности надобно держать въ темъ, темъ, давать больному теплыхъ питй, руки и нобудить и солью, какъ- то мы будемъ говорить пространнъе подагры. въ Томъ III, главъ 33, ∫ 1. Что касается до кашля, произшедшаго отъ слабости послъ бользней, то мы отсылаемъ къ примъчанію 5 сей 20 главы.

§ 3.

О удушьв или о кашлв св удушьемв.

Ръдко случается видъть, чтобъ удутье пристаболье всевало къ вэрослымъ; но оно насто бываетъ пагубнымъ жены для младенцовъ. Тъ, кои питаются яствами водяниудушью. стыми и безсвязными, кои дышатъ воздухомъ нездоровымъ, кои не предприемлють довольнаго телодеижения, весьма подвержены сей бользни и вообще наиболье ею обезпокоиваются.

причины. Сія бользнь толь извъстна, даже кормилицамЪ, что безполезно ее описывать. Все то, что можеть помьшать пищеваренгю, разслабить твердыя, располагаеть къ удумью.

чаень І.

Пищеупотребление, кое на добно предписывать в в удушьв.

Въ слъдствие чего, для излъчения сей бользии пользовани. надобно очистить желудоко, укръпить его, усилить твердыя, и тогда же содъйствовать испаринь и возбуждать друга отдъления.

яства для Яства должны быть легкими и плобоваримыми: малольт доброй былой хльбы вареной вы воды, или пртуготоных вленной вы супы, цыплячій бультоны и всы другія кушанья.

шанья, кои вдяшь ложкою, притодны въ семь случав для дъщей.

Но что касается до техь, кои повзросьте, то для ээронадобно имъ давать кашицы изб сагу; и ежели въслейнихънихъ немного только ликорадки, то маленько и варенаго ципленка, или другаго какого бълаго мяса.

Вмъсто пишья давать имъ иссоповаго или пу-пишье лейнаго настоя, подслащеннаго медомъ и леденцомъ, пли небольшимъ количествомъ сыворотки съ виномъ. Ежели больной слабъ, то можно ему время отъ времени давать по нъскольку легинъкаго негуса.

Из в числа наилучших в лакарств в в удушив есть перемена неремена воздуха. Часто одно только это выльчива- воздуха есть лесть бользнь, даже и тогда, когда челов в перехо- наретво в дить из воздуха чисть й шаго на не столь чистой; удушь что без в сомнения может в зависеть от в того, что больной покидает в место заразы: нотому что большая часть младенческих в бользней заразительна или прилипсива.

Не ръдко случается видъть сію бользнь сви- оно приръпствующую въ цъломъ городъ или деревнъ, между минчивотъль какъ въ другой въ маломъ разетояніи находящейся и слъда оной нътъ. Какъ бы то ни было,
только это дъло мы совершенно знаемъ: и такъ не
надобно терять времени; и какъ скоро младенецъ или
взрослой получить сію бользнь, то отводить его на
иъкоторое разстояніе отъ того мъста, гдъ она свиръпствуетъ, и, ежели возможно, выбирать воздухъчистъйшій и тепльишій (с).

ЧЛЕНЪ

⁽с) Изноторые люди думають, что тогда только больному надобло перемънять воздухъ, когда бользиь уже будеть въ своемь исходъ. Это мизние кажется не озновательно; потому что видывали больныхъ, кож

членъ п.

Пъкарства, кои на добно предписывать во удушьв.

Когда и СКОЛЬКО разъ должно пускашь кровь?

Когда бользнь сдълается усильною, и больной находиться будеть въ опасности, чтобь не задохнупься, по надобно ему пустить кровь, а наипаче естьли есть лихорадка (жаръ), и естьли пульев жестокв и полоно; но какъ при кровопускании первымъ предметомъ есть то, чтобъ предупредить разрывъ кровавых в сосудцев в в легкихв, то рылко случается имьть нужду вЪ повторенїи сей операціи. Однако ежели боавзнь соединена со знаками воспаленія во легкихо, то сторое и даже третіе кровопусканіе могуть быть нужными, такъ какъ мы показали въ примъч. 3 сей главы.

Рвошныя въ ономъ полезны. Для чего ?

Когда больной блюеш в в в какое нибудь обыкновенное припадочное время, то почитается добрымь признакомЪ; потому что какЪ желудокЪ тогда очищается, то и кашель много уменьшается. И такъполезно возбуждать рвоту, давая пишь настоя съ ромашковыми цеттами, или шенлой воды; а когда еїн средства не удадутся, то прибавляя по малинькимъ пріемцамъ ипекакуанги. Младенцу от в трехв или четырехв льтв надлежить давашь ипекакуанги пяшь или шесть грановЪ, болъе или менъе, сразмърно съ возрасшомъ и силами; или дашь рвотнаго юлепа, какого рецептъ можно найти во всеобщей таблиць, въ Томь V.

СпособЪ давать инекануанпамъ.

ДавЪ младенцамЪ реотнасо, весьма трудно поишь. Я часто видаль, что можно ихъ обмануть, гу младен- настоявЪ скрупуль, или полдрахмы ипекакуанги BE

нои от в перемъны воздуха телиную получали пользу во встхъ періодахъ бользии. Не довольно того, чтобъ больной днемъ выдиль въ повозкъ или нарешь: сіе сред шво ръдно бываеть снасательнымь, и даже часто больнаго подвергаеть насморну.

въ фунтъ горячей воды. Ежели сїя настойка примаскирована будеть небольшимь количествомь молока и сахара, то они пьють сїє пишье вмѣсто чая, да и пьють съ охотою. Ея дается по малинькой чайной ложечкъ чрезь каждую четверть часа, или чрезь каждыя десять минуть; какъ скоро она начала дъйствовать, то не нужно болѣе ихъ поить; потому что у нихъ довольно воды въ желудкъ.

Реотныя не токмо очищають желудокь, кото-другія вырой вь сей бользни засорень бываеть мокротами вяз-годы оть
кими; но еще производять испарину и другія от де- вь сей боленія: и такь должны они быть повторяемы по на- лезни.
пряженности припадковь и упорности бользни.

Однако не надобно имъ быть слишкомъ спльнымъ: имъ налегкія рвотныя, часто повторяемыя, не столь опасны, добно быть легно дъйствительные сильнышихъ.

Какъ у больнаго обыкновенно бываетъ запорд, Сиропъили то надобно слегка послабить ему животъ. Наилучийя тинктура слабительныя въ сихъ случаяхъ суть ревень и его прі- уготовленія, какъ-то сиропо или тинктура ревеневая.

Сего дается малольтным дътям по одной или приемы по двъ кофейной ложечки два или три раза в день, для мало- по обстоятельствам д.

Когда они повзрослъе, то по соразмърности Для взрои пріемъ повторяется, пока получено будеть желаемое дъйствіе.

Тъмъ, кои не хотять принять сей горькой другой тинктуры, надобно давать настоя съ Ялександрии способъ посмабскимо листомо и терносливомо, которой подсластить нать жисманного, кассона домо, или медомь; или давать реветя воть нъсколько грановъ въ порошкъ прикрытыхъ въ одной тъмъ, нож или двухъ кофейныхъ ложечкахъ сиропа или желея см. смородиннаго, дабы отъ нихъ скрыть вкусъ. Величай-

шее число младенцевь лакомы къ сиропу, къ конфектам в проч; и ежели лъкарства будуть ими прикрышы, що, сколько бы они прошивными ни были, ръдко отбрасывають ихь (7).

Почти вездъ думають, что лекарства масляныя, масляныя, грудныя и бальзамитескія имьють чудныя силыкь изльгрудныя не годется ченію удушья: в в следствіе чего обильно их в дают в въ сей 60- больным в всякаго возраста и всякаго телосложения. авэни. Для не разсуждая, что всв вещества, имвющія сіи каче-Mero ? ства, засаривають и обременяють желудокь, мъшають пищеваренію, и, но необходимому слёдствію, отягчають бользиь, такъ какъ мы показали въ 4 примъч. сей главы.

Клопорты или мокрицы весьма похваляющся вЪ Клопоршы; сей бользни. Тъ, кои похотять употреблять сихъ наспособЪ ихъ упошсекомыхв, должны ихв принимать следующимв обраребляшь. 30M7:

> Возьми мокрицо живых вымышых дв унцін; истолки ихъ въ иготи; положи ихъ въ фунтъ легкаго бълаго вина и оставь ихъ настаиваться чрезъ всю ночь; по том в процеди вино и давай по столовой ложкъ три или четыре раза въ день.

> > Ино-

минеральнаго нермеса.

Польза от (7) Удивительно, для чего сочинитель умолять здёсь о минеральном вермесь, которой въ сей бальзии двойную доставляеть выгоду, т. епроизводить реоту и слабить нанизь, а наипаче дътей, котя бы данъ былъ по малому пріему, нанъ то по четверти грана для одноатыняго младенца, по полуграну для двултыняго и проч, повторяемых в одинъ или два раза въ день. Я часто видаль, что удушье прожодило от перваго пріема.

Канъ нажобно его garams?

Младенцамъ сто явкарство дается въ большемъ или меньшемъ количество сакара въ порошко, въ ложко воды. Сверькъ того онъ имбеть свойство умножать силы, возбуждать обильны шую испарину, пособлять мокротомарканію и вызывать наружу мочу.

Однако надобно признаться, что онъ не пригоденъ въ тъхъслучаякъ въ коихъ солоти больнаго имвють много упругости.

Иногла болеутолительныя бывають нужны для когда наутоленія кашля. ВЪ семЪ случав дается немного ма- м бно даковаго или діакодіева сиропа; пять, шесть или семь утомилаудана ликвида, глядя на возрастъ и тельныя? темпераменто больнаго. Сти болеутолительныя даются въ чайной чашкъ иссопнаго или пулейнаго настоя, и повторяются, ежели нужно (d).

Сеснотная мазь есть весьма обыкновенное лекар-чесночизя етво въ Шотландіи противъ удушья. Она дълается мазь, коею такъ: возьми тесноку; истолки съ равнымъ количе- дошвы ствомъ сала въ иготи. Сею мазыю нашираются подо-ногъ и упошвы ногъ два или три разавъдень. Но наилучшій спо-требліть еобъ употреблять ее состоить въ томъ, чтобъ раз-пластыря. гладить ее на тряпицъ и приложить на подобте пластыря. Онъ смъняется новымъ пластырель каждой вечеръ и утро; потому что тесноко скоро теряетъ свою силу. Это есть превосходное лекарство противЪ удушья и прошивъ большей части другихъ упорныхъ кашлей.

Однако не надобно сей мази употреблять, когда боль- Сбетодной разгоряченъ, или имъетъ расположение къ лиход- тельства, ка; потому что она умножить сти припадки.

она пропивна.

Ноги надобно держать въ теплой водъ одинъ умовенія разъ чрезъ каждые два или три дни, и прикладывать ногъ, и между плечми пластырь из Вургонской смолы, так в пластырь какЪ мы предписали выше, вЪ § 2 сей главы. Больной гонской долженъ держащь сей пластырь во всю бользнь.

> Ho 002

⁽d) нъноторые практики похваляють цикупной или волиголовной эк- Цикупной странть (ехигасит de сісита), напъ чудесное авнарство пр тивъ энстрантъ улушья; но, сколько могъ я примъщить, онъ ничьмъ не лучше ничьмъ опіума, которой, когда употребляемъ бываеть, часто утоллеть пора не лучие зишельнъйшие припадки сей бользии.

нарывное. Но ежели удушье усилится, то вывсто сего пластыря надобно приложить нарывное и продолжать нагноение нагнаивательного мазыю.

Время давать хину
в горечи.

Когда бользнь сдълается упорною, и у больнаго ньть
вать хину
в горечи.

Когда бользнь сдълается упорною, и у больнаго ньть
вать хину
ньйшими лькарствами. Хину надобно давать въ существъ, т. е. въ порошкъ; или въ дехоктъ, въ настоъ
и проч. по вкусу больнаго.

Пріємь для Когда она дается въ порошкь, то пріємь для магденца прановь, плядя на возрасть, принимаемых в три или четыре раза въ день въ небольшомъ количествь сиропа, или между двумя ломпиками бълаго хльба.

пріемъ для всрослаго состоить от полудрахвэрослаго мы до сорока осьми грановь, повторяемых шакже три и четыре раза въ день.

Ежели она дается въ декоктъ, то надобно ее варить двъ драхмы въ полфунтъ воды чрезъ четыре или пять минутъ; по томъ процъдить и выпить младенцу сте количество за два раза въ день. Для взрослаго пртемъ дать вдвое.

мое только е только одинь экстракто съ порошкомъ шпанскихо мухо; но одинъ лънарь мо- томо Лъкарь распоряжать можетъ симъ лъкарствомъ: жетъ потому что оно требуетъ многаго свъденія и остопредпи- рожности.

Везопаснъе давать нъсколько грановъ бобровой етруя съ струи съ хиною. Пріемъ для младенца отъ шести до пріемъ для семи льть состоить въ семи или осьми гранахъ бобромаганца. вой струи и пятнатцати гранахъ хины въ порошкъ. Изъ сихъ двухъ веществъ дълается смесь съ помощію двухъ или прехъ унцій простой коритневой воды или

раза въ день.

Сокраще вообще есть упорная бользнь; часто сокращение продолжается многіе мьсяцы, а особливо когда ванія больной не выведень быль вначаль на иной воздухь, удущья какь-то предписано выше, или льчень быль ль-карствами противными, или хотя и предписанными, но употребленными безь порядка: и такь весьма нужно вы точности сльдовать тому порядку, по которому показаны лькарства вы семь члень.

Почему сперва надобно отворить кровь, ежели признаки, показывающее сте выпоражниванте, примъчаются явно; произвести рвоту ипекакуангою и прочистить. Ежели удвоентя не теряють напряженности, то дать болеутолительных съ предосторожносттю, каковой требують сти лькарства. Ежели дъйствтя ихъ мало или и совсъмь не примътны, то надобно приступить къ теснотной мази, къ пластырю изб Бургонской смолы, къ нарывнымо, а хину и бобровую струю отложить до упорныхь случаевь, кои не уступають предложенному нами образу пользовантя.)

TAABA 21.

О воспалении желудка и других в терево подбрюшия.

Всякое воспаление первых путей опасно и тре-сін вользовуєть скорьйших и двиствительныйших в пособій; по-ни опасны тому что оно часто кончится нагноением , а иногда и требусить сновить огнем , оть котораго послыдуєть негрых в посовим двинуем смерть.

§ 1.

ocument and morn to o govern to the contract contract

О воспалении желу дка.

ЧЛЕНЪ І.

Присины воспаленія желудка.

Фбщія причины. Воспаление желу дка можеть сдълаться оть всёхь тъхь причинь, кои причиняють воспалительную лихорадку (горятку), какь-то питье холодныхь напитковь сторяча, остановка испарины, внезапной уходб внутрь какой нибудь высыпи и проч.

Особенныя иричины. Оно можеть еще произойти оть вакости жели, или оть веществь острыхо, вакихо и разаражательныхо, находящихся вы желудкь, оть очень сильных реотныхо и проиосныхо, оть разбедательныхо ядово и проч. Поднявшаяся кверьху подагра оть простуды, или оть унотребленія противныхь лекарствь, часто также причиняєть воспаленіе желудка. Вещества жесткія и несваримыя, остановившіяся вы семы тереве, какы-то кости, косточки изь плодовы и проч. могуть также произвести сію бользнь.

ЧЛЕНЪ И.

Признаки воспалентя желу дка.

Воспаление жолудка соединено съ одномъстною болью и со жгучимъ жаромъ противъ желудка, съ без-соиницею и тоскою; пулься маля, частъ и жестока.

Больной блюеть, или по крайней мъръ чувствуеть тошноту и позывы на звоту; онъ непомърную имъеть жажду; конестости его холодны и дышаніе трудно; пото у него проливной, а иногда бывають корси и облюроки; желудоко раздувается, часто кажется жестъимъ на ощупь.

Характеристическим в признаком в сей бользии харантеесть бользненное чувствование, испытываемое больристические приным всякой разв, когда он в проглатывает в что низнаки. будь твердое, или жидкое, а особливо естьли его питье, или яства слишком в горячи, или слишком в холодны.

(Желудоко еще подвержень боли острой, ръжу-желудочщей, коей дано имя желудогная колика: она по больщой части зависить оть вътрово и коргнаго состояваеть нія. Она узнается изь довольно ощутительнаго разду-предвозвътія и частыхь отрыжекь. Сія бользнь, когда не сощающимъ единена сь лихорадкою, пользуется лъкарствами горякомь, тительными и антиспазмодитескими (противукоргными), каковыя сочинитель предписываеть въ члень І, § 3 сей главы; но когда она соединена сь лихорадкою (жаромо), то надобно онасаться воспаленія, о коемь здъсь идеть дъло.)

Когда больной извергаеть ртомь все имъ про- Признаки глатываемое, какъ питье, такъ и яства; когда без-опасные сонница вей не проходить; когда есть икота; накомець когда пулься перемежается и припадки слабости учащаются: то онь въ величайтей опасности.

(Прежде дальнъйшаго чтенія читай главы і и 2 сего Тома.)

ЧЛЕНЪ Ш.

Пищеўпот ребленіе, кое на добно предписывать в вос-

Надобно избъгать съ величайшимъ стараніемъ пи- Опесность тій и яство горясительныхо, вакихо и разаражатель- от привести въ погръшниковъ ныхо. Слабость больнаго можеть привести въ погръшныхъ въ ность предстоящихъ и побудить ихъ дать ему вина, сей больсть спиртныхо напитково или другихъ крвпительныхо; но ни-

еги лъкарства только что отягчають бользив, и часто причиняють внезанную смерть.

(Обыкновенныйшая причина малоуспышности вЪ Обынновенная причи-пользовании сей бользни есть ложное мнъние, будто на малоуспъщно- всв сильныя боли желудна, или кишоко происходящь всегда отвовтровд. Какв скоро кто жалуется на боль, то въ пользо-приближенные его тотчасъ бъгутъ за анисовою во дою, вакіи восза скубакомо, за водкого, кирквассеромо и проч. Больпаленія желудка ной, правда, иногда получаеть облегчение; но оно не надолго; и у всъхъ бользнь шьмъ усильные становишея, чыть болье они вышили сихь спиртных в напитково: и такъ весьма нужно съ крайнею разборчивостію разсматривать характеристическіе признаки, описанные выше сего, и сносить их в съ тъми, кои означають ветряную колику, которую ны опишень посль. вЪ § 3, членъ І сей главы.)

Опасноени Позывы на ресту могуть также обмануть приэть расткыхь. но побудить ихь кь тому, что они почтуть рестиных нужными; но они съ не меньшею скоростію умерщеляють.

Канів дол
Яства должны быть жидкія, легкія, прохладижны быть тельныя и удобоваримыя. Надобно их в давать по малому количеству, и так в, чтоб в они не были ни
очень теплыми, ни очень холодными; легкая катица
из в ястеня или овса, легкой хльб в, испеченной и
распущенной в в горячей вод в, или цыплячій бульюн в
весьма слабой, суть яства весьма приличныя.

питья. Вмъсто нитья надобно давать процеженной сыворотки, ягной воды, съ хлебом или сухарями настоенной воды, или настоев , декоктов съ мястительными растеніями, каковы суть солодка, корень рожи,
сассапарелли и проч.

ЧЛЕНЬ IV.

Пъкарства, кои надобно предписывать во воспалении желу дка.

Кросопускание въ сей бользни необходимо нужно; оно почти одно только лькарство, отъ коего въ прововависить успъхъ. Ежели соспаление желудка не усту-пускание
паеть первому кросопусканию, то часто бываеть
нужнымь повторить ейю операцию, и развъ одна только
малость пульса можеть возпрепятствовать оной.
Пульсо обыкновенно возвышается послъ первыхъ
кросопусканий; и доколь примътно сйе возвышение
пульса, то можно пускать кровь безъ опасения (1).

Частыя припарки теплою водою, или декоктомо принарки.

изъ мястительных растений, равно полезны: въоных вобмачивается фланель, которая полагается противъ желу дка и сивняется другою, когда начнетъ подсыхать

Не надобно прикладывать их в ни слишком в го-им валоберячих в, ни дожидаться до того, чтоб в он в совсым в слиш-простыли: потому что излишній холод в и излишняя ком в хо-ипеплота равно противны в в сей бользни.

лодным в ни слиш-

Jones II.

Пп

(ВЪ ком 5 горя-

И такъ ежели послъ перваго провопускания и послъ нъсколькихъ часовъ употребления припарокъ и здъсь упоминаемаго умовения ногъ пульсъ не умягчится, то надобно приступить но второму, и даже къ третьему провопусканию, естьли сін повторяемыя средства (нотому что ихъ надлежить употреблять всъ вдругъ) ветаются недъйствительными.

⁽¹⁾ Иной удивится тому, что мы толь усильно настоим забев на для чего: провопускание, предписав их в св толикою предостор жностію вы большой части предыдущих вользней. Это по той причин, что воспаленіе желудка наипаче означается крайним сжатіем во всей со-гудочной систем ; что без сомньтія происходить от превеликаго иножества неров, входящих в в состав желудка, гибало сего восмаленія. Но великим добить против сего сжатія суть развлавнія. Но великим добить против сего сжатія суть развлавлятельныя, между коими провопусканіе занимаєть первое м вста и очевидными знаками сего сжатія суть жесткость и малость пулься, соединенныя св різвостію.

тренія впа- (ВЪ сихЪ случаяхЪ одно лѣкарство намЪ вестма прина же- много служило, а имянно тренія кѣста противЪ же- лудка сухою рукою, или о моченню вЪ какомЪ нибудь млетительном декотть и проч. Сін тренія дѣ- лаются всякой разЪ, когда прикладываются, или воз- обновляются припарки.)

умовение Ноги и голени надлежить почаще мыть теплою ногь, горя- водою; къ подошвъ ногъ прикладывать горячие кирпичие кирпичи, или катаплазмы.

женилизмы нъ нозоващься, буденть весьма полезна.

Изъ числа наплучшихъ лькарствъ, какія я тольпольза стъ ко знаю противъ сей бользии и противъ всъхъ друнарывнаго гихъ воспалении первы в путей, есть пластырь наплана больнемъ извето знаю применой, приложенной къ больному
сть. мъсту. Я его часто употреблялъ и никогда не видълъ того, чтооъ онъ больнаго не облегчалъ.

Въ разсуждени внутреннихъ лъкарствъ въ сей бользни мы можемъ присудить только легкія промиванія. Ихъ надобно составлять только изъ тепълой воды, или изъ легкаго овсянаго денокта; и ежети у больнаго запоръ, то прибавить туда нъсколько масла изъ сладкаго миндаля, меда и манны.

Сколь они

Промыванія слукать выбето внутренних приволезны вы парока, легко послабляють животь, и вы то же вреей бользим:

мя пипьають больнаго, которой часто вы сей бользни не можеть удержать никакого летва вы сей бользни: и такь ихь никогда не надобно опускать; потому что оть оныхь жизнь больнаго можеть зависьть.

не надобно (ВЪ сей бользни не надобно скоро покидать лыен ропона карства; надлежитъ болямъ пройти, по крайней мыжить 15върства въ ръ спустя два или три дни. Нъкоторые больные остаоставили лъкарства, какъ скоро не стали болье чув-сей бользствовать боли; но какъ она только что, такъ ска-ни, но прозать, уснула, то встала съ большею яростію и все-пищеупогда съ опасностію для больнаго: почему нужно больно-требленіе му, по выздоровленіи отъ сей бользни, наблюдать діз- и по выздоту по крайней мъръ поболъе недъли.

Когда бользнь миновалась, и больной вступиль въ выздоровление, то надобно его пользовать такъ, какъ предписано въ главъ 2, § 3 сего Тома.

Другія бользни желудка сушь боли его, потерл аппетита, непищевареніе, тошнота, изгага, о коихъ толкуется въ Томь III, главъ 29, 43 и 44.)

\$ 2.

🛮 воспалении кишоко или нижнихо тастей брюха.

Сїя бользнь есть из числа сильный ших в и опа- вользиь сильный ших в и опа- вользиь весьма сильнай и опа- вольнай и опа- вольнай и опа- вольнай и опасная.

Присины воспаленія кишокб.

Оно вообще произходить оть техь же причинь, оть коихь воспаление желудка: запоро, глисты; незрымые плоды, събденные вы великомы количествь орбжи, выпротворное пиво, какы-то старое але, или старое закупоренное вы бутылкахы пиво, молодое вино и кислой сидро, могуть причинить стю бользнь. Она еще можеть приключиться оть грыжи, оть сцирритескихо желеаково вы кишкахо, или оть сроста ихы сторонь сы другими, оть камил составляющагося вы кишетномо каналь и проч.

Воспалению кишоко даны различныя имена: оне различныя названо иліатескою болью, энтеритисомо и проч. по мы имена сей, сту, вы коемы чувствуется боль; иногда называется нань - то и и г

натическая сще воспалительного коликого, вольвулювомв, коликого боль, энте- мизерере и проч; однако, как в пользование почты одно ришисъ, и то же, въ какой бы части кишотнаго канала ни навоспалиходилася бользнь, то мы почитаемь за лучшее остательная вишь всв еги разделентя, бояся, чтобъ не привесты, нолича. мизерере, въ сбивчивость читателя. BOABBY-

лусь и проч

ЧЛЕНЪ П.

Признаки воспаленія кишокв.

Признаки воспаленія кишоко почти такіе же, какіе въ предвидущей бользни.

Признани

Единая разность состоить только въ томь, особенные что боль острве, да и находится она пониже, около пупка; брюхо перехвачено бываеть какь бы веревкою; запора упорень; пульев таеть, маль, томень, потерянной; жаж да непомърная, и жаръ весьма великой; рвота также сильнъе; больной верхомъ извергаетъ обильно матерію водянистую, по томъ пънистую и вкусу прошивную; за сею матеріею следуеть желта острая, развыдающая глошку; наконець больной иногда выкидываеть ртомь пометь, промыванія, свытки и проч. (2); онъ безпрестанно пускаеть вътры верьхомв, и часто терпить останоску моги.

Kor-

Признаки хараншерасшиче-CHIE-

Я знаю, говорить Г. ле Роа, что вст писатели утверокдають, булто раста пометомь означаеть имаческую вольжив; но що извыстно, что нъкоторые больные погибали часто въ сей бользии, не изблевавъ такой матеріи, и чно подонки желчной матеріи, изверенутой ртомъ, есть постоянный знакъ и бывающий въ началь бользни. Сін желчныя машерін въ сихъ случанхъ бывають густыми, нлейкими, часто двет итемнозеленаго, и опускають на дна искоторой подсёдь такого же цавша.

⁽²⁾ Г. Буханъ говорить иногда; потому что извлечание помета не есть существенное сабдствие сей бользии, хота большая часть писателей утверждають противное: некоторыя осспаленія вишовь были таиія, въ коихъ такой реотья не было; а въ другихъ бользияхъ она обнаружилась. Впрочемъ она тогда только бываеть, ногда пометь севстыв остановился.

Когда боль переходин в съ свосто мъс па, реота признана мюлько бываеть по перемежкамь, а промывания про- благопришли низомь, то можно доброе заключить о бользии.

Но ежели больной извергаеть ртомь промыва-признания иля; ежели крайнъ ослабь; ежели пульед у него малд опасные.
к дрожащий; ежели онь блъдень; ежели дышание его противно и зловонно: то основательно можно опасаться, что бользнь кончится нещастиемь.

Пото влакой, помето черной и зловонной, со признани влиненной съ пульсомо перемежливымо и совершен име имъ престаніемъ боли, суть знаки начавшагося уже антонова огня и близкой смерти.

(Прежде дальнъйшаго чшенія чишай і и 2 главы сего Тома.)

ЧЛЕНЬ III.

Пищеупотребление, кое надлежить предписывать тыль, кои больны воспалением кишокь.

Пищеупот ребление на сию бользны есть то же, такое же, которое мы предписали на соспаление желудка вы чле- накое вы нь II, § 1 сей главы. Надлежить больнаго держать вы воспаление поков, оберегать от простуды, и удалять все то, что можеть возбудить страсти вы душь. Яства должны быть весьма легки и даваемы по малому количеству; питье мокротожидительное, какы- то проць-женнал выворотка, ятная вода. и проч.

ЧЛЕНЪ IV.

Припретва, кои на добно предписывать вб воспале-

Жровопускание въ сей бользни, такъ какъ въ вос-нужва зъ палении желудка, крайнъ нужно; оно должно произве-кровону-П и 3

дено быть въ дъйствие, какъ скоро обнаружатся признаки, и повигоряемо сразмърно съ силами больнаго и зъльностью болей, такъ какъ предписано въ примъч. 1 сей главы.

Нарывныя, приложенныя къ больному MBemy.

Надобно тогда же приложить нарывное кЪ тому мъсту, гдъ боль ощутительные; оно не токмо укрощаеть боль, но еще производить толь благополучное дъйствіе, что промыванія и систительныя, кои сначала не действовали, начинають действовать, какъ скоро приложено будеть нарывное.

Припарки и мыванія, умовенія ногъ и проч.

Припарки и славительных промыванія столь же елабитель- важны. Ноги и руки больнаго надобно почасту мыть въ теплой водъ; на брюхо приложить обмоченныя въ шеплой водъ бълыя шряпицы; на пупоко пузыри съ теплою водою, а подъ подошву ногъ теплые кирпити или бутылки сЪ теплою водою.

жны сомыванія?

Какъ дол. Промывания должны составляемы быть из в ятной или етивляемы овсяной воды, из всели, и укрощаемы маслом в извеладкаго быть про- мин даля, или свъжим в коровьим в маслом в. Ихв надобно наставлять по одному чрезъ каждые два или три часа, да и чаще, ежели запор упоренъ.

> (Чъмъ сильные боли, тымъ сильные воспаление: слыдєтвенно и авкарства должны быть кротчае; и такЪ промыванія съ солью должны употребляемы быть шолько сЪ осторожностію и всегда укрощаемы масломб изв сладкаго миндаля.

Мы даже думаемЪ, что промыванія, составляемыя из в мягсительных декоктов в, или склизистых в настоево, еще пригодные, нежели предписанныя изъ маслъ и жировъ: слъдственно надобно предписывать ихЪ изЪ корней рожи, изЪ лъняного семени и проч. кои можно саблать слабительными, ежели нужно, кассівишь по полуголовкъ или и по головкъ мака, смотря на напряженность б ли.)

Ежели бользиь не уступаеть ни промываніямі , когда бови припаркамі, то недобно прибъгнуть кв систимельнымі извъстной силы. Но какь они, раздражая еть нькишчи, часто уміокають сжетіе вы сихь частяхь, карстамь, а чезь то не соотвытствують намыренію, сь како то надобно вымь они предлисываются: иго надлежить соединить ствтельихь сь какими нибудь болеут олительными, которыя выя сь усыпляя боль, и укрощая спазмодитескій сжатія зиболеутошокі, осо еннымь о разомь содыствують вы семь миелучаь систительнымі (3).

Ali-

Надобно взять масла из сладкаго миндаля, или пробанскаго, преніль в разограть его въ приспойномъ ессуда. Когда оно сограєт я, що на- Способъ добно опустить въ со удъ руку и масломъ тереть по брюху больна- употребто и туда и сюда. Когда все масло съ руки взашло въ кожу, що липь ихъ надобно опить его взать и такъ же тереть. Сіл опер ціл продолжается презъ четверть или чрезъ поличаса»

Я вилья живонь послабившимся при первой попытив; но часто нужно бываеть повторить сію оперцію три или четыре разачрезь чась

Ежели прошивь ве наго правдополобіл сін пристойнымъ обра- Налобно зомъ мовторяемых тренія о тан тел безуспьшными, то мы думаемь, употрабовно издобно прежде сильныхь унстипельныхь употребать вани бани лять и особенно удались мять въ разсукде іл одной молодой желідны, ко- цъльных торую нівноторой Харуряв оставиль, почитая ділоть невозможнымь бани, ее опорознить. Я приказаль ее посадить въ ваню, т. е. въ ванну весьма умітренно теллую; она въ ней не могла болье оставиться, такь накъ мат сказано, накъ четверть часа; однако больная, булучи поло кена на постелю, виусила иншину, ноторая заставила ее състь вторично въ ванну. Ей она дана была чрезь два часа, а вышедь оттуб да она везьма довольно испразднилась низомью

⁽⁵⁾ Прежде сих в чистительных, ноторыя, как в - то весьма хорошо Прежде час замьчеть сочинитель, разражая кишки, отнеч ющь бользы, желали ститель-бы мы лучие употреблять масляныя тренія (потиранія деревян-ных на-шимь масломь) по брюху, отв ноих в Г. ле Роз получеть толь ве-добно упо-ликую выгоду, и и и мы сами употребляли съ велинить успъхомь треблянь воть нак производят я сій трекія:

чисти леминое, оказывающее действие въ послаблетельное, ни живота, есть распущение горьких систительных составляемое изъ солей, которое делается следующимъ образомъ:

горыних возьми систительной со и (falis cathartici), пли рецепть. эпсомской соли (falis epsomensis) - - двы унции.

пріємь. Распусти ее въ фунть теплой воды, пли ячной воды.

пріємъ на Сего распущенїя дается по маленькой чайной волеуто- чашечкъ каждые полчаса, пока подвиствуеть.

даваемое тогда же.

Тогда дается по няшнатцати, дватцати, дватцати няти каплей лаудана ликвида въ рюмкъ мятной воды, или простой коришневой для воспрецятствоватія раздраженія и предупрежденія рвоты.

что долж- Кислоты часто останавливали рвоту и утино двлать шали другіе припадки сей бользни: и такъ надобно жовленія подкисливать нитье больнаго винным кампемв, лирвоты: монным соком в, или, ежели сего не случится, рейнским уксусом в.

Когда боль Но часто случается, что больной никакой жид ной ничего кости не можеть удержать въ желудкъ; тогда нане можеть добно прочистить его пилюлями. Я испыталь, что въ желул-слъдующія вообще были весьма успъшны.

чистительное вЪ пилюлахЪ. Грегескаго мыла, довольное количество.

По Лашынъ:

Recipe jalappæ, --- } ana grana triginta,

Opii, --- granum vnum,

Saponis alicantini, quantum satis est.

Истолки въ порошокъ ллаппъ и опгумъ; смъшай; сдълай изъ нихъ тъсто съ помощію Грегескаго мыла, и-раздъли ни пилюли болье или менье великія.

Больной долженъ принять ихъ всъ вдругъ за пріемъ. разъ, или проглошить одну послъ другой; и ежели спустя нъсколько часовъ онъ не подъйствують, то надобно повторить тоть же пріемъ.

Ежели при всвх сих средствах больнаго не цъльная слабить, то надлежить его опустить вы теплую теплая 62-воду, так чтобы вода доставала до груди. Я ви-ня. двль от сего средства успвх , когда всв другія оставались недвиствительными. Больной должен оставаться вы вод столько времени, сколько силы его позволять; и ежели первая баня не произведеть желаемаго двиствія, то употребить должен вторую, как в скоро справится съ силами. Гораздо выгодные и безопасные употреблять многія бани, нежели оставаться долгое время вы той же, и часто нужно бываеть припиматься за них много разь, прежде нежели произведуть они двиствіе.

Были примъры такте, что по употребленти во-покуситще всъхъ родовъ лъкарствъ для опорожнентя, послъ тельное
довалъ успъхъ отъ погружентя нижнихъ констностей средство,
больнаго въ холодную воду, или расхаживантя босыми налъются
ногами по мокрымъ кирпичамъ, или отъ облиття хо-выпорозлодною водою ногъ и лядвей; и ежели всъ другтя
нато,
средства остались безуспътными, то по крайней мъръ на это можно покуситься. Правда, оно не безъ
опасности; но въ сихъ отчаянныхъ случаяхъ лучте
нокуситься на неизвъстное лъкарство, нежели не употреблять никакого.

Въ отчаянныхъ случаяхъ обыкновенно дають сыр и мерсыраго меркурія, т. е. ртути. Ес дають по многимъ курій, т. Гомб II. Рр унціямь, даже по фунту; но далье никогда не на-

когда есть причина опасаться антонова осня вы животь, то не надобно покушаться на стелькарство; оно, не вы состояти будучи тогда выльчить болько анто ускорить смерть: но когда сотонова от бранте и перепутанность китока ссть такого свойства, что силою можеть расправиться, то меркурги тогда не токмо бываеть пристойнымь лыкарствомь, но и наилучтимь, какое токмо предписать можно; потому что изы всыхы намы извыстныхы веществы оны удобные проходить сквозь китоской какала.

что налоб- Ежели бользнь произошла от грыжи, то нано делать, добно стараться выправить кишку. На сей конець
когда госпалене ки- больной кладется такимы образомы, чтобы голова у
шоль про- него была весьма низка, а вышедшая кишка слегка поизошло жимается пальцами и рукою. Ежели это средство,
оты грыпромывантя и припарки останутся недыйствительжи:
ными, то нужно прибытнуть вы хирургической операціи, которая одна только можеть тогда облегчить больнаго. (Но одины токмо опытной Хирургы
можеть опую производить.

Сколь ну
ВЪ сей бользни паче всего надобно разсматжно сперва изслъва изслъдывать, надобно производить съ великимъ старантемъ; потоньть ли уму что она не всегда примътна бываетъ, а наипаче
б льнаго у женщинъ. Надлежатъ щупать не одни только паки

⁽а) Когда мервурій (ртушь) даенся по велиному прієму, що онъ не произволить дъйствій; потому что онъ, оттягивая своею тяжестію дно желудва внизь, не можеть пройти сивозь пилорь, т. е. то нижнее отверстіе, исторое ведеть изь желудва вы вишан, такъ изив мы пеназали въ Томъ I, главъ 2, примъч. з. Въ семъ случат надобно больнаго приподнять иверьку за ноги, дабы онъ могъ высинуть ртуть ртомъ.

жи и мошну, но и все брюхо; потому что можеть быть грыжа во всей сей впадинь, какь то показано будеть въ Томъ IV, главь 54, § 3. Какь скоро узната будеть грыжа, то надобно ее вправить, т. е. вставить кишку, такь какь сказано; это одно только остается средство, да часто въ другомъ и не бываеть нужды.)

ЧЛЕНЬ V.

Средства предохранять себя отд воспаления кишокд.

Кто хочеть избъгнуть сей жестокой и опасной избъгать бользни, то не должень долгое время оставаться не запора. ходя къ стулу; потому что въ кишкахо шъхъ людей, для чего: кои умерли отъ сей бользни, находимы бывали многе фунты спектагося и затвердъвшаго помета.

Онъ не долженъ веть неспълыхъ плодовъ; не неспълыхъ долженъ пить старыхъ вътротво риыхъ напитковъ и плодовъ, проч. Я видълъ, что великое количество испечен- вътротыхъ ныхъ въ печи плодовъ причиняло сто бользнь; пото-изпит- му что симъ образомъ вдятъ только не очень хоро-ковъ ште плоды.

Холодъ ошъ замоченнаго плашья, а особливо простуды отъ сырости ногъ, ее также производить, такъоть сырокакъ щы дали знать выше.

\$ 3.

О различных видах коликв.

Колики имъють великое сходство съ вышеупо-знани в мянутыми бользнями какъ въ разсуждени призна пользование ковъ, такъ и пользования; онъ вообще соедине-вообще ны бывають съ запоромо и острою болью въ кишкахо, и требують пищеупотребления мокротожидительнаго, выпоражниваний, припароко и проч.

P p 2

Ko-

Коликамб даны различныя имена по различію Разабление коликъ, причинъ, отъ коихъ онъ зависять: какъ-то колика ошносительно въ вътряная, колика желтная, колика истеритеская, колиихъпричи- ка нервная и проч. Какъ каждая изъ упомянутыхъ нами колика требуеть особливаго способа въ пользованти, то мы опишемъ главнъйште признаки и припадки, такъ какъ и средство оныя лъчить (4).

ЧЛЕНЪТ.

О коликт вътряной, т. е. происходящей отб вътровб.

Вітряная колика происходить оть вітрово, кои Свойство номики вт. растигивають и раздувають кишки; она весьма чапряной. сто перепутывается съ коликого спазмодитеского или не реного, о коей мы толковать будеть ниже, въ членъ IV сего f. Бытгемъ своимъ она одолжена матертямЪ вязкимо и клейкимъ, заключающимъ въ себъ много воздуха, которой от теплоты пучится.)

П рисины колики сътряной.

Вітряная колика причиняется от в неумъреннаго употребленія незрылых плодовь, ясть неудобоваримых в, выпротворных драстений и проч; она можеть быть савдствиемь остановившейся испарины, или холода.

.A10-

ніе слова HONNHA ; что должно разумвты чрезъ сіе CAOBO ?

Определе- (4) Имя колнии дается всякой боли, болье или менье острой, чувствуемой въ брюхъ, а особливо въ протяжени иншин полона, отъ чего она и названа коликою. Колика разделена на многіе виды, по причинъ гитада боли и причинъ оную произведшихъ. Г. Буханъ допускаетъ тольно сіе последнес разделеніе, да и весьма основательно; потому что бользни, названныя коликою нефраническою, коликою гепатическою и коликою желудочною, по настоящему знаменованію слова, не суть полики: двъ первыя не иное что суть, накъ бользии, извъстныя п дъ именемъ воспаленія почекь и печени, вть конхь они раздълены быть не могуть, такь нань мы понажемь ниже вы 6 4 и 6 сей главы; а поельтияя есть изгага, о коей мы будемь толковать въ Томь III, главъ 44.

Люди слабые; у коихъ пищеварительных спо кто оной собности очень обезсильли, наиболье оной подвержены. подвержень:

Признаки колики вътряной.

Вътряная колика гнъздо имъетъ въ желу лкъ, или кишкахо; она соединена бываетъ съ бользненнымъ растягивантемъ въ больномъ мъстъ. Больной чувствуетъ бургание въ животъ.

Расширяющійся болье и болье воздухь раздуваеть кишки, растягиваеть ихь бока болье обыкновеннаго ихь тома и повергаеть ихь вы безсиліе. Сіе раздутіе наиначе чувствительно бываеть вы львомы ипохондрь; кишка колоно, когда стануть ее хорошень ко ощупывать, находится раздутою; брюхо раздуто, жестко и звынить какь барабань. Иногда его величина умножается до того, что иной подумаеть, что оно болье раздуться не можеть: что причиняеть трудность вы дышаніи, часто соединяющуюся сы симы видомы колики.)

Больному обыкновенно бываеть полегче, когда харантеонь пускаеть вытры или верхомь, или низомь. Боль ристичерыдко бываеть одномыстною; вытры переходять изъ
знаки.
одной кишки вы другую, пока наконець выдуть. (Когда пожметь брюхо, то ему не больно, а не такъ
какъ вы воспалени кишокъ.

Сія бользнь часто сопровождается позевотами, тошнотою, изгагою и запоромо. Разтягиваніе сосудщовь иногда бываеть толь нарочитое, что пупокь выбивается и на его мьсть составляется кила или грыжа. Когда боль находится въ мълкихъ кишкахо и поражаеть также дуоденумо и колоно, то трудно различить сію бользнь отъ изгаги, о коей мы будемь толковать въ Томь III, главь 44.

Прежде дальный шаго чтенія читай і и 2 главы сего Тома.)

Пользование колики вітряной.

Когда сія бользнь причинена выпротворными напроизошла вишками, неспылыми плодами, кислыми растеніями и ротворпроч: то наилучшимь лькарствомь при первыхь поныхь наявленіяхь признаковь есть водка, или другой какой питковь, спиртной напишокь добраго качества.

проч: то требуеть тепль носредствомы нагрывальника, или разгоряченнаводки. го кирпича, а кы брюху и желудку приложить нагрымоги, же- тыя салфетки.

животь Надобно ему дълать сухія тренія против живота пержать разогрётою рукою, или мягкими салфетками, равно дълать теплыми. От сих треній обыкновенно выходять сухія тре-вітры; и так надобно их повторять, пока больно-нія на сих ту ощутительно легче будеть.)

ВЪ семЪ только одномЪ видъ колики можно упо-Но водна и преблять горящие спирты, ароматы и другія горягорячимельныя тительныя лекарства; да и давать надобно ихв тольяви решва ко вначаль, когда не будеть ни одного признака пригодны только въ воспаления. Въ самомъ дъль, мы имвемъ причину дузависящей мать, что произшедшия от в стротворных ястев оть сихъ колики всегда могуть выльчиться горящими спирта-Тричинъ ми и другими горятительными напитками, ежели упоколикъ: да и натребляются они вы началь первых в знаковы выпрово (д). добно да-Ho вашь оныя

вначаль.

⁽б) Мить весьма часто случалось видёть наших мужиковь, ноторые натвшись до излишества зеленаго гороха, или бобовь, и прочеством ужасно мучились страми, что брюхо их казалось барабаномь; они натались оть боли по земли епиною и едва могли дышать: столько-то распирало у них животь! Вы таком случать наилучшимы ленарствомы есть предписываемая здёсь Г. Буханомы содка, или простав споуха, а лучше всего эрофенчь, а по недостатку сего щепоти две

Но когда боль ведется съ давняго времени, и напротивъ притомъ можно опасаться, нъть ли начала госпалентя она буво кишкахо: то надобно воздержаться отъ всъхъ губною, горясительныхо лекарство какъ отъ яда. Надобно то-естьми гда такъ пользовать, какъ бы онъ имъль настоящее етъ кота воспаленте кишоко; о чемъ писано въ членахъ III и знакъ воспаленте кишоко; о чемъ писано въ членахъ III и знакъ воспаленте кишоко; о чемъ писано въ членахъ III и знакъ воспаленте кишоко; о чемъ писано въ членахъ III и знакъ воспаленте кишоко; о чемъ писано въ членахъ III и знакъ воспаленте кишоко; о чемъ писано въ членахъ III и знакъ воспаленте кишоко; о чемъ писано въ членахъ III и знакъ воспаленте кишоко; о чемъ писано въ членахъ III и знакъ воспаленте.

Есть некоторые темпераменты, вы коихы мно-гда надобгіе виды яствы, по себь не ветротворные, какы-то но пользомеда, лицы и проч. производять ветры. Я узналь, вать больнаго? что вообще наилучтій способы ихы льчить есть когда кототь, чтобы ихы поить обильно жидкостьми слегка лика промокротожидительными, какы-то ясного водого, легкимы изетка поссетома, сы хльбомы настоенною водою и проч.

Вітряная колика, произшедная онів поноект и римкв менищеваренія, обыкновенно сама собою вылічивается надобно датреото, или низомв; а сіе и должно вразумить, что вать моме надобно остановлять сихв выпоражниваній. Напро нротожити тивів того надобно имв пособлять, давая обильно ныя. нить теплой воды, или легкаго поссета; и когда когда прозбльность припадков прошла; то больной можеть отв попештом ревеня выгнать и остатки сырости.

Вітряныя колики, причиненныя мокротою ногінія, то или холодомі, выльчиваются обыкновенно вначаль аблать умовеніемі ногі и голоней віз теплой водів и питі- ниванія еміз и кончить

пріемомЪ

три аписа, тямона, укропа наи другихъ душистыхъ зередь; ихъ надобно разжевавъ проглатывать, или събеть съ клъбомъ.

Но болье всего ланомы малольшиме ребяща до зеленых плоловь, до гороха, 6 боль, аблокь, дуль, вишень, от употребления ноихь весьма часто случается накь опасный ионось, такь и пученые вь животь или вытры. Когда от того распучатся у нахь брюко, то надобно истолочь щеноти двы бадьяча, или аниса, или тимона, смытить сь хаббомы и медомы, и дать имы събеть; или дать иусонь влаемскаго пряника. когда про- ем в теплых в мокротожи дительных в, могущих в возизошла становить испарину, как в - то сыворотки св винолю, от воды, в в кою прибавляется небольшое коот коло- личество спиртнаго напитка.

да и проч:

то дают-

Средства предохранять себя отб вітряной колики.

простаго хльбнаго вина, т. е. сивухи, когда навдятся зеленыхъ плодовъ.

Предписывая симъ образомъ водку, мы и въ мысли не имъемъ одобрять употребление оной; но въ
сихъ случаяхъ горящие спирты суть настоящими лъкарствами, и мы не боимся утверждать, что они въ семъ
случаъ суть наилучшими, какие токмо можно предписать (5).

Мятная Хорошая рюмка мятной воды, сдъланной изъ вода. Аглинской или Римской мяты, произведеть почти такое же дъйствие, какое рюмка водки; да въ нъко- торыхъ случаяхъ должна и предпочтена быть, на примъръ въ разсуждени людей нервныхъ, довольно подверженныхъ сему виду колики, мятная вода есть болеутолительное кръпительное.

членъ и.

О коликъ желтной.

(Сїя колика происходить оть желти острой, гав гиві- разьыдающей и раздражающей оболотки кишоко; гивздо ея

⁽⁵⁾ Не надобно никогда забывать, что Г. Бухань одобряеть спиртные напитей тольно что вы однихы обтриныхы полнахы, да и вы началь сихы полнах. Во венномы другомы случаь, и даже вы застарывшихся обтриныхы полнахы, они пагубны, наны полновать нань сечинатель выше называеть ихь. — О обтражы мы бу Асмы толновать вы томы из 45, \$ 10.

ея находится въмълкихъ кишкахо, но наиначе въ дус-

Она часто бываеть между молодыми людьмикто болье такосложения плотнаго и сухаго, кои много пьють ви- вержень! на или спиртных вапитковь, кои сердиты и вспыль- чивы и проч.

Иногда желтная колика вдругь пристаеть отвпричины пишья колодной воды льтомъ сгоряча, или когда испарина остановилась отв какой нибудь причины.)

Признаки колики желтной.

Сія колика соединена съ острвишею болью про-признаки тивъ пупка. Больной чувствуеть неутолимую жажду; предшеу него обыкновенно запорб (однако менве, нежели какъ въ воспалении кищоко; пульсо тасто, чаще того маль, но не бывая жесткило и бойкимъ; у больнаго зативние ума, а голосъ охриплой.)

Онъ блюеть желтою желсью, жгучею, горькою: характей посль сей рвоты больному кажется полегче; но вско-ристичерь сти припадки опять приходять съ такою же жезнаки.

По мъръ, какъ болъзнь усиливается, позывы на ресту умножаются, иногда такъ, что реста дълается безпрестанною, и движение китокъ такъ перемъняется, что признаваемы бывають почти всъ признаки начинающейся илисской боли, описанной выше, въ 2, членъ II сей главы.

(Бользнь доказывается еще горечью во рту, жгучимъ жаромъ въ утробъ. Боль то стоитъ на одномъ мьсть, то переходитъ; иногда она стоитъ противъ пупка, иногда противъ спины, по мьсту китокъ, кое она поражаетъ. Большая часть больныхъ жалуются на боль подобную той, которая бы произошла отъ Толъ II.

екручентя веревкою. *Мога* густа, красновата и выходить помалу: иногда за сими припадками слъдуеть желтуха и проч.

(Прежде дальнъйшаго чтенія читай главу і и 2 сего Тома.)

Пользование желтной колики.

кровопусначіе и у него полив и таств, то надобно отворить кровь, пр мываніе. а по томъ наставить промыванія.

Поднисленное пишье. ротки, или ятной воды, подкисленных лимонным вывиная пшиза- соком вы или винным камнемв. Сверьх в шого дашь ему налобно легкой цыплячей воды, в коей распущено нъсколько манны; или дашь декокта из тамариндов , или другой какой легкой птизаны, кисленькой и слабительной.

Какъ дол- (Промыванія надобно наставлять мястительныя, жны упо- составленныя изъ мястительных растеній, или изъ требляемы про- настоя льнянаго съмени, въ которой прибавляется нъмыванія: сколько деревяннаго масла.)

теплыя нужно припаривать брюхо больнаго обмоченными въ теплую воду тряпицами или салфетками; а когда сти средства будутъ безуспъшны, то должно больнаго опустить въ теплую воду по грудь.

масляныя (*Тренія*, о коих вы говорили въ 3 примъч. сей на пиранія. главы, равно пригодны въ сей бользни.)

Надлежить предписать соленаго питья, въ которое

прибавить нъсколько капель лаудана, и повторять оное по показанію случаевь.

На впадину желудка, т. е. противъ желудка терьянъ на можно приложить пластыръ изъ терьяка и почаще на-впадину желудна ставлять пролыванія, составляемыя изъ довольнаго и въ про-количества терьяка, или лаудана (6).

(Читай § 3 главы 2 сего Тома, толкующей о

Средства предохранять себя отд колики желтной.

Тв, кои подвержены частым возвратам воли-легнія раки желсной, должны мало воть маза, а питаться только стенія. легкими растеніями, и время от времени принимать ныя кино прієму виннаго камня и тамариндово, или другое слыя и какое кислов и прохладительное слабительное.

прохладительныя.

(ВЪ семЪ случав паче всего соввтуемЪ мы упо тр ншетреблять плоды по большому пріему, или слабое невъ марслабительное, извъстное подЪ именемЪ троншенева меладъ. марлелада.)

члень III.

О коликв истеритеской.

жеть чувствовать, бользнь свойственная женщинамь, свойственона жен-

Доназащельство сему находится въ Ибмецкомъ журналь. наружищ-Изноторой человый твлосложения горячаго и сухаго, подверженый сл. Для съ давняго времени желчной коликъ, имъль жестокую боль, извер-чего: галь съ пометомь матерію зеленоватую, а рвотою матерію черную. Примърь. Онь вснорь умерь, такъ что не можно было утишить жестоности припадновь. Тотчась послъ смерти его брюхо нарочито раздулось; его вскрыли и нашли большую часть кишоль съ гноемь и вередами, а вонь оть оныхъ выходила ужасная.

⁽⁶⁾ К гда не дваяется благовременно сопротивленія усилію сей бользии, над био то часто она доходить до таной жест жости, что пособія Врачебной прогонять науки остаются тщетными. желуь измъняется, разрушается и порсію боты тител болье и болье; нишим крійнъ різдуваются; по туть развать, транот поражаются антоновымь огнемь, и больной умираеть по какъ сносреди подавлемыхъ ему пособій.

она возвращается промежутками и безъ всякой видимой причины.

Кто изъ инхъ ей модвержень? Женщины, имъющія твлосложеніе хилое и мягкое, темпераментв флегматитеской и мокротной, наиболье подвержены сей бользни; ть, кои испытали уже приступы сапоровв, и кои ослабли от трудных в родовв, не минують почти сей бользни, которая имъ часто бываеть смертельною.)

Признаки колики истеритеской.

Умеритеская колика инбет великое сходство съ коликого желтного: она соединена бывает в съ острою болью противъ желудка, съ рвотого и проч; но то, что больная блюет въ сей бользни, обыкновенно бывает цвъта зеленоватаго.

Признани жарактеристичевкіе-

вень.

Больная находишся въ безсиліи и примьшномъ уныніи; она дышешь весьма шрудно, порошишся пометомо зеленоващымъ; боль не на одномъ мъстъ остается, а переходишъ то на то, то на другое мъсто живота. Иногда сій боли перестають черезъ недълю, и возвращаются по томъ съ большею жесто костію, нежели прежде. Сій то суть признаки, особенно означающіе сію бользнь, которая иногда соединена бываеть съ желтухою; но сіл желтуха проходить вообще сама собою въ нехногіе дни.

(Мальйшая страсть, непомърное тьлодоижение, мальйшее излишестью, могуть опять произвести сей видь колики, когда она прошла.)

Пользование истерической колики.

Въдъ выпоражнипо кровопусканія, реотныя, тистительныя вредны, и ванія въ надобно избътать всего клонащагося къ разслабленію и сей больз- обезсиливанію больнаго.

Одна-

Однако, ежели реота нарочита, то надобно да-что долвашь теплой воды, или легенькаго поссета для очи-жио двщенія желудка; посль того дать пятнатцать, дват-га рвота цать, дватцать пять каплей лаудана ликопда въ рюм-нарочита: къ корисневой воды, что повторять потребно чрезъ каждые десять или двънатцать часовь, пока припадка пройдуть.

Больной можно давать трезь каждые шесть ча-давать совь по четыре или по нята вонютихо пилюль, а на вонючихь оных давать запивать по рюмкт пулейнаго настоя. Еженильных и тертово духо (affa fetida) ей противень, такь какь иногда случается, то надлежить ей давать по столовой ложкь тинатуры бобровой струи (tintiura costorei) тинктуры вы рюмкт пулейнаго настоя (infusio pulegii), или трите вобровой цать, сорокы капель Перуанскаго бальзама (balsami перуанскаретичіаті), накапанныхы на кусокы сахара. Можно еще го бальзаучупотреблять противуистеритеской бальзамо, которой ма; противоистерической производить хорошія дъйствія.

Мущины ипохондрики часто подвержены быва-пластыра. Мущины ють болямь весьма похожимь на боли истеритеской ипохондриколики; ночему все сказанное вы семы члень пристой ни подверно и вы мужеской коликы, которую можно назвать жены по- ипохондритеского. Впрочемы сія колика иногда бываеть ной же ком мущинь слыдствіемы ипохондрій, а у женщины истанию терики; о чемы мы будемы говорить вы Томы III, главы 45, \$ 12 и 13.)

ЧЛЕНЪ IV.

О коликв нервной.

Рудокопатели, литейщики, былило дылатели и проч. кно оной такь какь мы писали вы Томы I, гл. 2, весьма подвержены болье подсей коликы. Она весьма обыкновенна вы провинціяхы и вы на-Англіи и (рранціи, вы коихы пьють сидро; а дума ной землы веть, что она происходить оть свиндовой посуды, она чиде:

употребляемой на дъланіе сего напитка; она также часта въ западныхъ Индіяхъ, гдъ она названа сухом коликою (7).

П ризнаки колики первной.

Признани предшеетвующіе, (Она возвъщается непостоянными больми въ животъ, безпокойствиями и кортными скаканиями. Запоръ, боль желудка, реота, блъдность лица, сопровождають также сей периодъ. У больныхъ голова тяжела и больна; глаза мутятся: они иногда лишаются употребления разума.

Признаки жарактери-

Вскорь боль живота умножнется и утверждается противь пупка, которой уходить внутрь и спрятывается; сін боль часто бываеть толь жестокою, что больные катаются по своимь постелянь, испуская ужасные крики. Тогда кажется, что сильное стъсненіс уменьнаеть ихь страданія. Вы семь періодь мога и пометв остановляются; задній проходо уходить внутрь

LINE SALVENTAGE

И

(7) Вст тт, кои пьють вино, податленное илетомы или литаргиріємы, такъ какъ мы покезали въ Томт I, главт в, примти. 9; живописцы, упстребляющіе многіе пренараты изъ соинца; ссичары, примъшивающіе его съ своимъ лакомъ; словолитцы, исменоствущі; піющіе воду прошедшую сквозь трубы или сосуды свинцовые; употребляющіе въ кушанье месло, въ коемъ для тажеловъсности подмещаны возналы; піющіе вины зеленыя и кислыя и проч. весьма оной подверженые

Различныя имена сего эмда колики. По сей-то причина сіл бользнь названа еще коликою сейнечниковь, живописцовь, горшечниковь, пивтонскою, растительною, метоллическою, спазмодическою, коруною и проч. Нать сомнанія, что І. Бу-хань смативаєть съ коликою нервиою всё забсь нами упомянутыя.

Мы знаемь, что не всв Врачи согласны на сіе мнвніе; но оно темь основащельные, что различныя описанія о сей бользни, учиненныя Врачами сь той и другой стороны, представляють всегда тв же свойства и знаки. Но вь разсужденіи пользованія совсьть не такь; епоссбы на оное совершенно между собою противны. Первой методь или бразь пользованія, предписываемый сочинителемь, называется ситвраогистическимь или Католическимь; другой называется сильнымь методомь. Какь сей последній методь одобрается миогими двлами, то ми предложимь его после метода Г. Бужана.

и запирается спазмодитески; находять также корти, потеряніе зрънія и голоса, даже иногда приступы тернокемощные.

Въ сте время пулься бываеть солиистымя и почти естественнымя. Ежели больнымъ заблаговременно не будеть подана помощь, то верхнія конетности (руки) убиваются паралитемя пальцы скорючиваются, и сти вторичныя приключентя кажутся быть крисисомя или переломомя бользни; а иногда, когда бользнь ведеть къ хуждтему, больные умирають въ ужасныхъ мучентяхъ.

Сія колика причиняєть сильнійшія боли, нежели сей видь всь другія бользни кишока, и часто она долго тя-нолики мучительные нется. Я ее видьль продолжавшуюся чрезь восемь или всьхь но-десять дней, сопровождаемую чрезь все сіе время за-ликь. порома, которой сопротивлялся всьмы пособіямы Медицины; однако наконець уступиль, и ожиль (b). Но сія бользнь вообще оставляєть посль себя больнаго вы хворости, которая часто кончится паралитема.

Пользование нервной колики.

Общее пользование сей бользни столь близко способъ подходить подъ пользование воспаления китока, что антифломы не почитаемь за нужное болье на оное настоять: ской или надобно послаблять животь легкими систительными, католичедаваемыми по малымь приемамь, но часто повторяе—ской. мыми; дъйствию сихь систительных надлежить пособ-

ляшь

HOUSE OF

⁽b) Канъ тавачной дымь, впущенной въ иншии чрезъ задній проходь, часто удачливо послабляеть животь, между тьмь канъ вст другія средства остаются недтиствительными: то всты хирургамь надобно запастись изобрттеннымь на сей конець инструментомь, и описаннымь между инструментами инструментовлагалища въ Томт IV, главт 55, \$ 2, и во всеовщей тавлиць Тома V, подъ словомъ инструментовлагалища. Его можно купить дешевою цёною, и оно послужить во многихь другихь случадхь, какъ то къ оживленію утопленниковь и проче

6 бровой сшрун.

тоско изб дать масляными промываніями, принарками и проч, Масло из вобровой струи слыветь лъкарствомь, особенно присподобленным в къ сей бользни; оно дается ложками от двух до трех унцій, а в промываніахб по пріему няши или шести унцій.

Варъ принимаемой ваупры. Hpiem b.

Сапожной варб также почитается двиствительным в лекарством в в нереной коликв; его можно лавать по прісму двухь драхив три раза въ день, или чаще, ежели желулокъ можеть его снести.

Снаружи въ пренін.

somb sbayare v. coannie Сей вард, смъщанной съ равнымъ количествомъ сахарной водки (рума) крыпкой, пригодень шакже для тренія спинной кости в случав подпранія на семь мвсшв, или другаго какого признака паралита. Ежели не можно достать сего вара, то надобно тереть спину сильными спиртами, или небольшимъ количествомъ мушкатнаго масла, или розмаринного (8).

Еже-

(в) Мы не будемъ представлять такъ причинъ, по ноимъ методъ, которой мы опишемь, толь существенно различень от вышеписаннаго. Сія подробность насается только до Врачей, изъ ноихъ наждой ее знаеть. Мы скажемь только, что какь всв металлическій извести, а маниаче свинцовая, сушь весьма сильных сушительный: те довольно въродино, чио первые принадни нереной нолини происходать от сеущения жахь влажностей, нои опредълены нь обмоченію, а чрезъ що къ удобитишему коду нишокь; что доказывается живописцами, золотильщиками и проч. ноторые сперва чувствують великую сухость въ ноздряхъ, въ горяв, въ нево и боль въ миндалинакъ и проч. И такъ, положивъ сіе, бользнь сія не есть соспадительной, даже очень стапься можеть, что вна шаковою бываеть, такъ какъ нъкто утверждалъ, только отъ времени, когда длился Католической методь, а больны возрасла до того, что сдылаласы воспалиниельною. : Timidheadmicki

Сиявной медопъ: епособЪ пользованія Париженой гофшиниша--ONHM MK cepain.

Вошь иють методь, по которому надобно савдовать для предупрежденія сихъ приключеній; онь изсерьшень понойнымь Г. дю Воа, Донторомъ гофшинтали Милосердія; въ семъ гофшинталь и понынъ ему елблують, да и большая часть Врачей Французской столицы и Францін по оному же поступанню.

Ежели больной находишь себя слабым в что доли хилым в послъ того, как в бользны выль-жно дътомб II. Т т чена,

Когда бользнь еще недавна, и нужно ее съ самаго начала Промываистреблять описаннымъ методомъ, то надобно сперва больному на- нія изъ ставить промываніе изъ довольнаго количества густаго вина и орб- густаго коваго масла, смъщанныхъ вмъсть. Спустя два или три часа надоб- вина и но употребить другое, сожпавляемое слъдующимъ образомъ:

оръховаго

Возьми очищеннаго Александрійскаго листу, — - двѣ дражмы, Электуарія діафенниса, — - унцію, Благословеннаго славительнаго, — полунцію, Прольсковаго меда, — - двѣ унціп, И млкоши свинаго огурца.

По Лашынт:

Recipe sennæ emundatæ, - - - drachmas duas,

Electuarii diaphænicis, - - - vnciam,

Benedicti taæarivi, - - - vnciam semis,

Mellis mercurialis, - - - vncias duas,

Pulpam colocynthidos.

Свари всь эми вещества въ фунть воды; процедий

Посль дъйствія сего промыванія повторяєтся промываніе из Вевтное, масла и густаго вина; въ сльдующій день больному надобно дать терьякъ и реотнаго три или четыре грана (tartari emetici); и тотчась посль лауда-дыстій реотнаго предписать ему дражму терьяка и грань лаудана. нумъ.

На третій день бользни опать даются промыванія и также чистиреотнов; вы четвертой опать прочищается больной слыдующимы лы-техьное во карствомы:

— многихы

Возьми очищеннаго Александрійскаго листу

Возьми очищенняго Александрійскаго листу по унців, Эпромпской соли, Виннокаменной соли - - двъ унців.

По Лашынь:

Вари все это въ двухъ фунтахъ обынновенной воды; прокв-

Электуарія діафенниса (elettuarii diaplænicis) четыре арахмы, Спропа волуьнав ягодь (бущі гвати савытісі), полунці... Сего чистительнаго питья давать во многижь рюми-хь чрезь три четверти часа поутру.

Ilo-

масла.

чиств-

тельное

промыва-

ніе силь-

Noe.

гда боль. чена, що надобно ему пользоващься верхоной слабь воло вздоло; ежели же бользны кончилась панів нолики?

Болеу толительным и потогонительнам итизана,

Крвпи-

BUSAPHUE

пинье.

Поназанныя нами лъкарства надлежить подиръплять полпрахмою терьяка и грансмъ лаудана, даваемыми каждой вечерь и потогонительного итизаного слъдующею:

> Возьми гванковаго и сиссафрасоваго дерева, - - - унцію, Корня жины, изръзанных въ мълніе нусассапарелли, сочни, наждаго по шри дапушника, унціи.

> > По Лапынъ:

Recipe rasuræ ligni guaiaci & sassafras, - - - vnciam,
Raduis chinæ,
Sassafrarellæ,
Bardanæ,

Все это морится въ вольномъ жару чрезъ детнатцать часовъ въ обмазанномъ посредствомъ тъста муравленомъ горшив въ прекъ фунтахъ воды, пока останется тольно два фунта.

Больной сего ден има долженъ выпивать много рюмонъ въ лень.

Когда силы больнаго очень упали, то надобно ему пить пръпительнаго питья, и торое воть нанъ составляется:

Возьми простой мелиссовой воды, Воды влагословенного волица, в по двъ унціи, воды трехь орбховь, - - - - двъ унціи, Гісцинтовой конфекціи, - - - три унціи, Гвоздичнаго сиропа, - - - унцію,

Смвшай.

По Латынъ:

Recipe agua melissa simplicis.

Aqua caraui benedicti, ana vncias duas,

Aqua trium nucum, - vncias duas,

Confectionis byacinibidos, drachmas tres,

Syrupi ocelli indici, - vnciam,

Milce.

Приемъ сего питья обынновенная ложна на часъ.

Когда бользнь изгоняема была съ начала своего бытія, що чаето доставляется выпользованіе чрезь недвлю; ежели же боли и тогда не советть утишились, то надобно поступать по поназанному нами сбразцу, и давать чистительных толь часто, сколько силы больнаго позволять.

Во время промежущочных дней прочищений, можно давать саблующие волюем или канышки:

ПріемЪ.

чистительные болюсы

Boass

пригодны (9).

Средства предохранять себя от нервной колики.

Для предупреждентя сей колики никогда не на когда она добно всть неспълых в ягодъ, ни пить напитковъ ки- паралислых в и терпких в и проч.

T m 2

TB.

Спирта волюсовь, кои больной должень принать накануна чистительного.

Но Лашынт:

Recipe aloes successina,
Extracti rb.barbari, } ana grana decem,

Extracti bellebori,

Diagredii,

Inliqua,

Syrupi rhamni cathartici, quantum satis est

Ad conficiendum quinque vel sex bolos.

Въ сей коликъ кросопускания не иначе позволительны, какъ Когда накогда признаки, оныхъ требующіе, находиться будуть въ высочай добно пушемъ степени, или когда бользив застарълась и сопровождается ли-скать корадною (жаромъ): тогда - то антифлогистической методъ Г. Бухана кровь, приличень; во всякомъ другомъ случав кросопусканіе было бы безполезно; даже часто оно можеть произвести нещастныя слъдствій.

(9) Сін воды получили имя сть Аглинскаго города, находящагося въ герцоготвъ Соммерсенскомь; онъ теплы, и могуть замънены быть во франціи водами Вишійскими, Бургонскими, Монтдорскими, Пломбіерскими, Барежскими, Баньерскими, а наиначе Баларюкскими, комторыя почитаются совственнодъйствующими противь паралича; а въ Россіи Царицынскими и проч. Сей видь паралича, нажется, есть Електритоть, наль коимь наиболье имъсть силы электричность (сопјеститея заціяю fur P Electricité Medecinale, раг М. Gardane.

Но еей сочинитель думаеть, что для содвланія элентрозицій спаситель війшими надобно боль і аго кь нимь присотовить тепличными водами, о наковыхь мы упомянули, и соединить авкарства внутренай и вибший съ дъйствемь электричности, такъ какъ мы будемь говорить въ Томъ III, главь 45 § 3, примъч. 4.

жны бышь масляныя, или жирныя. Каждое утро надобно им выпивать по рюмк деревяннаго свъжаго масла съ небольнимъ количествомъ рума, или водки; но сихъ спиртимх мать безъ упомянутой примъси.

жиднія. Яства жидкія наиболье имъ приличны, какъ-то жирные бульюны и проч; но надобно симъ яствама быть питательными.

Выходить Они должны почасту, но на немного времени на возвыходить на свъжій воздухъ изъ своихъ работныхъ комнать, въ коихъ воздухъ испорченъ; наипаче же из бъгать запора тъми средствами, кои описаны въ Томъ III, главъ 41.

ВЪ ЗападныхЪ ИндіяхЪ и на берегу ТвинейскомЪ образомъ жители великую получають пользу, въ разсуждении предосторожности отъ сей колики, отъ ношенія окорегаются ло поясницы фланелева куска и отъ питія вивсто въ запад таю настоя съ инбиремъ.

членъ у.

Разсуждение о пользовании колико вообще.

Мы бы могли упомянуть о многих других видах в колик ; но такое множество разделений только что отягчить читателя. Мы говорили о сущеетвенный ших в, и кои наиначе надобно уважать; потому что пользование их весьма различно.

моссбія разовить ополезвно полезныя во сих различій, то могуть еще, вы ожиданіи Авкаря, всякомь быть весьма полезными боліному следующія правила, внав коа имянно во всякомь видь колико умовенія ногь и рукь рукъ въ тенлой водъ, прикладывание на брюхо и желудокъ салфетокъ или тряницъ, обмоченныхъ въ тенлую воду, обильное питие мокротожи дительныхъ и склизистыхъ декоктовъ, наконецъ млегительных промывания чрезъ каждые два или три часа весьма спасительны.

\$ 4.

O воспалении потекв (боли ев поясниць), и о потетной коликь.

(Сочинители раздъляють пояснитную боль или Есть два воспаление потеко на два вида: на настоящую, въ собъяща боли ственномъ смыслъ называющуюся соспалениемо потеко, цъ: начи на каменную, которая есть потетная колика; но какъстоящая в нользование сихъ двухъ бользней есть то же, то мы наменная нустимъ объихъ ихъ по одному пути, предоставляя каждой изъ нихъ особенныя свойства въ описании признаковъ.)

членъ І.

Пригины воспаленія потекв и потетной колики.

Стя бользнь можеть причинена быть всьми твни причинами, кои производять воспалительную лихорадку (горячку); она можеть также произойти оть утибовь или ударовь противь потеко (вы поясницу), оть камия или хряща, остановившихся вы сихы тересахо, оть сильныхь мотегонительныхо лькарство, оть тинктуры шпанскихо мухо и проч.

Сильныя движенія, как в - то принужденное расхаживанье или гулянье на лошади, а особливо в в жаркую погоду, и все, что может в устремить излишнее обиліе крови в в поски, может в причинить еїю бользиь. Она может в еце произойти от очень мяских в ностель, от в очень долгаго лежанья на спинь. Непроизвольныя дьйствія, корги в в моссевых в сосуд-Т т з цах и проч. также могуть къ оной подать по-

кто оному (Сія бользнь часто бываеть наслъдственною. ученые и другіе ведущіе сидячую жизнь люди оной подвержены. Она еще обыкновенные между питухами и плотоугодниками. Меланхолики, а наипаче по дагрики весьма оной подвержены; наконець ть, кои вытерпыли ее однажды или много разь, должны ожидать возврата оной, ежели не будуть слыдовать пищеупотребленію, предписанному въ конць сего параграфа.)

ЧЛЕНЪ И.

Признаки воспаления посекв и посесной колики.

общів при (Больной чувствуєть острую боль въ спинъ и внани противъ потеко, т. е. въ поясницѣ; у него есть нъдамъ, и сколько лихорадки; онъ ощущаетъ онъмълость или боли въ глухое болечувствование въ ляжкъ больнаго бока.

моченой Мота сперва бываеть прозрачна, по томь ставоликт. новится красною; но вы сильныйшемь степени бользни она обыкновенно бываеть блыдною, выходить съ трудностію, да и вы маломы только количествь за разь.

Больной терпить великую боль, когда хочеть итпи, или стоять; онь лучше ложится на больной бокь, нежели на другой; чувствуеть позывы на рвоту, и даже блюеть почти такъже, какъ въ желтной коликъ.

влани, Однако сї и бользни различествують оть желтразличаю- ной колики тьмь, что боль вы нихы гньздо свое имыщіе нхы оть желу- еть болье назади, и что мога идеть съ трудноной коли- стію: постоянные признаки воспаленія потеко, рыдко ка случающіеся вы коликь желтной.

> (Воть характеристические признаки воспаления потеко, собственно такъ называемаго, и потетной колики: Вос-

Воспаление потекв начинается св лихорадки (св особенные жара); и эта лихорадка не есть следетвием боли признаки опь камия, какъ- по бываетъ въ потетной коликъ. поченъ или Оно не сопровождае пся онвивлоснію въ лядвеяхь и настощей уходом в в паки ядерв, признаками потетной колики. 60ли въ Впрочень лихорадка бываеть то сильна и жгуча, то ноясниць средственна съ изкоторою жесткостію въ пулься. Больной чузствуеть вы одной, или вытеть вы объихъ посках боль постепенную въ томъ мъсть, которое называется поясницею. Съ сими припадкаии соединяющся тоска, безсонища, тошнота и реста. Больной извергаеть сперва то, что у него въ желу дкв, а по том в желтз; живот в у него запершь; мога красная, палящая, а иногда и кровавая; она иногда перестаеть и течи въ сильномъ стенени бользни.

Потетная колика или колика каменная различае пт- особенные ся от в воспаленія потекв і) болью острыйшею, про-признаки исходящею от в камня, поворотившагося, или приведен-почечной наго въ движение сильнымъ телодвижениемо, качкою нолики наповозки и проч. Стя боль идетъ постепенно проме менной. жутками и возвращается упорнъйшею; 2) цвътомъ моги, которая бываеть кровавою, сопляною и иногда съ хрящемъ; 3) онвивлостію ноги іпого бока; 4) уходомь въ пахи ядерв, и болью въ могепропускателя в, называющихся уретерами (vreteres); 5) рвотою, нападающею при каждомЪ приступъ. Сей приступь продолжается многіе часы, инотда одинъ, два дни сряду; конецъ возвъщаетея испечениемъ моги, или выходомъ камия, или жряща.

(Прежде дальныйшаго чтенія читай і и 2 главы сего Тома).

ЧЛЕНЪ III.

Пищеупотребление, кое на добно предписывать вб вос-

Дешва.

Надобно избъгать всего того, что имъетъ свойство разгорятать и раздражать; въ слъдствие чего яства должны быть легкия: больной долженъ употреблять панаду, легкие бульюны, сладкия растения и проч.

Пишье.

Онъ долженъ обильно пишь мягтительных питій, слабых в, как в- то сыворотки, мятнаго настоя, подслащеннаго медомо, декокта из в корней рожи, из в ятменя и солодки и проч.

Выгоды Больному надобно, хотя бы у него и была рес-OH 140та, пишь постоянно по глошкамЪ, или по малиньпрошожикимъ чашечкамъ, часто повторяемымъ, сихъ питій, жишельили другаго какого мокротожидительного. Ничто такъ -ип бхим мій, выне пригодно, ни утоляет в болье воспаления, ниже дый**миваемыхЪ** ствительные разверзаеть заваливающую причину, какъ въ великомъ коли лок ротожи дительныя, выпиваемыя во многомъ количествь, но чествь, но помалу за разъ. помаку за pasb.

Вольнаго надобно содержать въ поков и по его воль; но надобно оберегать его отъ холода, доколь признаки соспаления продолжаться будутъ.

ЧЛЕНЪ IV.

Пекарства, кои на добно предписывать во воспалении посеко и во посесной коликь.

кровопу: Кровопускание обыкновенно бываеть нужнымь вы скание вна- сей бользни, а особливо вначаль: крови можно выпумаль; гав надобно его стить десять или двынатцать унцій изъруки или нопроизво- ги; а ежели боль и воспаление всю еще остаются, то надобно повторить кровопускание вы сутки, особливо ежели больной темперамента полнокровнаго.

КЪ

Къ геморреи дальным в жилам в можно припустить пільную пільщи ; потому что сїє выпоражниваніе особенным в образом в облегчает в больнаго.

КЪ больному мъсту надлежить еще приклады-припарии. вать обмоченныя въ теплой водъ салфетки, или пузыри съ теплою водою, и смънять ихъ другими, какъ опъ высыхать будуть. Сти пузыри можно сдълать еще дъйствительнъйшими, наполняя ихъ декоктомо изъ цвътовъ рожи и ромашки, въ которой прибавляется немного шафрана, смътаннаго съ третьею долею, или около, свъжаго молока.

Мягительныя промыванія должны часто повто-мягчиряемы быть; и ежели не слабять они животь, то промываприбавить вы оныя соли, меду, или нъсколько манны. нія и сла-

Надобно употреблять такія же лькарства, естьныя.

ли въ поскахо есть хрящо, или камень; но ежели

крящо, или камень, вышедши изъ посеко, остановится въ мосепропускателяхо (с), то сверхъ припароко надобно больное мъсто тереть масломо изъ
сладкаго миндаля, и давать какихъ нибудь легкихъ
мосегонительныхо лъкарствъ, какъ- то можжевеловой вотренія въ
ды, подслащенной небольтимъ количествомъ алтейкряща ная
наго сиропа, или кофейною ложечкою услащеннаго намня;
селитрянаго спирта (Spiritus nitri dulcificati) съ приложеменьты нъсколькихъ капель лаудана ликвида, въ обытельныя.

Надобно ему еще предпринимать телодоижение Тълодонна лошади верхомъ, или въ каретъ, естьли можетъ жениеоное снести.

Гомб II.

Уу

Ko-

⁽с) Мочепропускателя, называющиеся у Врачей уретерами (vecteres), сущь два канальца или трубочии, по коимъ моча течеть изъ тазка почекь въ пузырь. Они иногда засерены бывають малинькими наминями, или прищомь, которые, вышедь изъ почекь, въ оныхъ останавливаются.

Савденные Когда бользнь продолжается до седьнаго или больни, ногда она не нончи- такееть въ поясницъ, и частые имъетъ приступы дась на озноба и непорядочныхъ лихорадочныхъ движеній и осьми пер- проч: то основательно можно подозръвать, что въ выхъ семъ черевъ (въ поткахб) собирается матерія и составляется нарывб.

(О составлении сего нарыва можно узнать изб об-Знаки, показываюлегченія опів боли, изв ознобовв, скорже или медленmie coнье сльдующих в один в за другим в, из в чувствия тяставление жести и онъмънія вЪ больномЪ мъсть. Навърное можнарыва. Поназывано положить, что онъ уже тогда составился, когда ющіе, что посль упомянущых в принадков в посльдуеть жарв, разонъ уже еоставил- дираніе въ томъже мьсть, и когда мога гнойна м eg. вонюча.

Понгамвавощіе знмонов осонь, которой обнаруживается внезапным претонь. станїем воли, пульсом перемежающимся, холодным в
потом и совершенною остановкого моги, или она
бывает в темносиняя, черноватая, вонючая и проч.

Желван В. Когда воспаление поски кончится желваком в, то нога того же бока дълается паралитическою, или больной хромым в, и сте зло неизлъчимо; что иногда производит в медленную сахотку, или во дяную бользи и проч.)

летва, нов Когда мога показываеть, что нарыей уже соделжны ставился вь погкв, то больному надобно воздерпредписывать, ноживаться оть всякаго летва прянаго, сыраго и солегда нарывъ наго, а питаться только растеніями сладкими и скливоставиязистыми, плодами, бульюнами изь молодыхь животныхь, варимыми сь ягменемо и обыкновенными садовыми овощами и проч.

Вивсто обыкновеннаго питья давать простой питье въ сыворотки, сыворотки послё пахтанья, которая бы не томъ же закисла. Сыворотка послё пахтанья коровьяго масла сыворотка слыветь собственно действующимо въ семъ случав; но для после па-того, чтобъ оно произвело действіе, надобно упо-ктанья масла.

Жельзныя воды почитаются также превосход- воды мишым въкарством в в сем в же случав. Их в удобно можно неральныя достать в в Англіи; но надлежить также употреблять жельзныя их в чрез в долгое время.

(Ежели нарыво выдеть наружу (что хотя рыдко, однако иногда случается), и можно будеть чувствовать переливание сквозь обологеко тыла, то надобно тогда призвать искуснаго Хирурга, которой сдылаеть операцію, называемую нефротомією, т. е. поскопрорызаніемо, а послы операціи продолжать пищеупотребленіе и лыкарства, предписанныя противь нарыва.

Ежели изъ бользни видно, что она хочеть кончиться желвакомв, то надобно справиться съ Томомь III, главою 47, § 2; а ежели угрожаеть антоновымвоенемв, то читать Тома IV члень III, § 3 въ главъ 52.)

члень V.

Средства предохранять себя отб воспаления почеко и почекой колики.

Тв, кои подвержены часшым возвратам воспа- от чего ленга посеко, или завалам сих верево, должны воздер- должно жаться от вина, а особливо того, в коем воздерживаться от ваться; ваться; и пства. удобоваримыя, и телодвиней умфренное. Им не на-телодвидобно ни слишком одъваться на постели, ни слишжение. Ком долго лежать на оной. (Они должны от должны у у 2

воемоять казапься от в пуховиков в и мягких в постель, а ложиньпостели: ся только на набитых в шерстью тюфяках в, наипаче кожаных в.)

5 5.

О воспалении могеваго пузыря.

ЧЛЕНЪ І.

П рисины воспаления могеваго пузыря.

Воспаление пузыря происходить вообще оть тыхь же причинь, оть коихь воспаление потекв; (излишнее количество моги можеть также оное причинить; оно еще происходить оть шпанских мухв, оть нарывных пластырей, оть раны и проч.)

ЧЛЕНЪ II.

Признаки воспаления пузыря.

Оно обнаруживается острою болью въ нижней части подбрюшія, трудностію въ мотеиспусканіи, соединенною съ лихорадоткою, съ безпрестанными позывами къ стулу и къ мочеиспусканію.

жарантеристическіе приСїя бользнь означается круглопродолговатою опухолью на тазу; сїл опухоль причиняєть боль, ко-торая умножаєтся при щупаній брюха; по томь сльдуеть вскорь трудность вы моченспусканій, немоченспусканіе и безпрерывная лихорадка, а за нею безсонница, жажда и бредь; конетности холодьють; у больнаго упорной запорь; опухоль становится жестиве, когда мога застоится вы пузырь.

(Прежде дальнейшаго чинента чишай главы и и сего Тома.)

ЧЛЕНЪ III.

Пользование воспаления пузыря.

Для излъченія сей бользни надобно посльдовать; діята меттому же пользованію, каковое мы совътовали про ная; питье тивЪ предыдущей бользни вЪ члень III и IV, § 4 сей жидительглавы. Діэтв надобно быть легкой и малопитательное и проной, а пишью прохладительному и мокротожидитель-хаздиnomy.

Я ровопускание весьма нужно въ началъ сей бо-кровопульзни, и людямъ сильнымъ не худо его и повторять; сканіе. къ подбрющию надлежить прикладывать почасту при припарки. парки из в теплой воды, или декокта из в мястительных врастений; въ день надобно наставлять три или чешыре промыванія мястительныя и проч. и один В мягчи. или два раза вымываться вЪ теплой водъ чрезЪ сут- нельныя ки. Больной долженъ воздерживаться от всякаго ве-промыващества горятительного, пряного и раз дражательного, Бани или а пишаться только легкими буль онами, кашицего и умовены. другими сладкими расшеніями.

Остановка моги можетъ зависъть не только ощъ остановка восналенія пузыря, но еще от в многих в причинъ, иновенное какъ-то отъ раздутія геморрои дальных в жилв, отъ поме-сатаствіе та стустившагося и остановившагося въ послъдней кало-воспаления ма стустившатося и остановившатося в последает како пузыря, извергательной кишкі, от камия в пузырі, от в мяси- можеть етых в наростов в в в стволь, от в паралита пузыря, от в зависьть истеритеских в страданій и проч: каждая из в сих в при- от мночинъ требуетъ особеннаго пользованія, кое мы пред-гихъ приложимъ послъ въ главъ 23, § 3 сего Тома.

Мы дадимъ только знать, что въ каждой изъ понатие о нихъ легчайшія лъкарешва всегда бываюшь надежньй-пользовашими; потому что сильныя мотегонительныя и другія ваго сія лъкарства свойства раздражательнаео обыкновенно причины H 1- пребуумножають бользнь, или опасность. Я видьлъ кс-юшъ. У у 3

жность нбвпускали шпринца в ствола, дабы чрезь то, какь
вижей вы они говорили, вытьснить изы онаго то, что прослучать тивится теченію мэти; а другихь, которые причиостановин нили себь сильное воспаленіе пузыря, вышвая сы такимы же намыренісы сильныя мотегонительныя,
каковы суть терпентинное масло, скипидара и проч.

5 6.

О воспалении петени или петенотной коликв.

трудно на сколько большая часть других терево, потому что выпольвыпольвыполькругообращение вы оной весьма медленно; но когда уже вань оно одины разы составилось вы оной воспаление, то весьнаще веего ма трудно оное вылычить, и часто оно кончится навенчится.
венчится.

ЧЛЕНЪ І.

Прихины воспаленія петени.

Кромв общих всвы воспалентяло причин воспаление петени можеть произойти от излиштей дородмости, от желвака вы самомы составь петени, от великих усплій, причиненных реотою вы то время, какы уже петень попортилась; от крови весьма разгоряченной, терножелтной; от весто того, что сго.
ряча внезапно можеть простудить петень; от калней, сопротивляющихся теченію желти, от излишняго питья вины и спиртных напитково, от употребленія яство припряненных, горятительных и
от упорной ипохондріи и проч.

ЧЛЕНЪ ІІ.

Признаки воспаления петени.

Сіл бользнь оказывается бользненным раздираправом в правом в боку, под в ложными реблами, соединеннымъ еъ нъкоторою лихорадкою, съ чувствіемъ тякести или полноты въ томъ мъстъ, съ трудностію въ дышаніи, съ отвращеніемъ отъ летев, съ жаждою жгучею, съ цвътомъ баъднымъ или желтоватымъ на кожъ и въ глазахъ.

ВЪ сей бользни признаки перемьняющей по сще-Признаки пени воспаленія и даже по воспаленной части. Иногда выпуклой боль бываеть столь легкою, что человькы и не дучасти пермаеть, чтобь было воспаленіе.

Но когда воспаление будеть на выпуклой части, нг. е. на верхней части петени, то боль тогда бываеть остръйшею, пульей скоръйшимь, и больной часто мучится сухимь кашлеми и икотою; боль простирается даже до плеча; больной трудно ложится на лъвомь боку и проч.

Сія бользнь различествуеть оть колотья тьмь, что различто боль не столь остра, что она находится часть сів подь ложными ребрами, что пульоб не столь ке от нестоль, и что больному трудно лечи на противоно лотья: ложенной тому боку, гдь находится гньздо соспаленія, т. е. на бокь львой.

Она различается от истерики и ипохондри от нетестененем в лихорадки, которой всегда ее сопровож- инохондаеть.

(Ее наиначе различають по цвыту блыному и зеленоватому страждущихь оною, каковаго вы другихь упомянутых бользняхь не примычается; это почти одины только вы оной различательной знакь: посему - то знаку, говорить Г. Ліетодь, на-ипаче различають воспаленіе петени оть воспаленія внутренной грудной оболотки и мышиць терева; бользней, которыя, судя по мысту боли, между собою весьма подобны. Еще же случается, что боль

петени нереходить вы другія части подбрюшіл; оты чего сльдують, какь-то всякой можеть догадаться, такія затрудненія, кои преодольть не иначе можно, какь долговременнымь опытомь и великою проницательностію.)

Когда сія бользнь пользована хорошо, то ръдко дълается смертельною.

Признаки антонова огня. (Но ничто такъ не страшно въ сей бользни, какъ внезапное престанте боли, хотя другте припадки еще продолжаются; потому что больной тогда угрожаемъ бываетъ антоновы мо оснемо.

Когда она превращается въ желеако, то больвей боль; ной можеть прожить много льть, не чувствуя больвин, ногда
она коншой боли, только чтобы соблюдаль пристойное пищечитея жел- употребление; но ежели слишкомы предастся спирпевакомы изъ веществы животныхы; ежели будеть принимать лькарства пряныя и раздражательныя: то желеако превратится вы рако, коего послыдствия всегда бывають смертельными.

канъ нончится воспаленіе
печени: раз воспалена. Она иногда кончится разрішеніемо ;
но чаще тімь или другимь изв упомянутых способовь.
Когда оно кончится разрішеніемо, то почти не заходить за третій или четвертой день; а когда зайдеть за седьмой, то надобно ожидать насноснія, или
желеаковаго завала. Мало находится пособій противу
нарыва петени, хотя и есть приміры, что гной выпоражнивался рвотого, пометомо, мотего и проч.

Прежде дальный шаго чтенія читай, і и 2 главы вего Тома.)

ЧЛЕНЪ ПТ.

Пищеупотребление, какогое надобно предписывать вб

ВЪ сей бользни надобно наблюдать то же пищеупотребление, какое вЪ другихЪ воспалительных бользняхЪ, и каковое мы предложили выше, вЪ членахЪ ІП и IV, § 1 и 2 сей главы.

Надобно избъгать всего того, что разгорячаеть; питье а пить напротивь того надлежить обильно прохладительной и мокротожидительной жидкости, какь-то сыворотки, ясной воды и проч.

Аства должны быть легкими и малопитатель яства. ными; больному надобно быть покойну тъломъ и духомъ.

ЧЛЕНЬ IV.

Пъкарства, кои надобно предписывать вз воспалении петени.

Жровопускание пригодно въ началь сей бользии, кровопуи часто нужно бываеть повторить оное, даже хотя первыхъ
бы пульсо и не казался жесткимо; но умножать его не первыхъ
надобно безъ великой нужды по прошестви пятаго дняхъ.
дня. Надобно воздерживаться отъ всъхъ сильныхъ
тистительныхо, однако надлежить животь держать слабительна свободъ; на сей конецъ потребно давать декокта ныя.
изъ тамариндово съ небольшимъ количествомъ меда,
или манны.

КЪ больному боку надобно почасту прикладывать принарки припарки изъ теплой воды такимъ образомъ, какъ мы предложили въ предыдущихъ болъзняхъ.

Надобно еще наставлять почасту промыванія слабитель слегка слабительныя; и ежели боль всю остается въ ныя промыванія и Сво- Мыванія и нарывных.

евоей силь, то приложить къ больному мъсту нарысныя.

мочетонимельныя. Здёсь составляють великое пособіе; выслёдствіе чего больному надобно давать вы его декоктв по четыре грата перегищенной селитры (nitri depurati), или по шести капель спирта услащенной селитры (spiritus nitri dulcificati): сїе лёкарство повторяєтся три или четыре раза вы день.

СпособЪ Ежели у больнаго есть расположение къ поту, содъкството надобно возбуждать сте выметанте, но никогда вашь пошу, потогонительными горячими. ВЪ семЪ случав позволиногда онъ самъ отъ шельно давать больному обильно пить мокротожидисебя бытельных отварово, теплых до степени теплоты паеть. крови, т. е. 40 тритцати трехъ градусовъ, или около, Реомюрова термометра; ибо въ семъ случат и вовсьхъ другихъ помъсшныхъ воспалентах больному не надобно ничего пишь шакого, что холодиве крови.

тио надоб- Ежели живошЪ слабЪ; ежели еще и помето кроно аблать, вавЪ, що не надобно ничего давать для остановки
когда ноносъ:

сего выпоражниванія, естьли слишкомЪ не разслабляетъ оно больнаго: сей поносо часто бываетъ переломо, которой прекращаетъ тогда бользнь.

Когда воспаление печени превращается вы надобно по- рыеб, то надобно употребить всь, какія только изетупать, выстны, лыкарства, чтобы оны лопнулы и вышелы намогда воспаленіе пе- ружу: сій лыкарства суть припарки, клыбы сы тепчени пре- лымы молокомы, назрывательныя катаплазмы и проч. аращается Правда, иногда матерія нарыва или гной выходить сы мосего, сы пометомо, но это только усилія природы, кои не можно опредылить или назначить.

Когда нарыей лопнеть внутри живота и матера разольется вы великомы количествы по под-

брюшию, имо обывновенно последуеть смерть. Жребей больнаго не щастливье бываеть и тогда, когда нарыей отворяется снаружи посредствомь насыкамия, есть ли только вы семы случав петень не приросла кы перитонеумы, такы что составляеть сакы или какы бы сумку вы пространствы подбрюшия. Вы самомы дыль, ежели бы нарыву даны былы проходы посредствомы широкаго чрезы насыкание отверстия, то выроятно, что можно было бы спасти больнаго (10).

Ежели нри всвх сих в нособіях в больны превань; ай вратится в желеак вы желеак пто больному надобно распорящи для для дить своею діэтою так в, чтоб не отягчать бо-больнагов пьзни, воздерживаться от излишества мяса, рыбы, сем слуоть спиртных папитков , от всего очень соленаго, или очень приправленнаго. Ему надлежит большею частію питаться растеніями, как вто плодами, кореньями, двлать умфренное твлодвиженіе, пить сыворотку, ясиню соду, сыворотку послі пахтанья и проч. Ежели желает он напитка покрыте, то позволительно ему разв одно але или легинькое полнивцо, которое не столько горячить, сколько вино и другіе спиртные напитки.

Мы не будемЪ говоришь о воспалении другихЪ терево обращение подбрюшия; оно вообще должно пользуемо бышь по прави- на воспаламЪ, нами предложеннымЪ (вЪ самомЪ дѣлѣ, нѣшЪ меніе другособенныхЪ лѣкарсшвЪ на воспаление селезенки, сальни-стей подка, мыший подбрюшия и проч.) ПервымЪ правиломЪ брюшів должно поставить, относительно кЪ каждому изЪ оныхЪ, чтобъ избѣгать всего неудобоваримаго и свойфром ф д ства

(10) Можно чувствовать, что представляемый забсь сочинителемь случий весьма нежень, и что одня тольно искусные во Врачебной Наукт люди могуть къ оному приступить. Почему накъ скоро примъчено будеть, что бользы не уступаеть предложеннымъ ленарствамъ, то надобно призвать опытнаго Врача и во всемъ положиться на его наставления.

етва горятительного, прикладываны къ больному мъсту теплыя припарки, и давать больному обильнопить теплаго декокта мокротожи дительного и проч.

ГЛАВА 22.

О холерь - бользии, о мыть, о понось и о ресть.

§ 1.

О холерь-бользни.

Свойство сей болбзЖогера-бользив есть непомърное испражиенте верхомъ и низомъ, соединенное съ ръзомъ, тоского и безпрестанными позывами къ стулу. Стя бользнь вдругъ нападаетъ; она обыкновеннъе осенью, нежели въ другтя времена года (особливо ежели были великте жары, а плодовъ лътнихъ не было, коихъ употребленте умъряетъ ентощую остроту желти). Бользнь стя весьма остра; почти нъть другихъ бользней, которыя бы скоръе похищали больнаго, какъ стя, когда не были употреблены благовременно приличныя лъкарства. (Самые сильнъйште люди падають отъ нес иногда въ сутки, или въ два, или три дни.

Сколько видовъ оной; Иппократь раздъляеть на два вида холеру- 60льять: одну на мокрую, а другую на сухую, т. е. одну съ выпоражниваниемо, а другую безъ выпоражнивания.)

членъ І.

Присины холеры - болвани.

Жолера-бользиь причиняется излишествомы и гнилого остротого желти, яствами скоро закисающими и протухающими выжелудкь, какы-то коровымы масломы, свинымы саломы (а), конфектами, огурцами, дынями, вишнями и

⁽а) Я быль два раза при врашажь емерши оть сей бользни, ноторги въ обоижь случаяжь причинена была оть нущанья негодной и промаглой ветчины.

другими плодами свойства хладнаго; иногда она происходимъ отъ тистительныхв, или реотныхв вдкихъ и сильныхъ, отъ веществъ ядовитыхв, мытатьихв, меркургальныхв, сурьмяныхв, или купоросныхъ проглоченныхъ въ желудокъ; отъ простуды тъла, отъ болей зубопроръзывангя и проч: почему и младенцы оной подвержены. Наконецъ она можетъ причинена быть сильными страстьми и великими впечатлънгями на дуту, какъ-то страхолю, гнъволю и проч: (1).

ЧЛЕНЪ II.

П ризнаки холеры - бользки.

Предъ холерою - бользий обыкновенно случающей признаки изгага или жгучйй жаръ прошивъ желудка и утробы, предше-кислыя отрыжки, вытры, боли въ желудка и кишкахо. ствующе;

За сими припадками следують неномерная реота харантеи обильное выпоражнивание низомь желги зеленой, жел ристичетой, черноватой, соединенное съ раздираніемь въ скіежелудав и несноснымь резолю въ животь.

ф ф 3

(H&

^(1) По сей - то первой изъ сихъ причинъ Г. ле Роз называетъ жолеруволбянь ликорадною желчною весьма острою, въ коей переломъ дълается реотою и поносомь; но надобно замътить, что когда она происходить оть сей причины, то она нападаеть только въ велиние лътние жары, между шты накъ она можетъ приключиться во всякое время, когда она причинена бываеть чемь нибудь вреднымь, проглощеннымь въ желудокъ, сильными страстьми и проч. Надобно еще замътить и то, что жолера - волбана, произшедшая от в излишества желчи вдкой и гнилой, нъсколько не такъ опасна, какъ произшедшая отъ другихъ причинъ: шогда она шольно есть непомърной желчной понось, потому что при всткъ ужасныкъ признакажъ, ее сопровождающихъ, ръдко больные оть оной умирають. Многіе люди, говорить Г. Тиссоть, оть оной выльчивающея. И шакъ находящиеся въ началь сей бользни не должных терять бодрости; и ежели чувствительность ихъ побуждаеть уступинь боли, страку, ужасу и проч: то надобно имъ призвать другикъ людей, ношторые бы могли собрать весь свой умб въ стю пранцическую минуту и оказать больному надлежащи пособія.

(Нькогорые больные испражнялись низомъ сто разъ чрезъ ньсколько часовъ; они худьли примътнымъ образомъ, и чрезъ три или четыре часа, ежели сти выпоражнивата продолжались съ такою же силою, ихъ не можно было и узнать.)

Больной шакже чувствуеть жгучую жажду; его пульсё очень скорё, очень мале, концентрироване, неровене; часто оны испытываеть весьма острую боль противы пупка.

По мъръ, какъ бользнь усиливается, пульсо утвераив- унижается, и часто дълается непримътнымъ; констношейся бости холодъють, или больной терпить судороги въ смертель. Оныхъ, и часто онъ покрываются холоднымъ потолю; ные.

мога останавливается, и у больнаго дрожить сердце. Но сильная икота, обмороки, корти суть знаками близкой смерти.

Особенные

Сте изчисленте признаков в особенно принадлежит в колер в сользии мокрой, которая, дошедши до побользи слъдняго степени, представляет веще слъдующте:
мокрой пальцы стибаются, ногти становятся синими, лицо
свинцовым в; у большаго ссть и головок ружентя; голос в погасает в; бенте артерт едва чувствительно;
корти и удушентя слъдуют в друг в за другом в св бы-

особенные признани стротою; наконець больной тщетно усиливается на въ холерв- рвоту, и смерть полагаеть конець всемь его страбользии даніямь.

Что касается до холеры бользии сухой, то она столь рыдко случается вы нашихы климатахы, что почти безполезно ее описывать. Сиденгаты говориты, что ему случилось ее видыть только одины или два раза. Впрочеты, воты особенные ся признаки: брюхо жестоко, заперто, и производиты звукы какы бараны, когда вы него постучить; больной испускаеты много ест-

«Етрово низомъ и верхомъ; онъ не блюетъ, ни кодитъ на дворъ; онъ жалуется на нестерпимыя боли въ груди и въ боку; но онъ, кромъ выпоражниваній, терпитъ всъ припадки холеры - бользии мокрой.

Хотя холера-бользив очень сходна съ желиными и чъмъ разкровавыма поносома, однако она различествуеть тъмъ, мичается колера бочто і) она пристасть почти вдругь къ больному, авзнь отъ что ея усилія стредительны, и что она оканчивает желчаго к ся в семь или восемь дней; 2) что помето быва-кроваваго еть кровавымо тогда только, когда бользны находится въ величаншей своей силь, а въ кровавомъ поносъ полето часто покрывается кровію, даже съ начала бользии; 3) жиленье, или пустые позывы ишти кЪ стулу, не столь упорно въ холерв - болвани; 4) реста бываеть только по случаю въ кросасомо поносв: она не следуеть изв естества бользия, а напрошивъ всегда сопровождаетъ холеру-бользиз; 5) кровавой понос 3 заразителен в или прилипсив в, ахолера-бомезны не шакова; наконець холера - болезны различествуеть оть желтного попоса тыль, что сей послыдпрвисходишь только оть желгнаго скопа, успремленнаго кЪ послъдней калоизвергательной кишкъ оть перисталтического сжатія кищоко; а вы первой движенте сте бываеть въ противномъ смысль, что и причиняеть рвоту, которая есть однимь изв главньйших в свойствь, такь какь мы ноказали вы с примъчании сей главы.

Прежде дальнъйшаго чтентя читай г и 2 главы сего Тома.)

членъ Ш.

Пользование, каковое должно употреблять в колеры-бо-

УсиліямЪ, производимымЪ натурою вЪ началь сей поизванісь. бользни для избытія изЪ себя бользистворной матеріи, надобно пособлять, поддерживая реоту и по-

REPRESENTE ВЪ следствие сего больному надобно принимать нли телячья вода разъ за разомъ по большимъ рюмкамъ мокротожидительных вишій, какв-то сыворотки, сыворотки попо большимърюм- слв пахтанья, легкой ясной, или овсяной воды, или, камъ, да что лучше всъх сих питій, цыплячьей или телячьи часто; и въ про-ей воды, весьма легкой. Не токмо же надобно ему мываніяхь ихь пишь обильно для продолженія реоты, но еще трезъ кажи наставлять их в себъ в в промывании чрез в каждой час в дой часъ. для произведенія выпо ражниванія низомь.

Послъ шого, какъ сін выпоражниванія продолжа-Средства остановемы будуть чрезь некоторое время, надобно больляшь рвоту: жать ному давать пить хавбиой воды, делаемой изв овсянаго хавба сушенаго, дабы мало помалу умвришь и ная вода; какъ она остановить рвоту. Сей хльбь должень быть подсушень пріугоили изжаренъ такъ, чтобъ онъ сдълался темношовляешся. краснымЪ: по томЪ варится онЪ вЪ ключевой водъ; ежели не случишся иметь таковаго хлеба, то вместо его можно употребить птеничной хавбъ, или по нуждв ржаной довольно изжареной.

Соленой Ежели это нитье не уйметь реоты, то на ложеть и добно больному давать чрезь каждой чась, пока перешумь. станеть она, по двъ ложки соленаго голепа (julepii falini), въ которой прибавлять по десяти канель лаудана ликвида (landani liquidi).

Однако не надобно очень скоро спешить оста-Не надобно новлять реоту и поносб, а надлежить напротивь подепъшить останавлидерживать их и даже возбуждать, пока еїи выпоражвашь рвошу, есть ниванія не ослабляють больнаго. Но какъ скоро они произведуть сте дъйствте и силы больнаго уменьшатся, аи ошр оной не что познается из в пульса и проч: то тотчас в надобно обезсилълъ прибъгнущь къ болеутолительному, каковое мы одобольной. брибрили, т. е. къ лаудану ликвиду, по прівму десящи канлей его въ двухъ ложкахъ соленаго полепа, въ которой можно прибавить добраго вина, спиртней коришневой воды, или другаго чего кръпительнаго. Тен-Сыверотка лой негусъ, или сыворотка съ кръпкимъ виномъ также нужна для поддержанія силь больнаго и возбужномъ номъ денія испарины.

Надобно ему мыть ноги въ теплой водь, по умовенія томь тереть ихь фланелью, или окупать ихь въ ногь; третена пеплое одьяло и приложить къ подошвамъ ногь теп-кои надоблые кирпичи; сверьхъ того приложить противъ же-но дерлудка фланель, обмоченную въ шеплые спиртные нажать въ теплъ; спиртныя припарки

Пользование колеры - бользии, когда жестокость больз-ку.

Когда жестокость бользни прошла, то для надобно предупрежденія возврата оной нужно продолжать чрезь продоливсколько времени употребленіе лаудана по малому требленіе пріему; его надобно давать оть десяти до двънатца-лаудана въ ти канель въ рюмкъ зина два раза въ сутки чрезъвинъ. восемь или десять дней.

Яства больнаго должны быть питательными, но яства и надобно ихъ давать по малому количеству, и выздо-тълодвиравливающему надлежить дълать умъренное тъло-жение.

Томб II.

Xx

КакЪ

къ желуд-

⁽²⁾ Г. Тиссоть совышемь вы семь случай цыльным теплым вани; оны пыльным говорить, что надобно вы оной держать больнаго долгое время, и выбани и де-то же время давать ему по семи или восьми рюмонь деловта изы трехы нокть изы унцій тамариндовь и фунта воды. Оны даеть знать, что какы скоро тамариновь предписаль сін два лыкарства больнему, то реота унялась, и что довь какы сей больной вышель изы вани, то великимы множествомы исправа днился нанизы: оты чего и сила боли наречито уменьшилась.

настой съ КакЪ послъ сей бользни желудоко и кишки быкиною или вающъ весьма слабы, що больной долженъ пишь нъсъ чъмъ сколько времени настоя съ хиною, или другой какой въ подин- горети въ винъ, подкисленномо помощію купороснаго сленномъ эликсира, щакъ какъ предписано въ главъ 2, ∫ 3 сего винъ. Тома.

Хошя Лъкари ръдко призываемы бывають Сколь ни благовременно въ сей бользни, однако они не должны **в**шрашна отчаяваться въ облегчени больнаго даже въ обетоеіл болъзнь, одятельствах в наиболье тревожущих в. Я сам в недавно нако не надобно въ это испыталь надъ однимъ старикомъ и его сыномъ, конмЪ вдругЪ сдълалась стя бользнь вЪ полночь; я приней ошчаявашься. званъ уже былъ на другой день поутру: Больные по-ПримърЪ ходили болъе на мершвецовЪ, нежели на живыхЪ лю-HOMY. дей; у нихъ не можно было чувствовать и пульса; конетности ихъ охолодъли и одеревенъли; силы ихъ еовершенно истощились; зракЪ ихЪ былЪ ужасающій: однако они посредствомъ болеутолительных в и крвпительных выше, от сего плачевнаго состоянія освободнансь.

§ 2. О мы т Е.

мыть не всегла бы- на и частьйшее выпоражникание водянистых в матерій, есть не столь бользнь, сколь спасительное средство, натурою употребляемое для возстановленія порядка в работах в тыла и к возвращенію аппетита.

Когла онъ И так В мыто, естьми только не случился потребуеть слё излишества в В столь, послё кушанья яств В недіяты: удобоваваримых В; или от В того, что яства недовольно были пережеваны, не требует В никакого лёкарства, даже ни самой діяты.)

Пользование мыта.

(Ежели же мытв произошель от упомянутых питьем причинь, то діэта становится нужною; и такь больной должень воздерживаться от мяса и бульюна, пить же должень тай, или настой съ роматковыми цвътами, или другаго какого настоя, или можеротожи дительнаго поощряющаго декокта. Сверхъ того должень наставить себъ промываніе на простой промывань одь, а питаться соросинским писном или другими ніям неществами мучными и овощными, пока утружденный его желу доко возвратить свои силы, а съ оными и аппетить.

Мыто редко продолжается чрезь долгое время; сноль долонь вообще проходить черезь день, или черезь два. го продолжается когда же онь долее продолжается, тогда зависить жается мыть? онь оть какой нибудь болезнетворной причины и при когда причимаеть на себя имя уже поноса, коимы мы будемы нимаеть онь на себя имя уже поноса; себя имя поноса?

\$ 3.

Опоносъ.

(Поносо есть выпоражнивание пометомо мате-понось разрій жидких и различнаго свойства; почему и раздь-дъляется ляется он по свойству матерій, им уносимых в: на пасочной, желчон в иногда бывает в пасотнымо, иногда желтнымо, а ной, проиногда проливнымо; еще же раздъляется он в на су-ливной, щественной, крититеской или переломной, и симптоственной, матитеской.

Пасотной поносо ръдко бываеть существеннымо, весь-и критима часто симптоматитескимо, и никогда крититескимо; ческой. напротивь того желтной поносо часто бываеть существеннымо, весьма часто крититескимо, ръдко симптоматите-

X x 2

скимв;

вкимв; наконець проливной поносв всегда бываеть симптоматисескимв, и всегда худое предзнаменуеть, какь-то можно было видьть вь лихорадкахв внутреннихв, нервныхв, гнилыхв, злыхв и проч.

въ семъ ваться о датьсь только будетъ толковаться о поносахо, будетъ могущихъ быть существенными, часто случающимися, каковы суть пасотной, а наипаче желтной, которой чаще ваться о всего случается.)

кои мо-

бышь су-

ицествениыми. Признаки поноса.

(Поносв обыкновенно соединенъ бываетъ съ отвращентемъ отъ вды, бурчантемъ въ кишкахв, легкими болями въ утробъ, частыми позывами къ стулу, иногда жиленъемв, распухлосттю брюха, ръзлми, су до рогами въ ногахъ въ случаъ продолжентя бользни, облороками и проч. Мога густа, красна и въ маломъ количествъ. Наконецъ когда поносв запущенъ, или худо пользованъ, то онъ принимаетъ на себя всъ свойства дизинтерги (кроваваго поноса), отъ коей онъ не можетъ болье различиться, и о коей мы будемъ говорить въ Томъ III, главъ 25, § 7.

Но когда поносб сдълался по случаю или самЪ Случайный поносъ отъ себя, да и не былъ противоборствуемъ лъстоль же карствами: то онъ не опасенъ, такъ какъ и мытв, не опасенЪ, да еще и долженъ почитаемъ быть въ большей части какъ и мышЪ. обстоятельств в болве спасительным выпоражниваніемв, нежели бользнію; и такъ никогда не надобно его останавливать, естьли только онъ слишкомъ не продолжается и очевидно не разслабляеть больнаго. Однако какЪ иногда больные подвержены сему последнему случаю, то мы теперь опишем в обыкновенныйшия причины сего вида поноса и каждому пристойное пользованіе.

ЧЛЕНЪ І.

Пользование поноса произшедшаго отб простуды или остановки испарины.

Когда поносо произошель ощь простуды или теплота, остановки испарины, що больному надобно держаться мокротовы вы тепль, пить обильно мокротожидительного отвара, ной отмыть себь руки и ноги вы теплой водь, носить на варь, умостью фланель, наконецы употреблять всь извыстныя вене ручь средства кы возстановлению испарины, каковыя мы предложили вы Томы I, главы 12, вы 3 и членахы на ножых оты онаго зависящихы.

ЧЛЕНЪ II.

Пользование поноса произшелшаго отб излишества мокротб.

ВЪ поносахд, произшедшихъ отъ излишества мо-нужда въ кроть, реотное есть приличнейшее лекарство. Реот-реотныхъ въ семъ ныл не токмо очищають желудокъ, но еще пособлястучать ютъ другимъ вылетангалид; отъ чего они бывають весьма нужными къ изгнангю остатковъ несваренной въ желудкъ дряни и сора отъ попоекъ. Пятнатцать ипекаку или дватцать грановъ ипекакуанги въ порошкъ весьма анга. хорошо выполнятъ сте показанге.

Спустя одинъ, или два дни послъ рвотнаго, надобно дать полдрахму ревеню и повторить сей приемъ ревень. два, или три раза, ежели поносб будетъ продолжаться.

Больной во время сего пользованія должень пи яства и таться легкими и удобоваримыми растеніями, а пить питьестью ротку овсяную, или ястую воду, такь какь мы будамь говорить вы Томы III, главь 43, толкующей о непищева реніи.

ЧЛЕНЪ

ЧЛЕНЬ Ш.

Пользование поноса произшедшаго отб остановки ка-

Когда понос впроизошель от остановки какого Кровопусканте; нибудь обытайного выпоражниванія, какЪ-то потетуя, и когда оно не довольно, кровотетения из носа, месятных и проч: то вообще надобно прибъгать кЪ кровопусканію. Ежели оно буто сразмърныя деть недовольно, то надобно вознаградить недоставыпоражтокъ другими выпоражниваніями, сходственными съ ниванія остановив- тыми, кои остановились, и тогда же употреблять всв мимся. пристойныя средства кЪ содъйствію обычайных выпоражниваній; потому что оть того зависить не только выпользование бользни, но и самая жизнь больнаго (3).

ЧЛЕНЬ IV.

Пользование периодитеских поносовд.

Сей видь Перго дитеские поносы никогда не должны остапоноса нинавливаемы быть; они суть всегда усилими натуры, когда не надобно стремящейся изгнать бользиетвориую материю, котоостанаврая ежели бы осталась вы тълъ, но бы произвела паливать. губныя послъдствия.

ANN Mero ?

(ВЪ самой вещи у нъкоторых в людей бывает в сам в от в себя понос в в в нъкоторыя урочныя времена года, как в - то весною, а наипаче осенью. Это есть долг в,

⁽в) Изъ сназаннаго г. Буханомъ ясно видно, что провопускание въ поносъ тогда только пригодно, когда тоть поносъ произошель отвъ остановая какого нибудь провянаго выпоражнивания, каковы суть упомянутыя; а въ другихъ случаяхъ на оное никогда не надобно покущаться. Крайне бы было не благоразумно пускать кровь въ случат остановия прижигания, вереда, раны и проч. на какомъ бы мъстъ тъла они ни были; въ сихъ послъднихъ случаяхъ остается дълать игольно то, чтобъ возстиновить остановившееся выпоражнивание, да еще и въ томъ самомъ мъстъ, ежели это возможно, въ ноемъ оно прежа ве было, прижиганиемъ.

долгь, которой они илатять натурь, дабы послъ наслаждаться постоянным в здравгемв; и такв всякв ножешь догадащься, сколько бы было опасно не уважить сего выпоражниванія, оть коего зависить будущее здравје выпоражниваемаго.

Я видель одну даму, которая будучи на трит-примерь. дать второмъ году, приметила, что за ея месятными всегда слъдоваль поносв, продолжающійся столько же времени, сколько и мвсятныя, іп. е. отъ четырехЪ до няши дней. Она сперва безпокоилась; но посовытовавшись съ однимъ искуснымъ Лькаремъ, удобно успоконхась: сего года до сорокъ пятаго ел мвсясных мало помалу пропадали, но понос впродолжался по такой же сразмърности, такъ что хотя месятныя совств уже перестали, но остался поноев продолжавштися всегда ошь семи до осьми дней, послъ коихъ самъ собою проходилъ. Впрочемъ онъ въ ней не производиль ни отвращения от в пищи, ни боливъ жывошь, ни слабосши; а только сія дама воздерживалась оть мяса, доколь онь продолжался, и употребляла каждое утро проливание.)

Младенцы весьма подвержены сему виду поноса, періодичеа особливо во время зубопроразывания; но онв, ко-ской погда у нихъ въ сте время бываетъ, не токмо не вредишь, но еще и освобождаешь ошь боли.

Однако ежели сей понова причиняеть раза, то разывания можно давать младенцу по кофейной ложечкъ бълой магне-полезенъ. зи (magnefia alba), сывшанной съ четырмя или пашь- Онъ тогда ми гранами ревеню въ небольшомъ количествъ панады, пребуетъ или вЪ другомъ какомъ яствъ. Ежели сте лъкарство по- лъкарствъ, вторено булеть при или четыре раза, по не пре-ногла приминешь вшянущь въ себя кислоту соковь, ушишишь рызь. резы и остановить поносв, такъ какъ мы будемъ говорить пространные вЪ Томы IV, главь 51, § 8. **ЧЛЕНЪ**

дени мъ во время зубопро-

ЧЛЕНЪ V.

Пользование поноса произшедшаго отд страстей или душевных поражений.

пребуеть или от душевных в произшедшій от в сильных в страстей или от душевных в пораженій, должно пользовать съ предосто. Великою предосторожностію. В сем случа в рвотиыл рожности, не пригодны; тистительныя также не безопасны, естьней нужеть не имъ- ство нужеть не будуть весьма легкими и въ малом вы ни въ количествъ.

вышель. Волеутолительных и другія антиспазмодитескій етитель. лівкарства болье всего пригодны: и так надобно даных. вать чрез каждые восемь, или шесть часов по десятительных пи, или двінатцати каплей лаудана ликвида (Laudani нанти. (linguini в рюмк настоя с булдырьяноло (valeriana), епасмоди- или пулеем (pulegium), покуда пройдуть припадки. чеснія яв-

карения Спокойствіе души и веселость въ семъ случать наиболье весьма нужны.

пригодны. Нужда въ

ЧЛЕНЪ VI.

реселости. Пользование поноса произше дшаго от в ядовитых в проглотенных веществ в.

Когда поносо произошель оть веществь вакихъ **Н**адобно произвести или ядовитых проглоченных въ желудокъ, то больрвошу и ному надобно пишь, сколько можно, поболье пишій выпоражинвание ни- мокротожи дительных в в кои прибавить масла из Б зомъ: на- сладкаго миндаля, или жирнаго бульюна, дабы ними сред. произвести выпоражнивание низомъ и верьхомъ. Ежеешвами! ли же есть причина сомнъваться, что кишки восвъ какомъ палились, то нужно будеть отворить кровь; для случат утоленія же раздраженія кишоко можно давать по кровопумаленькимъ пртемцамъ лаудана ликвида. Мы пространсканіе! нъе будемъ говорить о поведении, каковое должно Волеутолишельимыть вы семы случав, вы Томы III, вы главы 48. MMA.

Ч.ЛЕНЪ

ЧЛЕНЪ VII.

Пользование поноса произшедшаго от кепорядочной подагры.

Ежели поднявшаяся кверху подагра причиняеть по- Ревень и посо, то надобно поддерживать его небольшими пріемцами легкія черевеня, или других в легких в тистительных в. Надобно нымо еще стараться оттянуть подагру кв конетностям посредством в припарок в, катаплазмов в проч. и в принарни то же время возбуждать испарину теплыми мокрото- и катамы мидительными питіями, как в- то сывороткого, в в ко- торую прибавляется спирт из воленьяго рога (fpiritus cornu cerui), или насколько каплей лаудана ликвида (laudani liquidi), так в как в ны покажем в в Том в III, глав в 33, \$ 2, гд в толкуется о подагрв и средствах в ею требуемых в, когда она пала на терева подбрющія.

ЧЛЕНЬ VIII.

Пользование поноса произшедшает и содержимает гли-

Когда попосб произошель оть глиств (что оловянной узнается изв помета влзкаго, клейкаго и смышавшаго-порошокь, ся сь частицами окольвшихь глиств и проч.): то масло де пальма шребуеть онь употребленія лькарствь, кои выгоня-христи, ють и убивають глиств, каковы суть оловянной поро-ревень и шокв (pulvis stanni), масло де пальма христи (oleum масло де равта Сьгізті) и систительных составляемыя изь ревеня и каломеласа.

Послё сего надобно давать известковой воды одной, известкоили смёщанной, или настоенной съ небольшимъ коли-вал водачествомъ ревеня для укрёпленія кишоко и для возпренятствованія возрожденію глисто: о прівий сихъ лекарствъ мы упоманемъ въ Томе III, главе 30.

Jones II.

ЧЛЕНЪ IX.

Пользование поноса произшедшаго отб нъкоторых вод вод в.

Не употреблять ВЪ семЪ случав сїя бользнь обыкновенно бываетъ всесихъ водь, или попратовною. Когда точно дознано, что сїл влять ихъ или другая какая бользнь произошла от употреблетосреднія нездоровой воды, то надобно тота сдълать, ной извето надобно понравлять худыя ея качества негашеною сти, мъла известью, ледломо и другими подобными веществами, и проч. такъ какъ сказано въ Томъ І, главъ 3.

членъ х.

Пользование поноса произивдшаго от славости желу дка.

Люди, имъющіе слабой желудокЪ, подвержены Воздерпоносу, как в скоро савлають они сильное твлодвижежность наго пъло-ніе топічась посль кушанья. Вы семы случав коша всякъ можетъ предвидъть, что надобно тутъ дъдвиженія послу ку- лашь; однако же симъ людямъ кромъ воздержности manba. от в веякаго сильнаго талодвижения надобно еще употреблять лекарства укрыпляющія желудокь, какь-то настой съ настои съ хиною и съ другими горькими и вязатель. ными растензями въ бъломъ винъ, да еще время отъ XHHO10. времени пишь по одной, или по двъ рюмки стараго Вино. вина де Порто, или добраго вина Бордосскаго.

ЧЛЕНЪ XI.

Общёл правила пользовать, какой бы ни былб поносв, когда обстоятельства требують остановки онаго.

Діэта. Отъ какой бы причины ни произходиль поносв, но ежели обстоятельства потребують остановки она-

ro,

то, то надобно больнаго посадить на діэту, состой ящую изъ варенаго въ молокъ соротинскаго пшена и ястью подблаговоненнаго корицею, изъ сагу съ краснымъ виномъ и небольшаго количества жаренаго мяса, а вмъсто питья употреблять овсяную воду, или питьей воду вареную съ соротинскимо пшеномо, или легиюй бульюнъ. Наипристойнъйшій въ семъ случав наиприбульюнъ есть телячій, или теплой студень изъ годившій бараньей головы, какъ гораздо склизистве бульюна, случав изъ бараньяго, говяжьяго и куринаго бульюна. Рецептъ бульюнъ на сте дадимъ мы въ томъ ПІ, главъ 25, въ 5 7, изъ бараньей гожаньей гожаньей

(Изъ всего сказаннаго въ семъ и предъидущемъ Сонращение § слъдуеть, что никогда не надобно приниматься лъ-того почить мытв, поносв, прежде нежели извъдана будеть ему надобпричина; что какъскоро она найдена будеть, то діэта но следоесть первымъ предметомъ, на которой надобно обра-вать въ щать вниманіе; что къ лекарствамь надобно прибеніи мыта гать только тогда, когда упомянутыя бользни раз- и поносаслабять больнаго; что когда нужда приводить приступинь кЪ лекарствамЪ, то всегда надобно начинать съ услаждающихъ мокротожидительных в и слабительныхв; что по томъ надобно приступить къ желудкокрвпительнымв, изв коихв хипа, полыпв, золототысятникв, корица, межжевеловой экстрактв, діаскордіумв, доброе вино супь сильнейшими и навсегда предпочтительный шими; что наконецъ приниматься за вявательныя авкарства надобно только весьма редко, да и ев величайшею осторожностю, хотя ихв бабы лькарки всегда совътують съ первых в знаковъ попоса, комми онъ часто производять воспаления или завалы: бользни гораздо досадньйшія той, которую хотять онв выльчить.)

ЧЛЕНЪ ХІІ.

Средства предохранять себя отб поноса.

Тъ, кои по особенной слабости желудка, или moderams. меть не по излишней раздражательности кишокв, подвержены удобоварямыхт, про-частымъ возвратамъ сей бользни, должны жить на діэтв, избъгать незрълых в плодовь, ястов нездороешуды, сыросши, вых в и неудобоваримых в. Им в еще надобно беречися сильных Ъ етргетей отв простулы, отв мокроты, отв всего могущаго остановить испарину, а для сего носить на себъ доли прова жны фланель. Сверьх в того надлежить им в остеретаться от всьх сильных страстей, как в- то от в страха, ужаса, енвоа и проч.

\$ 4. O peom b.

Рвота не

Сегла бывсегла вывсегла бывсегла бывсегла вывсегла бывсегла вывсегла бывсегла вывсегла бывсегла вывсегла бывсегла вывсегла вывсегла бывсегла вывсегла бывсегла вывсегла выв

Но рвота не всегда бываеть усилгемы толь спасительнымы; и мы увидимы изы причины, ее производящихы, потребныя на оную пособія.)

ЧЛЕНЪ І.

Общия присины ресты.

мэлишеемво вы ныхы причины; она можеты произойти оты излишестол;

етва въ нить и кушань и, отъ собравиейся испорчен-сливном кой материи въ желудки, отъ остроты летев, отъ еноргя перехода въ желудокъ бользиетворной материи изъ капоноса; кого нибудь вереда, подагры, рожи, или другой ка-обычайна-кой бользии. Реота можеть еще причинена быть отъ го вынослишкомъ скоро остановленнаго поноса, отъ останов- на ки какого нибудь обытайнаго выпоражнивания, какъ-то потетуя, мъслишко и проч.

Схабость желудка, колика, или секая боль, гры- Различные жа, хрящь, камень, глисты, или какой нибудь ядб, виды ба- проникнувній въ желудокб, могуть къ оной подать поврежденоводь. Реота еще есть признакб и слъдствіе по- ніе и восврежденія и соспаленія грудобрющной перегородки (ді-паленіе че- праглы), кищокб, селезенки, петени, потекб и проч. брюшів.

Рвота можеть причинена быть необычайным в необычнодвижентемь, на примъръ отъ тряски судна, отъ вечнын качки вдущей кареты и проч. Она можеть еще произойти отъ сильных страстей, или отъ воображентя омерзительных предметовъ, а наипаче техъ, съ коихъ обыкновенно рвють.

Иногда она произходить оть скопа желги въжеть въ желудев: въ семь случав матерїя, больнымь извер- нервныя гаемая, обыкновенно бываеть желтою, зеленоватою больни. и горькою. Тъ, кои подвержены бользиямь нервнымо, подвержены также и сильной ресть, которая кънимь внезапно пристаеть.

Наконець рвота есть обыкновеннымь след-Беремекствтемь беременности. Вы семы случав начинается ность. она вообще около второй недели остановки месятимхв, и продолжается чрезы три или четыре первые ивсяца.

Ч Л Е Н В II.

Способд, какд пользовать рвоту произшедшую отб. непищева ренія и вещество ядовитых, взошедших в во желудокд.

Когда реота произошла от в пелноты желудка, въ семь от в непищеварентя, или от в довитых веществь, проесть паче никнувших въ желудоко, то не надобно оную почиженарство, тать бользнію, но паче лькарством бользни: и так в
жежели божень, то надобно ее поддерживать теплою водою, или легкою
жадобно ее леною водою. Ежели больной всегда силится, то наноддержи- добно ему дать пріемь ипекакуанги, коея дыствію
вануанга.

как в то сказано будет в посль, в том ПІІ, главь
43 и 48.

ЧЛЕНЪ Ш.

Пользование реоты произшедшей отд поднявшейся всерьхд падагры и остановки какого нибудь обы-

Когда вверзх в поднявшаяся подагра, или остановка какого нибудь обытайнаео выпоражниванія, причиняють ресту, то надобно всячески стараться возприпарки, становить течение природы, т. е. употреблять принатаплаз- парки и катаплазмы, дабы оттянуть подагру кЪ комы и проч. нетностямо, сжели она, поднявшись кверьху, или еканіе, на-сошедши съ мъста, причиняеть реоту, какъ-то мы рывное, или будемъ говоришь послъ въ Томъ III, главъ 33; въ слуприжигачав же реоты, произшедшей отв остановки какого Hie. набудь обытайнаго выпоражниванія, употреблять кровопускание, ежели сте выпоражнивание было кровнное; а нарывное, или прижигание, ежели это выпоражнивание было изъ раны, или изъ в реда, или даже изъ прижиганія, такъ какъ уже сказано выше въ членъ III предыдущаго §.

Еже-

Ежели при всехь сихь средствахь не можно бу-кровопудеть воззвать натуру къ возстановленію обычайнаго сизнія,
выпоражниванія и нужнаго къ сохраненію заравія: то нія, умонадобно то дополнить кровопусканіемь, протищенія-венія рукь
ми, теплыми умовеніями рукь и ногь, время оть и ногь,
времени повторяемыми, или прижиганіемь, щетиного, ніе, щенарывнымь и проч. кои надобно содержать дотоль, тива, надоколь роста совсьмь минуеть и здравіе возстано-рывное и
проч.

ЧЛЕНЬ IV.

Способо, како пользовать реоту произшедшую ото беременности.

Реота, произшедшая от веременности, обы малых кновенно укрощается кровопускантемв и нъсколькими нровопускантемв и нъсколькими сканта и слабительными; однако кровь надобно пускать весьма кегнія слабительныя должны быть весьма бительта дегкія, как вето винным ягоды, сливы, манна, Ялек-ныя сандрійской листв и проч.

Беременных в женщинъ обыкновенно болье рветь чай, эзвепоутру, какъ скоро встануть онь съ постели; что трань на
произходить частю от перемьны положентя, но еще
болье от того, что желудокъ еще тощь: стя рвота обыкновенно предупреждается чашкою тая, или
легинькимъ завтракомъ на постели (4).

Bepe-

⁽⁴⁾ кофе имъетъ осебенно сіе свойство унимать росту. Нъкоторые лю-Выгоды ди, мучившіеся такою ростою, которую ничто не могло унять, отъ кофесоть оной освободились однимъ только употребленіемъ кофея; и сіи люди суть наипаче беременныя женщины. Я видъль одну женщину, которая не удерживала въ желудит ничакой пищи, кромъ кофея съ молокомъ; она вознамърилась пить его два раза въ день, и жила симъ образомъ около трехъ мъслуовъ. Я не примътиль того, чтобъ кофе много вредиль ел беременности, которая впрочемъ была весьма грозная по причинъ той, что женщина та дважды упала, да еще и ирайнъ была утомлена.

Веременныя женщины, подверженныя рвошь, дол-Спокойетые тых жны бышь покойны тыхомь и духомь: их жели же и ауши, не надобно оставаться ни совсыть пусту, ни очень атораемыя наполнену варугь; холодная вода вь семь случав есть яетва, ко пригодное питье; и когда желудокъ слабъ, то можно оную прибавить немного водки. Ежели больная из простая, жин съ не уныла; ежели подвержена обмороку, то давать ей большимъ по ложкъ коритневой воды св небольшимъ количеколичествомЪ коитоваго, или померанцоваго конфекта. О сеыЪ ствомЪ водки, ко припадкъ беременных в женщинъ мы булемъ особливо ричневой говоришь вЪ Томв IV, главь 50, § 3. Воды

ЧЛЕНЬ V.

Пользование ресты произмедмей от славости желу дка.

Рвота, произшедшая ошъ слабости желудка, тре-Хина въ буеть горегей: апна, настоенная въ синв, или въ винъ съ водкв, куда прибавляется столько ревеня, сколько ревенемЪ. нужно для послабленія живота, есть превосходное авкарство. Желу якок рапительной порошоко (pulvis sto-Желудкоmachicus), предписанной выше, въ главъ 20, § 2, нрвиичлень II, есть лъкарство, всегда почти удачливое, тельной порошонь. Ежели принимаемо бываеть чрезь довольное время. Купоросной эликсиро (elixirium vitriolicum) есть равно Купороеней элик- доброе лакарство въ сихъ случаяхъ; онъ дается по епръ. npi-

оть уетерсовъ. Примъръ. Теперь я вижу одну даму, которая съ третьяго на четвертой мъсяцъ своей беременности испытывала, особливо послъ ужина, раздуте желудка весьма бользненное, повергавшее ее въ обмеронъ, за исторымъ слъдовало великое множество отпросъ, испуси емыхъ ею верьхомъ, и часто реота. Однажды ей захотълось теть устерсовт она сътла ихъ только дюжину, бояся умножить и отпачить свеи си рби. Тотъ день она проводила весьма хорошо; у ней не было ни раздути, ин обмерона, и реоты; но она испускала всегда обтры, кот рымъ сна впрочемъ, канъ крайнъ персиая, весьма подвержена. Она продолжала употреблять устерсы, кои она тал подвержена.

пріему плинатцати или дватцати капель три или четыре раза въ день въ рюмкъ воды или вина.

ЧЛЕНЪ VI.

Пользование ресты, произшедшей отд кислотд.

Рвота, произшедшая от вислото, выльчивает ся алкалитескими тистительными: наилучшее лькарство из сего класса есть былая магнезія; ее дается по ложечкы кофейной вы чашкы тая, или вы такой же чашечкы молока три или четыре раза вы день, и даже чаще, естьли нужно, для послабленія живота.

члень VII.

Пользование рвоты, произшедшей отб сильных б страстей.

Когда рвота произошла от в сильных в страстей, ни рвотили великих в поражен й душевных в, то надобно остеное, ни регаться от всякаго выпоражнивательнаго лькарства, тельное, а наипаче от в рвотимх в: в в сих в случаях в они были бы весьма вредными. Больному тогда надобно быть в поков, духу его в тишин в и в в веселости, принимать каких в нибудь легких в крвпительных в, как в то негуса, или понемногу воды и водки, куда прибавлять, глядя на обстоятельства, по нъскольку капель лаудана (laudani).

ЧЛЕНЪ VIII.

Пользование рвоты, произшедшей от истеритеских в припадков в.

Ежели рвота произошла от в спазмодитеских в Антистазприпадков в или страданій, то надобно употреблять модическія мускує в, бобровую струю и другія антиспазмодитескія лів мускує в, карства; ароматитескіе пластыри весьма также дійстви- 606ровая тельны. На впадину желудка (против велудка) можно струя.

Том в 11. Ч ч

нриложить желу дкок репительной пласты ра (emplasivum somachicum), или терьяковой пласты ра, которой выполняеть весьма хорошо сте показанте. А какъ не всякой знасть, тат у насъ лежить желу дока, то мы объявляемь, что прикладывать пластырь тоть или аругой надобно оть подгрудной ложечки вкось нальво къ подвадоху.

Настой съ Для приниманія внутрь надобно давать лекарство корицею, ароматических в, как В-то коригневаео или мятнаго HAN MAнастоя, или клейтвейну съ благовоніями и проч; проm 710. Тречіл про- шив в желудел шерешь этеролд (ather), а ежели не тивъ же можно его лостать, то винным в спиртомв, или водлудка кого, или другими спиртивыми напитками; по живоэтеромъ, ту авлать припарки теплою волою, или опустить или вод-KOIO. больную въ шеплую ванну по грудь, какъ шо мы бу-Припарки, дем'в говоришь пространные в'в Томь III, главы 45, полубанатолкующей о болвзилх в нервиых (5). теплая.

ЧЛЕНЪ ІХ.

Надежных средства выличить рвоту, от в какой бы она причины ни произходила, когда только нужно остановить ее.

Соленов пишье. Я всегда иснышываль, что соленое питье, выпиваемое вы самомы началь кипьнія, имьеты особенную

Устерсы. Примъръ.

⁽⁵⁾ Я еще видвав, что устерем остічовалями реоту симв образомв содна молодая дама, подгерження періодическим осноминамв желудиз, а особливо сноло равноновій, продолжавшимся у нее цваме мвещы, не могла безв того приним ть цищи, чтобв ее не рвало снустя полугса или часв; она почти ничего изв яств не извергала, а
часто и собстив ничего. То, чэмв ее рвало, была густая и клейная
матерія. Она не имвла аппетита, а особливо нь масу, тінв что
по большой чісти употребляла только сласта. Вв Сентабрв мвещв 1776 года вздумилось ей понущать устерсовв, накв сноро они
понажутся; она продолжала употреблять ихв чрезв все время собраніч сихв черепоножных полагаемое вв Парижв на восемь мвсяцовв, и
нашла хорошее себв облегчене; устерсы дали ей аппетить, и св того
времени ей часв отчасу лучше.

ную силу остановлять ресту, какая бы оной причина ни была. Сте питье составляется следующимъ образомЪ;

Возьми виннокаменной соли, - - драхму, Способъ Пимоннаго соку, недавно выжащаго, унцію оное со- етавлінь. Съ половиною, Воды мятной Янглинской, воды простой коритневой, воды простой коритневой, Сахару довольное количество.

По Лашинв:

Recipe salis tartari, - - - drachmam,

Succi citri recens express, - vnciam & semis,

Aquæ menthæ piperitæ,

Aquæ cinamomi simplicis,

Sacchari, quantum sufficit.

Всь сіи вещества смъшиваются вмъсть; когда же онь смъсятся, то произойдеть кипвите, то есть броженіе вь жидкости во время смъшенія: и сіе питье дается больному, прежде нежели перестачеть это кипвите.

Сте лъкарство надобно повторить чрезъ каждые два часа, или чаще, ежели реота сильна (вмъсто онаго можно употреблять ривьерого протису реотное.)

ЧЛЕНЪ Х.

Разсуждение о различных видах вреты и о пользова-

Хошя здысь и предлагается лыкарство для не ве унятія рвоты, какая бы рвоты причина ни была; одна-всый рво-ко надобно остерегаться употреблять его во всяких добно предслучаях в. Есть рвоты, так в как в сказано, кои не писывать покио что не суть бользни, но еще и сами на оныя лыкарства. суть лыкарством в

Боль-

Какія суть Больнаго тогда можно убить, когда кто захоряоты, въ четъ остановить рвоту его, произшедшую отъ непищеноихъ бы ва ренія, отъ какого нибудь лда проглоченнаго въ жепытубны? лудокъ, отъ стиба какого нибудь сосуда, отъ качки повозки, отъ сильныхъ страстей, отъ поврежденія

повозки, от в сильных в страстей, от в повреждентя или поранентя и проч: во всъх всих в случаях в надобно уважать намъренте природы, посредством в сего способа избывающей из всебя матертю, которая, ежели бы не была выгната, сдълалась бы причиною бо-

льно рвошу, обыкновенно не долго продолжающуюся, легш льно кими, но обильными пишїями; а кЪ лькарсшвамЪ разногда рво- вь шогда прибъгашь, когда рвоша чрезъ мъру проша нарочи- длишся, или разслабишъ очень больнаго.

сизбинешЪ Что касается до реоты, произшедшей отъ бебольнаго. Рвоша от ременности, то она ръдко бываетъ опасною; даже случается, что при всъх в лъкарствах в она всегда веременноети обы- продолжается до четвертаго мъсяца, или четвертаго кновенно съ половиною, обыкновеннаго урока, въ которой она перестапроходить сама собою. Но всегда благоразумные слыешЪ сама довать предписываемой здъсь діэть: и ежели реота собою на четвер савляется упорною, непомврною, такъ что будетъ шомъ мъсяць, или истощать больнаго, то посль малых в здъсь предлагана четвер емых выпоражниваний можно без в страха предписать томъ съ соленое питье, или ривзерово противурвотное. полстиною.

ВЪ ней ну-Во реотв, произшедшей от в слабости желудка, жна тольпотребны только гореги; я часто видаль, что она ко дізша. рыста, про-переставала от употребленія оных в в один день. изшедшая Но во рвотв, произходящей от в нервных в страданій, отъ слабо совсьмъ другое бываеть: она обыкновенно бываетъ спи жеупорныйшею, и уступаеть только пригоднымь вы сихь дудиа, требуеть бользняхь лькарствамь; и такь вы семь случав натолько годобно справишься съ Томомъ III, главою 45, гдъ толречей. куется о нереных бользиях в.

ЧЛЕНЪ XI.

Средства предупреждать возврато реоты.

КакЪ мальйшее движенте можетъ опять произвести рвоту, котия бы она была и унята, то больному надобно быть въ совершенномъ недъйстви; дтэть дтэть его надлежить быть такой, чтобъ она ни мало не обременяла желудка, да и была бы удобоварима. Однако мы не котимъ говорить, что больному надлежить питаться одними только жидкими веществами: яства твер-яства дыя, но легктя, часто въ семъ случав удобнъе варятся.

ГЛАВА 23.

О непоміврномо тесеніи моги, у Врагей называемомо діабетесомо (diabetes); о немоге держаніи; о остановків и застов моги.

§ 1.

О непомврном в техении моги или дабетесв.

Діабетес в есть непомърное и частое еыпораж-кто нанаго писание моги. Сія бользнь ръдко случается между мо-че оному подвер. додыми людьми; но обыкновенна между пожилыми, нажень иначе же между тьми, кои занимались тяжкими работами, или кои въ своей молодости до излишества инли квашеные напитки.

членъ І.

Признаки непомфриаго тесенія моги.

Діабетесв часто следуеть после болезней острыкв, после лихорадокв, после великихь выпоражниваний и проч; онь можеть еще произойти отвеликихь трудовь, отв долговременнаго путечия ч ч з

шествія на лошади, у коей спина жестка; отв переноса слишком в тяжелых в ношв, отв принужденнаго бъганья и проч. Неумвренныя понойки, силиых могегонительныя, какв-то тинктура шпанских мух , терпентинной спирт и проч. могут в кв оному подать поводь.

минераль
Он в часто бывает в следствием в слишком в долгоныя воды временнаго употребления мине ральных вода. Некотонасто его
причинарые воображают в, что еги воды не могут быть спаноть. Для сттельными, естьли не будут принимаемы в венего: ликом в количестве: от в сей погрынности часто
произходит в торщил тех в, коих в хот вли выльчить.

Наконець діабетеє в можеть произойти отвочень великаго разслабленія орудій, отдыляющихь могу, или отв остроты, слишкомь сильно раздражающей потки, или отв распущенія крови, которая отв того выходить вы излишествы по мотевымо путямо.

ЧЛЕНЪ II.

Признаки непомврнаго текснія моги.

мренения количество моги вы сей бользии обыкновение вредства бываеть болье, нежели всь выпитыя сольнымы жилемые кія вещества; она свытла, былеса, вкуса сладковата-бельнымы го, запаха болье или менье пріятнаго. У больнаго безпрестанная жажда и лихорадка до ныкотораго степени; у него роть сухь, и онь безпрестанно каркаеть пынистою харкотиною; силы у него упадають, аппетить пропадаеть вовсе, дородность изчезаеть, такь что скоро на немь видна бываеть одна кожа, да кости; онь чувствуеть жарь вы кишкахо, и весьма часто полскица, лошка и ноги распухають.

признаки (ВБ началь бользии не чувствуется почти илпредше- какого нездоровья, или по крайней мырь сіе нездоствующіе. ровье весьма слабо; но эта тишина не долговременна: больной тотчась теряеть аппетить, небольшах ликорадка снъдаеть его нечувствительно; животь его запирается и проч.)

Вначаль сія бользик можеть быть выльчена; когда и но ежели она ведется уже съ нъкоторато времени, въ номъ по пользованіе бываеть весьма труднымь. Пьяниць, можеть стариковь и проч. подпадшихь сей бользии, не надоб-выльчить но и думать, чтобь можно было совершенно выльчить. ся:

(Читай напередъ и и 2 главы сего Тома.)

члень ш.

Пищеупот ребление и содержание, какогое надобно предписывать твмв, кои страждуть непомврным тесениемь моги.

Въ сей бользии паче всего надобно избъгать всякаго вещества, могущаго раздражить оргага моги; или разслабить темпераменто, и такъ больному надлежитъ нитаться яствами твердыми, утолять жажду кислотами, какъ-то щавлемо, лимономо, уксусомо и питься проч. Склизистыя растенгя, какъ-то соросинское пше-яствано, сагу, салено съ молокомо, суть яства весьма пригодныл. Изъ всъхъ животилихъ веществъ надобно предпочитить терепокожныхо рыбо, какъ-то устерсово, ра-устерсию ково и проч.

Вивсто питья надлежить ему давать Бристоль- сигн вода; стую воду; а ежели ее достать не можно, то да-известно-вать ему пить известковую воду, въ которой заморе- вая вода но довольное количество дубовой коры. Белой де-вою корторой, въ коемъ распущенъ рыбій клей, есть также кою. Белой де-нонть съ

Больной долженъ ежедневно дълать тёло движение; рыбымъ из тёло движению надлежить быть умъренному и не клеемъ. Умъренно итаготительному.

вълой деконтъ съ рыбъимъ не клеемт. умъренное тълодвиженіе. Постеля Ложиться ему надобно на постели жесткой, больнаго или просто на тюфякв: ничто такъ не противно быть же. поскамо, какъ мягкія постели.

Воздухъ сухой и теплой, щетки для кожи, воздухъ такъ какъ и все служащее къ возбужденію испарины, теплой; пригодно въ сей бользни; почему надобно больному щетни для на себъ носить фланель, къ спинъ своей дать прилоножи; фланель; жить широкой кръпительной пластырь, или, что выполняеть то же показаніе, опоясать треслы свои тельной широкимъ поясомъ.

пластырь къ спинъ;

опояска оноло чреселъ.

ЧЛЕНЬ IV.

Явкарства противб непомврнаго тегенія моги.

легное чи
Легкія слабительныя, ежели больной еще не вышель слишком в ослаб в посладствій больни, будут в ное, составляедобро производить. Сій слабительныя должны состамое из вляемы быть из вревеня и кардамоновых верен в или
ревеня и другой пряности, настоенной в вин в; сей жидкости
зерен варононадобно больному давать, пока живот в послабит в.

Вскоръ послъ шого больной долженъ принимать лъка рства в в зательныя и кръпительныя; и такъ наиръпитель- добно ему давать четыре раза въ день, или чаще, ежеимя. ли желу доко его можетъ снести, по полудрахиъ слъдующаго поротка (извъстнаго здъсь подъ именемъ

Гельвені- Гельвеціева порошка):

евъ поро-

Возьми квасцово, --- } по ровной части.

По Латынь:

Recipe aluminis, - - } ana partes æquales.

Растопи жвасцы въ горшечкъ, по томъ смъщай вмъсть оба вещества.

Прї-

Пртемъ сего порошка можно давать въ чайной чашечкъ розовой тинктуры (tinetura rofarum).

Ежели желудокъ не можеть снести квасцово въквасцовая веществъ, то надлежить посредствомъ ихъ сдълать сыворотку, коей давать по три или по четыре унціи по три раза въ день.

Квасцовая сыворотка составляется следующим в способъ ее образомь:

Возьми свъжаго *молока*, два или четыре фунта, Квасцово, - три драхмы;

Поставь молоко на уголье; пусть вскипятится; ноложи туда квасцы; когда молоко осядется или свернется, то процъди.

Болеутолительныя в сей больни полезны, даже волеутои тогда, когда больной спить хорошо; они утишають лительным корть и раздражание, и купно возстановляють кругопольза оть нихь въ обращение. Можно давать по десяти или по двънатцати сей бользакаплей лаудана ликвида (laudani liquidi) в рюмкъ обык-на.
новеннаго питья, три или четыре раза в день.

Лауданумъ.

Наилучнія извъстныя кръпительныя суть хина и пріємъ. вино. Жины въ порошкъ можно давать въ рюмкъ кръпительныя. вина де Порто, или Бордосскаго, по драхмъ три ра-хина въ за въ день: сїе лъкарство дълается дъйствительный-винь съ шимъ и пріятньйтимъ посредствомъ прибавленія въ каж-купоросдой пріємъ по пятнапіцати или по дватцати капель купороснымъ дой пріємъ по пятнапіцати или по дватцати капель купороснымъ доснаго эликсира (elixirii vitriolici). Тъ, кои не могуть снести хины въ веществъ, должны ее принимать въ декоктъ, по такому же количеству краснаго вина, по дкисленномо, какъ выше сказано.

\$ 2.

О немоте держании.

Есть одна бользнь, которой рабочіе люди очень чыть нечасто подвержены бывають подъ старость; она на мочедер-Томо II. Ш ш зыеть оть Aia6emeca?

вичеству- зывается немогедержаниемб: но она совершенно различна отъ длабетеса тъмъ, что мога въ немоте де ржанги течеть не по произволению человъка и капля по каплъ, и что она не превышаетъ того количества, каковое обыкновенно испускаль больной бывь въ злоровьт. Стя бользнь не столько опасна, сколько досадна и безпокойна.

Люди, наппаче подверженные сему невзгодью, Кто наипаче оному суть, такъ какъ сказано, занимающиеся тяжкими раподверботами, упомянущые вЪ Томь 1, главь 2, § 1; по женЪ? томъ младенцы и старики; женщины во время беременности, или неренесийя трудные роды; распушники и рукоблудники.)

ЧЛЕНЪ І.

Присины немоге держанія.

Оно произходить оть разслабленія сфинктера (запирки) пузыря и часто отв паралита сего тезева; оно можеть иногда причинено быть ударами, ушибами, трудными разраживаніями и другими нещастіями; оно иногда бываеть следствіемь лихорадки, а иногда долговременнаго употребленія сильных в могегонительныхв, или раздражательныхв лекарствв впущенных в в в пузыра и проч.

(Оно можеть причинено быть одною только слабостію орудій, какЪ-то случается у дътей, стариковь, распушныхь и рукоблидникова; повреждениемъ ефинктера (запирки) мочеваго пузыря, какЪ-то весьма не ръдко произходить въ камневы разывании и трудных в родах в; пометною матеріею, задержавшеюся в в последней калоизвергательной кишкв и сжимающею пузырь; камнемо вы пузырь; какою нибудь опухолью въ ближнихъ его частяхъ; иногда очень великимъ унотребленіемь воды, или водяных в напитковь; или наконецъ излишествомъ въ любовномъ сладострасти.) **ЧЛЕНЪ**

членъ и.

Пользование немоселержания.

С Немогеиспускание есть неизличимая бользнь у у старипрестарымых людей; ее можно только облегчать но только
прикладыванием в крыпительного пластыря противьоблегчать
пузыря, опояскою около гресло, виномы и сочными ее. Крыннетвали, умфреннымы телодвижениемо, наконецы всемы, тельныя,
что только можеты укрыпить.

У дътей сія бользнь, которая зависить только у явтей оть слабости, проходить съ возрастомь и по мърв, сія бользнь проходить какь они укръпляются. Порошокь изъ крысь, изъ кросама собою товь, т. е. изъ сожженных вкрысь или кротсвъ, имъ да-со времеваемый, и толикое множество другихъ надобій таковаго немь же рода, по тому только и славятся, что въ самой вещи

иемотелержание проходить у дъшей само собою.

Впрочемь, когда оча слишкомь продолжается, упорна, то не надобно имь давать питья и летеб водянистыхь; то сухів а над чежить кормить ихь жаренымь мясомь, хорошо летва, винецеченнымь хавбомь, позволять не множко вина, сажать но, бани ихь вы холодную баню (опускать вы холодную воду), угрозы кы а наипаче грозать имь, чтобь исправились; потому исправаечить не надобно соминваться, что часто это бывачию, еть оть худаго намвренія, а особливо у тьхь, кои сцатся на постели, а днемь чисты.

Уменосе де ржаніе, приключившееся от в камия в ву имвопозы рв, или от в камиевы разыванія, выльчивается менную так в, как в мы скажем в в в следующей глав в. 60 м в знь.

Немоге держание от в беременности обыкновенно у беременнаходить лакарство вы разратении от в родовь. Когда щить она оно и посла родово остается, то требуеть таких вообще выже лакарствь, какия употребляются противы немоге-лачивается родово, какы- то когда она прикладывания противы пузыря лакарствы влагатель-упорна, ныхо и крапительныхо, на примъры крапительного то ила-стыря, выше сего вы члень III упоминаемаго; припарни, при-

припароко изъ вина и красныхо розб, мяты и полубани и крвпирозмарина и проч; полубань, п. е. полуваннъ и промельныя мываній, составляемых в из в сих в же самых в растеній. промыва-Сти женщины внутрь должны принимать Бристольскіл HIH. Марціальводы или другія какія марціальныя; и ежели их в женыя воды. лудокв можеть ихъ снести, то и порошокъ или сыво-ПерошокЪ или квас- ротку, предписанную выше, вЪ § 1, членъ IV сего Тома. новая сы-Весьма редко можно выльчиться от в немоте дерворошка. распушни- жанія, произшедшаго от блудодьянія съ женщинами ки и рукои рукоблудія, а особливо когда опо заматеръло; можблудники ръдко отъ но надъяшься нъсколько вначаль, и лъкарства сушь оной выль- шв же, кои мы предложили, съ присовокуплентемъ,

что надобно совершенно оставить стю привычку.

У коихЪ пузырь вЪ Обстоятельства. кои поназывають. нарывныя иъ пояснизвонкамЪ.

чивающся.

Немогедержание, зависящее от в паралига пузыпараличь. ря, требуеть лькарствь противь паралита, каковыя предлагающся въ Томь III, главь 45, § 3, члень II. Со всьмъ шьмъ когда сей паралить произошель отъ ломотной, или подагритеской мокроты, съдшей на концѣ спиннаго мозга, или спинной кости и около чнымь по- лежащих в первах в, обыкновенно сопровождаемый паралитемо конетностей: то лъкарство на то есть на рысное, приложенное къ пазвонкамо тресло и содержимое чрез в насколько недаль, пока паралить почти пройдеть: тогда вивсто нарывнаго можно употреблять спиртную мазь, какова есть следующая:

Спиртная мазь.

> Возьми рутнаго масла, - - - унцію, Нервной мази, - - - двъ драхмы, Существеннаго терпентиннаго масла, тритцашь каплей.

По Лашынь:

Recipe olei rutta, - - - - vnciam, Unguenti nervini, - - drachmas duas, Olei essentialis terebintina, triginta guttas. Сею мазыю часто въ день натирается то мъсто, къ коему приложено было нарычнос, и даже ближнія части.

Немотедержание, произшедшее от вострых боль симптоней дошедших до высочайшаго своего степени, обыкновенно сопровождающее попос выльчивается с сею мочедержабользый соно не требует никакого особеннаго ль-ные выльчивается
карства.

Однако надобио признашься, что сія бользньнію, отъ чаще всего не уступаеть предложеннымь нами лькар-коей оно співамЪ, какое бы о выпользованїи оной ни прилагаемо уто надоббыло раченте. Въ семъ случав советуется женщи-но авлать, намЪ внускать въ рукавъ матки пессарій или свер-ногда нетокЪ (такЪ какЪ вЪ выпадках длатки), которой сжимая жаніе промотеиспускательной канала крынко, препятетвуеть не- тивится вольному истечению мочи, а даеть свободу ее вы встыв льпускать по произволенію. Для мущин выдуманы нын у женшакже инструменты, которые, сжимая стволд, за- щияв; ставляють могу оставаться въ пузырв, такъ что у мущинь: человъкъ можеть ее выпустить, когда захочеть, отпирая и запирая инструменть. Но ни женщины, ни мущины не хотять подвергнуться досадь оть сихъ инструментовЪ. Еще также выдуманы мъдные, стеклянные и серебряные сосуды для принятія вышекающей моги: они носятся для укрытія худаго запаха и нечистоты, коимъ подвергаеть сія бользнь.)

\$ 3.

О остановки моги.

Остановка моги у Врачей называется исхурівю раздъленіе (ischuria), раздъляющих в ее на потетную и пузыр остановки мую остановку: потетная удерживает в имя исхуріи или остановки моти, а пузырная называется обыкновенные вадержкою моти.)

ЧЛЕНЪ

ЧЛЕНЪ І.

Признаки остановки и задержки моги.

Признани Посесная исхурія или остановка моги означаетпочечной ся ньмою болью съ чувствіемъ тяжести въ поясниць искуріи и треслахв, изгагою, тошнотою и рестою, запахомв или осшановки мочи. моги из в рта и отв трла больнаго, улутьем в и сон-Признаки ливостію. Больной не чувствуеть позыва къ могенстужарантескантю, да и усиливается къ тому; у него нъть опуристичехоли около паховъ, ни въ близь лежащихъ мъстахъ; скіе. катетеромб не можно выпустить моги и проч.

Признаки пузырной исхуріи

П ризнаки пузырной исхурги, обыкновенно называющейся задержкого моги, сушь чувствіе тяжести или задер. Около паховъ, повыше ида и въ такъ, позывы къ мотежин мочи. испусканно съ пщетными усиліями, опухоль повыше лобка, чувствующая боль при ощупъ и представляющая видь пузыря; въ сей опухоли, естьли только слишкомъ не растянулся пузырь, чувствуется переливаніе; наконець сія опухоль опадаеть или уменьшается, когда мога выпорожнена естественно, или посредствомь кашетера.

Признаки жарантерисшичеекіе.

> Пузы рнал исхирія обыкновенно бываеть безь лихорадки; но когда она зависить от воспаления, или от в загноенія пузыря, простаты и проч. обыкновенных в савдешвій остановленных в вене ритеския в гоно ей: то она соединена бываеть съ ликорадкою, и часто съ бредоліз; боль и жаръ бывають весьма сильныя, и больные находятся в в величаншем в слабо-CHAIN.

Признани, - Пузырную исхирію удобно можно различенть по коими раз-раздушію и возвышенію нижней части брюха, по чувличествуствію тяжести в в такв, а особливо по позыву на ють сін двь больз- могенспускание; чего почти никогда не встрвчается въ потегной исхуріи. Но и та и другая часто оканни

чивается худосогіємв, опухлостію всего тъла, водлиого бользнію, сонливыми припадками, трудностію вы дышаніи, бредомв, кортными движеніями и смертію.)

ЧЛЕНЪ II.

Пригины остановки и задержки моги.

Мы уже выше сего дали знать, въ главъ 21, \$ 4 и 5 сего Тома, что задержки и остановка моти могуть зависъть оть множества причинъ, какъ то оть воспаленія потекв и пузыря, оть малинькихь кампей или хряща остановившагося въ мотепропускательных проходахв, оть помета собравшагося и скипъвшагося въ послъдней калоизвергательной кишкъ. Корть или судорога шейки у пузыря, беременность, куски спекшейся крови въ пузырь, опухоль геморроидальных сосудцовв, спазмодитеское корюченье всъхь терев подбрющія, часто случающееся въ бользнях в острых и въ припадках иполопаритеских и истеритеских воспаленіе и раздутіе простаты и проч. мотуть къ онымь подать новодь.

Тв, кои долго держать въ себв могу, подвергаются сей бользни; любовное сладострасте можеть
также оную причинить. Самыя женщины могуть оной
подпасть посль плотскаго совокуплентя. Наконець,
вся ая порча, всякая бользнь тузыря и ствола, которыя ихь съуживають, сжимають ихъ пространство,
какъ-то нарости, дзкія мяса и проч. могуть быть
причинами остановки и задержки моги.)

членъ Ш.

Пользование остановки и задержки моги.

(Изъ картины причинъ, нами представленной, всякъ можетъ чувствовать, еколь бы трудно и длинно было входить въ подробность о пользованти каждой изъ нихъ. Сей трудъ даже былъ бы излишнимъ; мотому что большая часть из сих причин в, а наипаче воспалительныя суть сами по себь бользни, о коих в уже говорено, или о коих в мы будем в говорить в в послъдстви, и их в пользование находится в в членах в до сих в бользней надлежащих в.

Когда еіи причины сущь восналишельфыя?

И такъ исхурія, зависящая отъ воспаленія потекъ, пузыря, желудка и другихъ теревъ подбрюшія, мотепропускателей; или отъ того, что камень или хрящь остановился въ сихъ каналахъ; также отъ воспаленія тейки пузыря, простаты и ствола послъ венерической гонореи худо пользованной и проч. требуеть самаго пользованія сихъ бользней, коихъ она, особенно говоря, есть только слъдствіе. Сіе пользованіе можно найти въ главъ 21 и 24 сего Тома, и въ Томъ IV, главъ 49, § 1, 3 и 4, въ членъ II и III.

Однако во всъхъ сихъ случаяхъ, когда исхурга кажется быть крайнимъ припадкомъ, надобно ее облегчить слъдующими лъкарствами:)

Выпоражниванія, припарки и бани. ВЪ слъдствие чего за долгЪ мы почитаемЪ одобрить противЪ всякой задержки и остановки моги, произходящей отъ какой нибудь воспалительной причины, выпоражнивания, припарки и бани.

Кровопусканте, какЪ скоро силы больнаго моеканіе:
польза отъ гутъ позволить, полезно, а особливо естьли есть
онаго въ какое нибудь помѣстное воспаленте; к ровопусканте въ
сихъ слу- семъ случав не токмо утишаетъ лихорадку, удерживая движенте к ругообращентя, но еще, размягчая
тердыя, разгоняетъ корту и сжатте сосудцево, ком
причиняютъ остановку моти (2).

110-

Пілвицы къ задне. му прожоду.

⁽²⁾ Но ежели слабость больнаго съ давняго времени тянется, такъ что превятствуеть уставить, или повторить просопускание: то, макъ сіе выпоражниваніе весьма полезно въ семъ случать, надобно припустить піленць къ заднему проходу, а наипаче ежели больной подвержень быль почечую.

Поель кровопусканія надобно употреблять при-матчипарки; онь дылаются избодной только воды, или тельныя
изботвара мястительных растеній, какб-то рожныхб, ромашковых цвытовь и проч. Вы сих жидкостяхь обначиваются полотенцы и прикладываются кы
больному мысту; или безпрестанно на ономы держатся наполненные сими отварами пузыри. Ныкото мятчирые люди употребляють самыя растенія, послы того
какь они распарились; они их кладуть между двумя прикладыфланельми, кой и прикладывають по томы кы под-ваемыя кы
брютію: этоть способы весьма не худь. Сій растеподбрынія долье храчять теплоту, нежели обмоченныя полотенцы, и держать мысто ровные обмоченнымь (3).

Больнаго надобно еще сажать по грудь въ теп-тенлых лую воду, въ которой онъ долженъ просиживать полубанистолько времени, сколько силы ему позволять: повторять это болье или менье разъ.

Такое же пользованіе пригодно против в исхуріи, пользовапроизшедшей отв долговременнаго держанія вв себв ніе, ногда
моги, или посльдующей за венеритеским дьйствіем вадержна
мочи прон непомьрным плотоугодієм св женщинами; потому изошла
что сей видь исхуріи или соединень бываеть св воспаленієм или оное производить: онь произходить
временнаго
держанія
только отв корти пузыря и близь лежащих в частей. вв себ
Во всьх сих случаях вонь не опасень, ежели не дамочи, нав
дуть сму усилиться; потому что есть примъры,
шняго люкон доказывають, что сей видь исхуріи, запущенной бострастія
безь пользованія, дълался смертельныя в.
съ женщи-

Jone II.

川 加

H.c-

Осторож-

ность праность прарастенія, що надобно вст листья очистить от стебельновь, которые ваній мягжестностію своєю вредять кожь брюха, весьма чувствительной вь чительсемь случат и вь соспалительных бользняхь подврюшія, о конхь ныхь расговорено было выше, вь главт 21 сего Тома.

Ускурія, произшедшая от в истеритеских в и Отъ истерических ипохондритеских припадков в, требует в накоторой чаи ипохонсти выше сего предложенных в лекарств совокупно дричеснихъпри- съ пъми, кои пригодны въ сихъ бользняхъ, о коихъ мы будемь говорить посль вь III Томь, вь главь 45. пздковЪ. € 12 и 13.

Но въ исхуріи, произшелшей от в густых в мокрот в Причины. HOH BM 5засаривающих в собою мотевые пути, отв склизи, на emo Marгноеній, ге ре дово или дикомясій высих в частяхь, от в разчишельныхь тре-слабленія или оньмьнія посек или пузыря, и от в парабують лита сихЪ частей, вЪ мягтительных болье не быпоощряшельныхъ, ваеть нужды; а потребны поощрятельныя въ припаркахб, или катаплазмахб, мази теплыя и спиртныя, наепиршныхъ марывныя, такъ какъ совътовано выше, обливания, блии в в зей, натеплитной водь, везховил взда, или качка от в кареты, рывныхъ. а внутрь теплыя и соленыя мотегонительныя, поощренобливацій и проч. ныя яства, тистительныя, теплитныя воды и проч. теплыхЪ

Когда исхурія произошла от в склизи, от в еерешельных Б. дов в в посках в в могепропускателях и пузырв, или оть дикомястя въ стволь, то мы совътуемъ употреблять контрексевильский воды, о конхъ говорится въ слъдующей главъ, въ примъ. 3, и изъ повторенныхъ многократно опытовъ предпочитать ихъ всемъ другимъ минеральным водамв, почитаемым в лыкарствами в в семЪ случав.

Пользоважки мочи, произшедшей отъ беременноemu.

мочегони.

Причины.

ни шре

бують контрек-

севиль.

снихъ

водь.

Когда исхурія произошла оть беременности, то ніе задер- по большой части она не требують никакого лекарства; довольно только больной наказать, чтобъ она на постели искала такого положенія, которое бы удаляло носимое ею бремя от нижних в частей таза, котоона удобно и можетъ найти, ложась на тотъ или другой бокЪ: впрочемЪ роды не допустять до возвратовъ сей бользни. Усхурія, причиненная пометною матеріею скопившеюся и затвердъвшею CABI-

савдней калоизвергашельной кишкв, уступаеть систи- от снительным промываниям, болье или менье часто по- пъвшейся вторяемымь.

Многія причины исхуріи требують катете ра для гательной кишкв. отвятія препятствія, заграждающаго проходь мо-катетерь св, и кь вызову оной вонь; но какь симь инструментомь можеть только управлять хируред, то не для чего намь объ немь и говорить. Севска, впущенная свыка, осторожно и искусно въ стволд, часто лучше удается, нежели катетер (4).

ЧЛЕНЬ IV.

Общія є редетва, кои надобно употреблять противо остановки и задержки моги, какая бы оных д притина ни была.

Какая бы ни была причина остановки моги, од-легкія чистако надобно животь держать на свободь, но не стительными тистительными, а мятительными промываными, или легкими настоями Ялександрійскаго листа промывания и манны. Промыванія вы семы случав послабляють нія, животь и служать вмёсто внутренних припароко; они еще особенно содыйствують кы утоленію корти пузыря и ближних частей.

Яства должны быть легкія и принимаемы вЪ яства в маломъ количествь; а вмъсто питья употреблять легкой питье бульюнь, или декокты, или настоя съ склизистыми растеніями, какъ-то съ корнемъ рожи, съ цвътами, липы и проч. Въ сіи питья не худо время отъ времени прибавлять отъ пяти до шести капель услащенна-го селитрянаго спирта (spiritus nitri dulcificati), или щ щ 2

⁽⁴⁾ Катетерь, или совчка, какъ всякъ можетъ чувствовать, въ соетолніи доставить истеченіе мочи только что въ пузырной искуріи, такъ накъ мы понажемь ниже, въ примъч. 2 слъдующей главы.

по дражив Венеціанскаго мыла. Ежели ньть соспаленія, то больной можеть пить ньсколько легкаго пунща безь кислоты (5).

членъ у.

Средства предохранять себя отб остановки и задерж-

Асти дега дега Люди, подверженные остановк тоги, должны жить кіл, пи- по законам воздержности: лствам их надобно быть текими, а питью мокротожи дительным опискать ни кислото, ни влаких вино; они не должны опускать умфреннаго телодвиженія, а ложиться на постелях жестких визбъгать ученія и сидячих упражненій (6).

ГЛАВА 24.

О пескъ или хрящь и кампъ.

что такое Когда хрящь или песоко находится въ поткахо, есть песокъ: или изъ оныхъ выходить чрезъ мотепропускатели съ мо-

1780

⁽⁵⁾ Надобно замъщить, что предписываемыя эдъсь сочинителемъ мочегонительныя лънар тва пригодны тольно въ почечной искурія; они
патубны будуть въ пузырной. Сія послъдняя не иначе должна изгоняема быть (однако всегда относительно нъ произведшимъ оную причинамъ), нанъ ванями, полуванями, припариами, катаплагмами,
катетеромъ, или себчною и проч.

Надобно признаться, что многоразличность причинъ сей бользни и опасность, кановой она подвергаеть, дълають вообще пользованіе сей бользии весьма нъжнымъ и требующимъ проницательности и искусства въ предпріемлющихъ оное; и такъ мы за долгь почитаемъ совътовать, чтобь на сей случай всегда, когда только можно, призывать знающихъ людей.

⁽⁶⁾ Можно бы было упомянуть забсь о двухь другихь бользняхь, извъстныхь подъ именемь трудности въ мочемспускания, у Врачей называющейся дисуріею и странгуріею; но накь онь обыкновенными бывають слъдствами венерической вользии, то Г. Бухань помъстивь ихъ въ числъ принадковь сей послъдней бользии. О семь можно справиться въ Томъ IV, главъ 49, § 7, члень II и III.

мотею, то тогда говорять, что у больнаго хрящь или песоко.

Ежели случится, что какой нибудь такой ма-камень: линькой камушек востанется в в пузырв, пробудет в там чрез в несколько времени, увеличится чрез в приращенте каменной матерти моги, пристающей около него, так в что наконец в сделается толь толстым в, что из в пузыря не возможет в св могею вышти то в в сем в случав говорять, что у больнаго камень или каменная бользи (1).

§ I.

П рисины песка и камня.

Тесоко и камень могуть причинены быть елишкомь пряными и приправленными яствами, употребленіемь кръпкихь винь, и вязательныхо, и сидячею жизнію. Излишняя теплота на постели (такь что безпрестанно оть оной выходить принужденная испарииа и пото, злоупотребленіе слабительных веществь, производящихь обычайное выпоражниваніе),
лежаніе на очень мягкихь постеляхь, а особливо на
спинь, могуть также причинить ту или другую бользнь, которая еще произходить оть постояннаго
употребленія наполненной земляными или каменными
частицами воды, оть яство свойства вязательнаго и
вітротворнаго, также и оть наслідственной порчи.

Люди пожилые, или страдавийе подагрою, или кто наиломотою, наипаче оной подвержены.

5 2.

10 дагрою, или кто наипаче сей бользии
подвержень:

П ризнаки песка и камия.

Песок вы полинькие камушки вы потках при-особенные чиняющь боль вы треслах (вы полениць), тошноту, песну.

⁽¹⁾ Должно чит ть во всеобщей шаблиць, въ Томь V, члень: моча или урина.

ресту, и иногда могу съкровью. Когда малинькіе камущки взойдуть вы могетропускатели или уретеры, но по величинь своей не могуть удобно пройти по сему каналу, то припадки еще болье напряженностію умножаются: боль распростирается къ ближнить мъстамъ пузыря; ноги и лядвеи больнаго бока нъмъють; ядры уходять вы нахи, и мога останавливается.

Особенные признаця жамия. Камень въ пузырв узнается изъ боли, предъ и послъ мочеиспусканія, изъ теченія моти, идущей капля по канль, или изъ внезапной оной остановки въ ту самую минуту, какъ она бъжала ручьемъ; изъ острой боли въ шейкъ пузыря послъ движенія, а особливо послъ взды верхомъ, или въ повозкъ по дорогъ неровной; изъ подсьда мочи, которой бълъ, густъ, обиленъ, зловоненъ и соплянъ; изъ щекотанія въ дътородныхъ частяхъ (которое заставляеть обоего пола людей опускать къ онымъ руку); изъ позыва къ стулу при моссиспусканіи; изъ большей удобности выпускать мосу лежа, нежели стоя; изъ нъкотораго вида корснаго движенія, произходящаго отъ острой боли при испусканіи послъднихъ каплей моси; наконець изъ ощупи камял посредствомъ катетера (2).

Харантеристичеекой привнанТ-

(Читай напередъ и и 2 главы сего Тома.)

\$ 3.

одинъ

можетъ
увърить о
существованіи наммя,
Искусство
потребное
въ опусканіи катетера въ
пузырь.

(2) Одинъ тольно натемерь можеть увърить о существовани намия въ пулырь; всъ знана, предлагаемые сочинителемъ, сомнительны и обманывають ежедневно. По сей причинъ человъну, испытывающему наніе нибуль изъ вы шеописанныхъ припадновъ, тот чадобно призвать опытнаго Хирурга и дать себя на пробу натетеромъ. Я говорю опытнаго Хирурга; потому что сіл операція, сноль простою ни нажется, требуеть такого искусства, нотораго не всъ Хирурги имъють. Были примъры, что послъ операція сей слъдовали нещаститйи іс случаи от неискусства, или невъжества производившихъ оную. Когда Операторъ совершено узнаеть, что есть въ пулыръ намень, то надобно положиться во всемъ на его наставленія, или на Лънаря, коему повърено здравіє.

\$ 3.

Пищеупотребление, коему должны послёдовать имыю-

Люди, имѣющіе песоко, или камень, должны из-ясть, оть коихо, бъгать астой свойства выпротворнаго и горяситель оть коихо наго, какы-то кушаньевы соленыхы, плодовы незрывоздержнымихы и проч; все, ими принимаемое, должно стреваться; миться кы произведенію отдыленія моги и послабленой кои должны нію живота. Они должны употреблять артишоки, треблять спаржу, картофель, моржовь, рыдыку, хрыю, и проч. Пуко, цыбули, сельдерея вы семы случав почитаются лыкарствами.

Пригодивнийя пишья сушь сыворотка, сыворотка пишье послё пахтанья, молоко съ водою, ятная вода, декокты изъ корней рожи, петришки, солодки, или изъ другаго какого вещества склизистаго сладкаго, какъ-то изъ лыпянаго съмени, и проч. Ежели больной привыкъ къ спиртиымъ напиткатъ, то можетъ пишь легкаго пуншу безъ кислотъ.

Тихое твлодвижение пригодно; но ежели оно бу- умъренное деть бойко, то можеть причинить могу съ кровью и тълодвитакъ надобно ему быть умъренному. Люди, имъющие жение песокъ, часто поъздивъ верьхомъ, или въ повозкъ, выметали съ могето множество малинькихъ камушковъ; но имъющие каменъ въ пузыръ ръдко бываютъ въ состояни выдержать сей видъ телодвижения.

Тѣ, кои опасаются сей бользни по той причи- Содержанѣ, что она была у ихъ отца и матери, должны віе себя для
избыть сидячей жизни. Ежели съ первыхъ признаковъ песка будутъ они наблюдать приличную діэту, наменной
предпринимать довольное тыло движенів, то уничтовользни по
жатъ причину бользни, или по крайней мъръ не дамой придутъ ей усиливаться; но ежели будутъ слъдовать она была
то-у ихъ от-

тому же себя содержанію, которое причинило бо-WE H MA2авзнь, то не преминуть отягчить ее. шери.

Cemy coдержанію надобно вышь не бинельному. Для sero ?

(Содержание себя смишкомъ слабительное кажется содъйствующимъ къ произведенію песка и сосшавленію камия. Мы уже сказали, да и еще повтоочень сма- римЪ: всв выметанія человвческаго твла такое близкое имъютъ между собою соотношенте, что одно не можеть иначе принуждено быть, чтобь купно другія не уменьшались по шакой же сразмірности. Мы сте доказали въ главъ 6, § 1, членъ III, примъч. 2 сего Тома изъ дъйствія кровопусканія въ воспаленіи легкихв, когда больной легко харкаеть и обильно; и еїн истинна еще очевиднье въ выметсиї ях в живота. Мы видъли въ главъ 22, 5.3 сего Тома, что изъ числа признаковъ поноса есть и уменьшение моги, принимающей на себя цвътъ темной по сразмърности ихЪ малаго количества, и что напротивъ животъ тогда запирается, когда мога идет в слишком в обильно, какЪ-то въ длабетесв или непомврномв тегенли моги, • коемЪ мы говорили выше, вЪ § 1 предыдущей главы.

И такъ когда кто опасается сей бользни, то Movs Haдобно течи надобно ему избъгать всего могущаго слишкомъ слабить животь, да и запереть его; оыметанго моги обнавно; но и живоего надлежить быть, сколько можно, обильныйшему. шу не

елишномъ **быны** заmepmy. Средства Ha cie.

Почему обычайное твлодвижение на вольном воздухв, какого бы оно вида ни было, только чтобъ не производило насильнаго пота; постоянное употребление ястев, исчисленных в в в семъ параграфъ и совокупленных в съ веществами животными; бълое вино, емьшанное съ равною частію воды вмысто питья, и избъгание от всъх означенных в в в у сей главы причинъ, супь извъстнъйштя и надежнъйштя собственнодвиствующія на сіс.

5 4+

\$ 4.

Пвкарства, кои надобно предписывать тымб, кои страждутб пескомб, или камнемб.

ВЪ томЪ, что называютЬ приступоло песка, обы канъ накновенно причиняемомЪ малелькими камушками, оставовать новившимися въ стволь, или въ какихъ нибудь друбольнаго тихъ путяхо лосевыхо, надобно больному пустить въ прикровь, прикладывать теплыя припарки къ среслало и ступъ пеко подбрюшию, давать мотегонительныхо пролываний, сажать во ванну, давать пить мокротожидительныхо, склизистыхо отварово и проч. Мы уже изложили пригодное въ семъ случав пользование, въ воспалении потеко
и пузыря; и такъ отсылаемъ читателя къ главъ 21,

у 4 и 5 сего Тома.

Докторь Витть совытуеть тымь, кои подвержены известночастымь приступамо песка вы поткахо, но неимыющимы вая вода, камия вы пузыры, пить каждое утро за два или за при часа переды завтракомы по фунту известковой риноны воды, дылаемой изы кожуринокы устерсово, или ра-устерсовы ковино; оны весьма основательно замычаеть, что хо- виноны осы давняго времени ведущёйся вы пузыры ка мень: однако выроятно, что оны будеть противиться составленію его, когда оны только что туда вналь (3).

Томо ІІ. Вы Ко-

(5) ВЪ сихЪ самыхЪ случаяхЪ найдены были превосходныя дъйствія Контрекоть от обильнаго питія минеральныхЪ содъ контрексевильскихЪ (что севильскіх въ Лотарингіи), коихъ Г. Туневель, мой другъ, даль разобраніе въ воды. изданной въ Парижъ 1714 года запискъ, у книгопродавца Валаса, о началахъ и качествахъ сихъ водъ. Онъ даже выгоняли камии средстваенной величины.

Онъ по поводу сего приводить свидътельство одного весьма опытнаго Врача, такъ изъясняющагося: минеральныя контрепсевильемія воды суть превосходныя лънарства въ бользилхъ почекъ, момепропускателей, пузыря и стола, нановы суть камень, песокъ, нагноенія, вереды въ сихъ мъстіхъ и дикомпсія столя. Мя смъсть утверждать, прибавляеть онъ, по неподозринельнымъ свидъ-

Пользованіе, когда камень соетавился въ пузы-

Когда камень составился въ пузыре, то Докторъ Виштъ совътуетъ Грегеское мыло и известковую воду, дълаемую изъ кожуринокъ устерсовъ или раковинокъ, которую предписываетъ употреблять слъдующимъ образомъ:

Гречесное мыло и известновая вода. Больной долженъ принимать повседневно, подъ пріятнъйшимь ему видомь, по унціи Грегескаго мыла, и выпивать по три или по два фунта известковой воды; но онъ долженъ раздълить мыло на три неравныя части. Большую часть долженъ онъ принять весьма рано поутру натощакъ, вторую ополудни, а третью въ седьмомъ часу вечера, а запивать сверхъ каждой изъ нихъ по большому стакану известковой воды. Остатокъ сей воды долженъ выниваемъ быть между объдомъ и ужиномъ вмъсто всякаго другаго питья.

Mpieml.

ТрезЪ

онольно
времени
мадобно
продолжать сіи
дъхаретва?

Однако надобно начать съ прісма мыла и известновой воды меньшаго, нежели какой предписываеть здъсь Докторъ Виттъ. Больной сперза долженъ принимать только по фунту известновой воды, и по три драхмы мыла въ день; а по томъ постепенно умножать сте количество даже до предписаннаго прісма.

мельствамъ, что нонтренсевильскія воды въ высочайшемъ степени дъй швительны суть претивъ камия; что онъ его отдирають и выгочнють изъ пузыря, ногда камень величины средственной; что онъ имъють свойство разбивать въ нусочки тъ камии, нои потолще и свойства крящеваго и вязнаго, дажа тъ, нои суть стчасти вязнае, а отчасти стънные или диніе.

Бонскія и Барежскія воды• Г. де Борде такую же приписываеть похвалу вонскимь, Барежсвимь водамь изь опытовь, учиненныхь надь камилми, кои пропали чрезь несколько дней вы сихы водахы, и изы коихы осталось только одно зерко, могущее удобно пройти чрезы всё мочевые пути; оны прибавляеть, что неты такой минеральной воды во Франціи, гат бы не сохраняема была памить о исцыленіи оты нефритической или почечной полики, и гат бы не псказываемо было болье или менье песка, вышедшаго оты питія сихы водь. Recherches fur ies mala-

Но употребление сихъ лъкарствъ надобно продолжать чрезъ нъсколько мъсяцовъ, наиначе естьли примъчаетъ больной нъкоторое облегчение, и чрезъ нъсколько лътъ, ежели камень нъсколько великъ.

И то также бы было полезно больному, есть-впоричная ли бы онь настояль не токмо на употребление вы на-и тречаль малыхы присмовы, но еще и на принимание толь-вестковой воды, или третитной выв-вода, ето первой (4).

Между тъмъ, какъ онъ привыкнетъ со временемъ къ симъ лъкарствамъ, надобно ему приступить къ первой известковой водъ; и ежели найдетъ себявъ состояни удобно переваривать, то надлежить се дълать сильнъйтею, взливая ее во второй разъ на новособранныя и истолченныя раковинки.

Поташовой щолоко нынв сств наибол ве слави-жгучій мое лекарство противь камия; онь иметь свойство алкали или весьма едкое, и никогда не должень иначе даваемь мыльни. быть, как разве вы жидкостях студеню - по добных ковь вы или склизистых, каковы суть телячій бульюнь, свенакомы жее молоко, настой сы льнянымы семенемы, распущено давать?

Созътуемая Г. Буханомы предосторожность доходить до ноличества воду?

известновой воды, предписываемаго Докторомы Ваштомы, только нужда допостепенно, весьма мудра; она между прочимы послужить больному ходить до
кы увъреню, пригодна ли она его темпераменту и тылосложению, приема изпрежде нежели оты очень сильнаго приема сдылается она ему вредною: вестновой
потому что премножество практиковы замытили, что известновая воды повода противна была имыющимы оты оной отвращение людямы, также подверженнымы запору, находящимся вы сухотяю, вы чахотяю,
расположеннымы кы состоянию воспаления, подпадающимы кровотечению; а это, говориты Г. Лістоды, по тому, что дыйствующее вы
осмы лычарствы свойство есть разыбаетсянове.

⁽⁴⁾ вторичного известнового еодого называется та вода, кот рую на что разлами на подонки извести въ другой разь по слити вонъ первой; о умбется
чемъ налобно читать во всеобщей таблиць, въ Тэмь V подъ словомъ: чрезъ втоизвестновая вода; известновая третичная вода есть та, которую ричную изналими евъжую на оставшиеся по слити вторичной воды подонки.
Вестновую
Созътуемая Г. Буханомъ предосторожность доходить до количества воду?

ние а имонистеской камваи, или декоктв съ корнемь

ПріемЪ.

Больной долженъ сперва причимать сте лъкарство по малому пріему, какв-то отв тритцати до сорока каплей, и умножать его, по мъръ, какЪ желудокъ его къ нему привыкать будеть. Вотъ какъ прі уготовляется сей щолокв.

Способъ сосшавльшь сей щолонЪ.

Возьми негошеной извести, - - двъ унціи, Поташа, - - унцію.

Смъщай сти два вещества и оставь, пока сдълается изв оныхв щолокв; прежде употребленія его надобно процедить или пропустить его рачительно. Ежели еїн двъ ингредіенціи не скоро раснущаются, то можно въ нихъ прибавить немного воды.

Хотя сей щолоко донынь почитаемь быль силь-Apyria Atнъйшимъ лъкарствомъ противо камия; однако есть жарства. и другія авкарства гораздо простве, такъ какъ мы упомянули выше, въ примъчании 3 сей главы, кои въ нъкоторых в случаях в крайни, и слъдовательно достойны попытки. Великая получаема была польза отъ Пастардекокта пастарнака, подслащеннаго медомъ въ томъ накъ съ мед мЪ, случат, въ которомъ желудокъ не принимаетъ ве-Деновть извиежие-ществь ваких и жгутихв. Декоктв изв кофе нежженаго нефеннаго, принимаемой поутру и повечеру, по осьми или ными кап- десяти унцій, помогаемый насколькими каплями спирякми спир та отищенной селитры (spiritus nitri dulcificati). та очищен часто облегчаль больнаго, выгоняя множество волоной селит тей земляной матеріи (5).

Мы

nie o cu-Maxb cero щолока.

Примъча- (5) Сей щолонь, называющійся жгучимь алиали (alkali causticum) и щолокомъ мыльниковь, быль превознесе ть похвалами отъ 1. Бланерій, Англинен го Врача, въ сочинени подъ названиемъ: изыскания о локаретвакъ могущикъ развивать камии и песокъ. Французской сего сочиненія Переводчинъ, члент Париженаго Медицинскаго факультета, еперва извъщаеть, чио потребна ощупь для извъданія, коль великъ npi-

Мы упомянемъ только объ одномъ другомъ лѣ-толокнянкарствъ; оно есть толокиянка (uva vrf); она особен- нино похваляется съ нъкоторато времени противъ калия
и песка: однако сте лъкарство по всему кажется ниже пы та и известковой воды; но какъ оно не столь
непртятно, да и часто облегчало при моихъ глазахъ
больныхъ пескомъ, то можно на оное покуситься.
Сте лъкарство обыкновенно принимается въ порошкъ способъ
отъ полу до цълой драхмы по два и по три раза въ принимить
день. Его можно отъ семи даже до восми драхмъ принимать безъ всякой опасности; оно вреда никакого не емъ
можетъ причинить.

(Из всего вышесказаннаго надобно заключить, что долчто настоящія лікарства камперазбивательныя, или мень думогущій распустить камень ві поткахо и пузырі, упомянурізки. Мыло и известковая вода, жгутій алкали и то тыхі лімокиянка поперемінно иміли хвалителей и хулителей, они не такі какі мы виділи выше. Г. де Гаені, извістный суть наві світі по своей учености и честности, есть изі стоящія числа тіхі, кои наипаче превозносили силу толокнянки; намнеразбиватель-

пріємъ надобно предписать сего лькарства. Алналическая сила сего лькарства одна только, по мньтію Англинскаго Доктора, дъйствуеть на памень; но Переводчикъ течно говорить, что щолокъ мыльниковь неутрализированной, т. е. напоенной инслотою, танже разбиваеть камни. Сей послъдній въ том учтрился, разбивъ от юмокъ
пузырнаго камня въ смъси четырехъ ложекъ хорошаго рейнскаго
уксуса и двухъ ложекъ сего щолока; онъ приводить севершенное
излъченіе Гжи. Наручеси; оно произошло отъ мыла и лимонада Г.
Фашіго, которой есть средняя соль съ избыт чествомъ инслоты.

Но, прибавляеть онь, потому что наши Французскій воды лекарства выгоняли досель болье песка и облегчали болье мочевых пузырей, надежный нежели всь мнимыя совственнодвиствующія: то для чего нашь не шіл да и винной и безонасной споссов не находить одобрителей, такь безонасный и находить иностранной? На чемь основывается предпачтительный ность его, потому что и наши воды, кои и кислы, ни алкалическій суть, являють, по поводу камней, такія же произведеній, какід щоловь мыльниковь? Гав находится нужда и польза приложенія его ив леміямь живаго тьла? Recherches fur les maladies chroniques, рад,

однако наконець онъ признается, что сте растенте не заслуживаеть имени камне разбивательнаго лекарства. Но Г. Планшонь даеть знать вы сочиненти своемы поды названтемы: jraité du Naturifme, что сте растенте выльчило немотедержанте, случившееся послы камневы резыванта. Сте лыйствте, говорить онь, я самы видыль нады однимы малинькимы мальчикомы; послы того, какы оны приняль оты десяти до двынатцати грановы толокияики (иск vrfi), удерживаеть оны постоянно могу.

Свойство толокнян-

И такъ въ разсуждени камперазбивательных лъкарствъ надобно еще ожидать опытовъ; и достигнуть
до открытія настоящаго лъкарства противъ жестокой каменной бользии иначе не можно, какъ повторяя
опыты. Мыло и жеугіе алкали, кажется, болье всего
къ онымъ подходять; почему и входять они въ лыкарство двещы Стефенсь (коего составление предлагасмъ мы во всеобщей таблиць), и которое, кажется,
иынъ менье употребляется въ Англіи, хотя отъ него великая была получаема польза тамо, и даже во
Франціи. Г. Ліетодъ между прочимъ приводитъ многіе опыты, о коихъ истиннъ по его извъстному правдолюбію не можно сомнъваться (6).

Одна-

Во время путешествія сего Сочинителя въ Парижь, имъ учиненнаго въ послъднемъ году, онъ покущался на нъноторые опыты, коихъ слъдствія не обнародеваны; но я извъстился въ Маїв мёсяць 1780 года, что два больные, употреблявшіе его лънарство (изъ ноихъ одинъ нарочно тадиль въ Англію для приниманія его при глазахъ Г. Перри), принуждены были вытерпъть намневырбамваніе: и такъ позволительно сомнъваться о дъйствительности сего совственнодвиствующаго,

Разбивательное собственнодъйствующее Г. Перри.

⁽⁶⁾ Одинъ Англинской Хирургъ, Г. Перри, объявиль себя противоборникомъ сихъ лънарствъ въ сочинении, подъ названиемъ: изыскания
о намит и песлъ; онъ предлагаеть вмъсто мыла, щолоковъ и пречлънгретво своего изобрътения, имъ называемъго развивательнымъ совстоениодъйствующимъ; онъ приводитъ великое число людей симъ
лънарствомъ вылъченныхъ въ Англіи, между ирочими танже Милорда Жоржа Жерменя, Штатскаго Секретаря и члена Тайнаго Совътника Его Величества, Короля Англинскаго.

Однако мы почитаем в себя в в состояни утвер-одинь ждать, что одинъ только Лькарь можетъ предписы- только львашь то или другое изъ сихъ лъкарствъ. Вообще, жетъ какЪ скоро человъкЪ поднадетъ вышеописаннымъ при-предписыпадкамЪ, то надобно ему призвать опытнаго Лъкаря; выть сіл сей случай столь важень, что не можно положиться выправа. на невъжество, или неопышность. Множество находишся людей, которые страждуть целые годы оть употребленія пособій, предписываемых в только бабками - лъкарками, знающими, какъ извъстно, собственнодвиствующия авкарства противь всвх бользней, но также, какъ равно не безъизаветно, невыльчивающими никогда почти. Сти люди когда призывають Лъкаря, или Хирурга, то находятся они тогда въ плачевнъйтемъ состоянии, и часто толь безсильными, что не могуть вытеривть операціи камневы різыванія, единаго остающагося въ такомъ случав средства.

Камневы резывание, т. е. операція вышимать ка- Операція мень из в пузыря, кажется, столько усовершенствова- намневыно, сколько можемъ. Человъчество навсегда одолжено понынъ себудеть французскимь Хирургамь тъмь, что они до-тается вели его до шакого стенени, на которомъ оно нынъ единственнаходится; и ежели оно не всегда успъшно, то это ствомъ по тому, что больные чрез большую часть времени освебоявляющся уже поздо, истощенные безполезными лакар. диться ствами, опустивште минуту операцти, которую одинъ ной болдзтолько Лекарь, или Хирургъ могуть назначить.

Мы не будемъ входать здёсь въ подробность о она не всеразличных в способах в камневы разыванія; каждой имъ-гла удаетещь свои выгоды, и никакой не должень принимаемь ся? быть за изключением других Впрочем Вирурги, особенно опредъливште себя на произвожденте сей опе-

pa-

пока произведено будеть довольно опытовь; оно доставило облегчение жногимъ людимъ: вошь что можно е немъ заключить донынв!

раціи, знають всь сіи способы и умьють избирать показываемыя обстоятельствами.

Средства Что касается до средство предохранять себя предсхрапредсхранять себя
еть песка и калия, то мы отсылаемо читателя ко
еть песка содержанію себя и пищеупотребленію, коему должны и намня. следовать имеющіе причину бояться сей болезни по
той причине, что ихо отець или мать были оной подвержены, и кое описано выше, во конць з у сей главы.)

Конецо втораго Тома.





ВЫПИСКА ГЛАВЪ, ПАРАГРАФОВЪ И ЧЛЕНОВЪ ТОМА ВТОРАГО.

ЧАСТЪ ВТОРАЯ.

KAPTИНА

Признаково, избявляющих ви составляющих общіх внутреннія и другія тяжкія бользии.

	пран.
Перемежающіяся лихорадки (Febres intermittentes.)	10
Ежедневная лихорадка (Febris quotidiana.)	II
Тридневная лихорадка (Febris tertiana.)	-
Четверодневная лихорадка (Febris quartana.)	_
Лихорадка беэпрестанная - острая, или лихорадка воспали-	
тельная (просто огневица) (Febris continua - acuta, ceu febris	
inflammatoria.)	-
Настоящее колотье въ бокахъ (Plevritis vera.) -	12
Ненастоящее или ложное колотые вы бокахы (Plevritis spuria.)	-
Настоящее воспаление грудобрющной перегородки (Paraphreness seu	719
inflummatio diaphrogmatis.)	_
Настоящее воспаление вы легких (Peripnevmonta vera.)	-
Настоящее или ложное воспаление вы легкихь (Peripneumonia	
Spuria.)	-
41xomka (Phrisis.)	-
Англинская нахотка, истощание или измождение (Consumptio.)	15
Анхорадка внутренняя или нервная (Febris lenta ceu nervosa ceu	
bectica.)	-
Анхорадка гнилая, элая, св пятнами (Febris putrida, maligna,	
purpurata, petechialis.)	16
Лихораяка св сыпью или высыпная (Febris miliaris, lenticularis,)	18
Лихорадка отступная или отходинвая (Febris remittenss)	-
Ocna (Variola.)	1,
Kops (Morbilli, quibusdam rossalia.)	20
Лихорадка багровая къ добру (Febris scarlatina benigna.)	21
)(Ли=

	шран.
Anxopagka basposan kb sny (Fibris scarlatina maligna.)	_
Анхорадка экспиная (Febris biliofa.)	22
Рожа (Erysipelas.)	-
Сумазбродство или воспаление мозга (Phrenesis cen inflammatic	,
cerebri.)	25
Воспаление желудка (Instrammatio stomachi.)	24
Воспаление подбрюшия, бользны илическая, мизерере (Інват-	
matio ventriculi inferioris, passio ceu morbus iliacus, miserere.) -	-
Воспаление почекь, боль вы поясниць (Inflammatio renum, nelbritis,	
morbus ceu colica nephritica)	-
Воспаление моневаго пузыря (Inflammatio vesicae urinaria)	-
Холера - боль энь, ресть низсмы и верхомы (Cholera - morbus.)	26
Сцака или непомърное течение мочн (Diabetes.)	21.
неудержание мочи, ито просто называють: не держител	
моча (Incontinentia urinæ.)	
Хрящь, necokb (Saburra, materies calculosa)	
Kament (Calculus.) -	28.
Крсвавой понось (Dysenseria.)	
Requemenence (Fluxus b paricus.)	29
Мезентерической флюсь (течние изв брыжейника) и черная	TO CAS
Contone (Fluxus mesentericus & ater morbus.)	30)
Селезсночница (Lienteria.)	
Сырь, или целіанеской флюсь (Passio ceu sluxus caliacus.	
TANCMBL (Uermes.)	31
Подагра порядочная (Podagra regularis.) -	3.2
Подпера непорядиная или павшая на голову (Podagra, сен тые-	
ries morbifica, podagræ, irrægularis, ad caput appulfa.) -	
Подпера павшя на грудь (Podngra ad pectus appulfa.)	No.
Подагра павшая на желудокь Podagra, ad stomachum appulsa) -	3.8
Подагра павшая на подбрющие или почки (Podigra, adventriculum inferiorem, aux ad renes oppulsa.)	
Ломота воспалнтельная или острая (Rheumarismus instammatorius ceu	
Acutus.) -	34
(ко, буть или цынготная бользны (Scorbusus) -	-
Скорбутической флюсь (Fluxio scorburica,)	3.5
Жлба свинуха (Strume.)	-
O Astruka (Afthma) -	30
Anonnekcia nocmobab, (Apoplexia.)	8 7/
Апоплексія к овячая пострвав отв удорі крови (Ароріехія, fan	
guinea.)	
Anonnekcia пасочноя или мокротная (гарорыхів Jerofa сен рігнігоба)	28
Mozaca (Cardiagia.)	-
	CH . 2

Sharmon and the state of the st	Стран
Сильная или жгуиля изгага (Зода,) .	- 58
Вапоры или не вныя бользни (Uapores ceu morbi nervorum.)	. 39
Меланхолія, сумаэбродство, манія (Melancholia, mania.)	- 40
Эпилепсіа, падуиля сользив (Epilepsia, merbus, malum caducum.)	41
БВснование (Damoniafis.)	- 42
Hanasenie monn (Incubus ephialtes.)	. 0
истерика, матка (Affectio ceu passio bysterica.)	
Ипохондрія (Affectio, passio bypochondrica)	- 43
З в пы и супррические желваки въ груди и подбрющий (Об	b.
structiones & tumores scirrost in pectore nec non in ventriculo inferiori.) 44
Зав лы въ фаринкст и глоткт (Obstructiones in pharynge & cofopbag	0.) 45
316anot 8b neekuxb (Obstructiones in pulmonibus.)	
3 8anot 6b nenenu (Obstructiones in bepate.)	
3 sind 6b cenezenkt Obstructiones in liene	- 46
3 вали в в брижейникь (Obstructiones in mesenterio.) -	
Згалы въ желу Акв, въ пилоръ и въ панкреасъ (obstruction	es
in stomacho, syloro & pancreate.) -	
З валы вв кишочномв каналь (Obstructiones in canali intestinali.)	
Отрава или ядь, причиненная мышьякомь (Arsenicum, int	us
fumptum.)	-
Отрава, приинненная жьдною зеленью (Ærugo enea fossilis, intus	
fumpta.)	- 47
Отрава, причиненная свинцомо и сго выдолками (Plumbum	6
que ex co fiant praparata, incus sumpra.)	- 48
Отрава, причиненная шпанскими мухами, принятыми внутр	В
(Cantarides, intus sumpræ.)	
Уязьление отв ядовитых животных (Uenenum, а venenat	is
animalibus communicatum,)	- 49
Отрава, произведенная растительными ядами (Uenenum, а сед	6-
tabilibus venenatis productum.)	
Ompasa oniemb (Venenum ab opio.)	•
Отрава от в болиго ова и песьих в грибовь (Uenenum и сіси	ta
venenatisque boletis,) -	- 50
ГЛАВА 1.	
Общія наблюденія о свёденін и пользованін бользней.	51
Врачебная Науна основывается только на наблюдении и опышть.	
Что надобно двлать для узнанія бользней? -	
До сего иначе досшигнуть не можно, накъ прантиною въ медицин	₽· 52
Какъ должно взирать на бользнь?	
Причины, побудившія сочинителя последовать своему чертежу	J.P.
сей Второй Части.	
)(2	9 1.

Cupus.

О общемь пользованін бользней, относительно кь возрасту, пол тьлосложенію, праву, воздуху, яствамь, упражненіямь	y 2
	53
Первое дёло при пользованіи болёзней.	
Бользни младенцевъ и стариновъ существеннымъ образомъ между	
собою различны. Для чего?	
у женщинъ бывающь такія бользии, коихъ у мущинъ не бы-	
ваещь, и требують большей осторожности въ пользовани.	
нъжной человънъ пребуеть другато пользования, нежели плотной и	
сильной.	-
Должно знать нравъ больнаго. Для чего?	54
Для чего надобно смотрыть на воздухы, коимы больной дышеть?	
— на яства, имъ употребляемыя? -	_
на его упражненія, на родъ жизни?	-
- which the state of the state	
\$ 2.	
A mark and a consultation of the second seco	
0 томв, ито должно энать прежде приступа кв пользования	-
какой нибуль больтыни.	55
Должно навъдащься о свойствъ бользии, о времени, съ котораго она	
продолжается; о причинъ, ее произведшей.	
MAN VETO? -	_
Еще о выпоражниваніях , о дыханіи, о пищевареніи и проч.	56
Сколько - ню легно можно обманушься онвышами больных в о своих в	
бользнахь.	_
И шакъ надобно выспрашивать и вывъдывать не токмо отъ боль-	
ныхъ, но и отъ окружающихъ ихъ.	-
Вопросы, кои надобно предлагать больному.	57
Разные людскіе образы мыслей въ состояніи бользней и в ихъ бо-	
абзняхь.	_
ВЪ разсказъ больныхъ е своей бользии потребна одна одинровенность	
и истинна.	-
Какъ спрашивань взрослаго?	58
Женщину.	-
Когда боленъ младенецъ.	-
Надобно смотрьтв на вившность больнаго, на испражнения, на за-	
пакъ его изо риз и проч.	-
AAR vero :	-
The state of the s	
\$ 3.	
О пище употребленін при пользованін бользней.	59
Важность діяты въ пользованіи бользней.	_
Заблуждение простонародия о ликаретвахъ.	-
Следеные сего заблуждения.	1
	At

Cmpan
женарения тогда только могуть быть полезными, когда предпи-
сывающия и употребляющия еъ благоразумиемъ.
ANN vero!
члень і.
Какая должия быть дізта вы бользняхь вообще? бо
Всякая бользив разслабляеть пищеварительных силы.
ліэта въ лихорадкъ, произшедшей оть излишества.
въ лихораднахъ восвалишельныхъ.
въ лихорадияхъ внутреннихъ, нервныхъ, злыхъ и проч.
въ продолжительныхъ бользияхъ.
— въ скорбущъ.
въ чахотив»
членъ п.
в воздухъ при пользованій бользней.
Важность свъжаго воздужа поновляемаго въ большей части бользней.
YAEHD III.
- in the same and the same should be the same
О твлоденжении при пользовании продолжительных в бользней.
Тъходвижение можетъ почесться абиарствомъ во многихъ продол-
жительных болбэндав.
членъ іу.
О инстеть при пользованіи бользней.
Одна чистопа можеть выльчить многія бользни, и во всяних бо-
атэняхъ полезна нанъ больному, такъ и пользующимъ.
членъ у.
о превосходствь пищеупотребленія надь лькарствами при поль-
зованін бользней.
Пищеунотребление можеть выпользовань безь ленарствь; а ленар-
ства, ежели пищеупотребление пренебрежено, останутся тщет-
ными.
Канимъ образомъ должны поступать немогущие употреблянь лъ-
карства:
Авиарсива не могушъ даваемы бышь всеми людьми 64
P. Z. I. D. L.
ΓAABA 2.
О лихорадках вообще.
Веяной человънъ долженъ знашь причины лихорадокъ.
Для чего?
Общія причины ликорадокъ.
Лихорадии суть обыкновенныйшія и эспутанныйшія бользии.
Харантеристические или существенные признаки лихорадонъ 65
)(3

	Стран.
Общие признани лихорадокъ.	- 65
Признани лихорадокъ, пристающихъ постепенно.	
— пристающих в вдругь	
\$-1.	
0 различных видах лихорадокъ.	66
Что разумъется чрезъ безпрерывную хихорадну? -	
— чрезъ лихорадну острую?	
— чрезъ лихорадку внутренную или медленную? -	
— чрезъ лихорадну злую?	- 67
Опасности, возвъщаемыя пешехіями.	
чъмъ петехін различны отъ высыпи, пурпуры и проч?	
Нъкоторыя лихорадки суть просто только петехіальныя, не всег	A2
бывая заыми или гяилыми.	
Чъмъ различествують элыя или гнилыя настоящія петехіальн	RIG
лихорадии ств лихорадскъ престо только петехіальныхъ?	
что разумъется чрезъ линорадну отступную? -	- 68
— трезр чиховачий пебемежающуюся;	
\$ 2.	
О общемь пользованін лихорадокь.	
Настоящее понятие о лихорадит	
Можно остановить усиле лихорадии, вспомеществуя внача	X T
дъйствілмъ природы?	- 60
Каная цтаь сочинителя въ описании пользования лихорадонъ?	
Какое первое явкарство вдохнуто природою?	- 70
Вода-	
Простыя явизреть должны предпочитаться сложнымъ и проч-	
Простота есть естественное состояние.	
Мибина древникъ о сложныхъ ленарешвахъ и ихъ многочисленност	
Полезныя дъйствія питій легних и монротожидительных въ л	IN-
хораднахъ острыхъ.	- 71
Признаки показывающие сін питія.	
Канимъ образомъ дълаются сін питія?	-
что должно разумъть подъ словомъ: лънгретва простыя?	TO HOLD TO
Вазиность поноя, ногда начинается лихорадиа.	- 72
Спасытельныя действія покоя на постели въ лихорадиахъ.	
Споновствие духа не менъе нужно въ ликоради: къ, нанъ и тъла	
Отвращение от яствъ твердыхъ, вдыхаемое природою въ ми	KO-
радкахЪ.	- 75
Яства тогда не больнаго питають, а тольно больнь	-
ВЪ чемъ должны состоять яства, ногда они показуются?	
Желуднонръпишельныя усугубляющь шольно лихорадну, или	ee
производять, когда ее ньть	
Опасности от конфенциовъ, сухарей в проч. въ лихораднахъ.	
Выгоды от свъжаго воздуха въ михорадиахъ.	74
	Па-

	mpan.
Нагубная унорносные простаго нароже претивъ сего правила.	74
Степечь теплоты, долженствующій быть ві н мнать больнаго.	
Не падобно того шерпыть, чтобь въ номнать больнаго находилось	
много людей. Для чего?	-
Об тоятельства показывающія давань крупительных и оживлять	
духь и надежду въ больномъ.	
На чемъ основывается ложное мивніе простаго народа, опносительно	
до нужды кровопусканія въ лихорадкахь?	75.
Лихорадии, въ коихъ кровопускание вредно.	76.
Одни тольно признаки воспаленія показывають провопуснаніе вь ли-	100
хораднахъ.	-
Когда и накъ надобно возбуждать потъ въ лихораднахъ?	-
Кровопускание даже не нужно во всткъ воспалительныхъ лихорад-	
кахЪ.	-
Опобенныя бользии, въ коихъ кровопускание смершельно.	-
Свойство признановъ, поназующихъ кровопуснание.	-
Опасности от в обынновеннаго способа возбуждать потв.	77:
Единственныя бользни, въ коихъ можно возбуждать потъ.	-
Сін бользян рыдки.	-
Опасно остановить поть, ногда онъ естественно выходить, а наи-	
паче въ концъ бользней.	-
Въ лихорадиахъ надобно- уважать желанід больныхъ.	
All vero ?	-
46.1A. 1010 .	78
	78.
\$ 3.	78.
\$ 3.	
О пользованім встающих в ням выздоравливающих в якдей отв	
© пользаванін встающих вызнаванны пользаванін встающих отв хорадокь.	
© пользованій встающих вызморавливаний отв хорадокь. Первое стараніе при вызморавливаній отв лихоралонь.	ли-
О пользовании встающих пли выздоравливаницих пли дей отв хорадокв. Первое стараніе при выздоравливаніи от лихорадон в. Природа часто вдыхает охоту на аствать в ланарствать при-	ли-
О польжение встающих пли выздоравливаний от лихорадонь. Первое стараніе при выздоравливаній от лихорадонь. Природа часто вдыхаеть охоту нь яствать в ліжарствать приличным бользян.	ли-
О пользаванім встающих пли выздоравливанщих пли дей отб хорадокь. Первое стараніе при выздоравливаній отб лихорадокь. Природа часто вдыжаеть охоту къ яствать в лінарствать при- личным бользни. Вдохновеніе природы въ бользнях в гнилаго рода.	ли-
О пользавании встающих пли выздоравливаницих пли дей от хорадокв. Первое стараніе при выздоравливаній от лихорадой в. Природа часто вдыхаєть охоту нь яствать в льнарствать приличным бользян. Вдохновеніе природы въ бользнях гнилаго рода. Вездъ природа требуеть того, что ей нужно.	лн-
\$ 3. О пользаванім встающих пли выздоравливаний от лихорадокь. Первое стараніе при выздоравливаній от лихорадокь. Природа часто вдыжаєть охоту нь нетвать в льнаретвать приличныть бользни. Вдохновеніе природы въ бользнях тнилаго рода. Вездъ природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать я сть холода, предпринимать	лн-
О положедние встающих или выздоравливания от лихорадовь. Первое стараніе при выздоравливаній от лихорадовь. Природа часто вдыхаєть охоту нь яствать в лівнарствать приличныть болізня. Вдохновеніе природы віз болізнях тимаго рода. Везді природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать я сть холода, предпринимать тілодвиженіе неутомляющее их в и проч.	лн-
О пользовании встающих вили выздоравливания от лихорадокв. Первое стараніе при выздоравливанія от лихорадов в льнарствам приличным вользани. Природа часто вдыхаєть охоту вы яствамы в льнарствамы приличным вользани. Вдохновеніе природы вы бользаний гнилаго рода. Везды природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать я от холода, предпринимать тылодвиженіе неутомляющее ихы и проч. Канія должны быть ихы яства?	ли-
О пользавании встающих пли выздоравливаний от лихорадонь. Мервое стараніе при выздоравливаній от лихорадонь. Природа часто вдыхаєть охоту нь яствать в льнарствать приличнымь бользят. Вдохновеніе природы вы бользняхь гнилаго рода. Везды природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать я сть холода, предпринимать тылодвиженіе неутомляющее ихь и проч. Канія должны быть ихь яства? Имь надобно всть понемногу за разь но часто, для чего?	ли-
О пользовании встающих пли выздоравливания от лихорадов в людей от мерей от хорадов в. Первое стараніе при выздоравливаніи от лихорадов в. Природа часто вдыхаєть охоту вы яствать в літарствать приличныть болізни. Вдохновеніе природы вы болізняхы гнидаго рода. Везды природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать я сты холода, предпринимать тілодвиженіе неутомляющее ихы и проч. Канія должны быть ихы яства? Имы надобно ість понемногу за разы но часто, для чего? Правила вы пользованіи выздоравливанія.	ли-
О пользовании встающих пли выздоравливания от лихоралов писаницих пли дей от хоралов в. Первое стараніе при выздоравливаніи от лихоралов в. Природа часто вдыжаєть охоту вь яствать в льнарствать приличныть бользин. Вдохновеніе природы вь бользинях гнилаго рода. Вездь природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать я от холода, предпринимать тълодвиженіе неутомляющее их и проч. Канія должны быть их в яства? Имь надобно всть понемногу за разь но часто, для чего? Правила вь пользованіи выздоравливанія. Примъромь представляются Съверные и Полуденные народы.	ли-
О пользаванім встающих пли выздоравливаній от лихорадокь. Первое стараніе при выздоравливаній от лихорадокь. Природа часто вдыжаєть охоту нь нетвать в льнаретвать приличныть бользни. Вдохновеніе природы вы бользнях гнилаго рода. Везды природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать я сть холода, предпринимать тьлодвиженіе неутомляющее их и проч. Канія должны быть их яства? Имь надобно всть понемногу за разы но часто, для чего? Правила вы пользованій выздоравливанія. Примыромы представляются Сьверные и Полуденные народы. Что должно разумыть поды словомы выздоравливаніе?	ли-
О пользовании встающих или выздоравливания от лихоралонь. Первое стараніе при выздоравливаніи от лихоралонь. Природа часто вдыхаеть охоту нь яствать в льнарствать приличнымь бользия. Вдохновеніе природы вы бользняхь гнилаго рода. Везды природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать я сть холода, предпринимать тьлодвиженіе неутомляющее ихь и проч. Канія должны быть ихь яства? Имь надобно всть понемногу за разь но часто, Для чего? Правила вы пользованіи выздоравливанія. Приміромь представляются Стверные и Полуденные народы. Что должно разумьть подь словомь выздоравливаніе? Знани, вы коихь познается, что больной вступиль вы выздоравливаніе.	ли-
О пользавании встающих или выздоравливании от лихоралонь. Первое стараніе при выздоравливаніи от лихоралонь. Природа часто вдыхаєть охоту нь нетвать в льнарствать приличнымь бользи. Вдохновеніе природы вы бользихь гнидаго рода. Везды природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать я сть холода, предпринимать тьлодвиженіе неутомляющее ихь и проч. Канія должны быть ихь яства? Имы надобно всть понемногу за разы но часто, Для чего? Правила вы пользованіи выздоравливанія. Примыромы представляются Сьверные и Полуденные народы. Что должно разумыть поды словомы выздоравливаніе? Знани, вы коихы познаєтя, что больной вступиль вы выздоравливаніе. Причины, по коимы люди вседневно сбманываются вы знанахы вы	79)
О положевании встающих или выздоравливания от лихоралов в. Первое стараніе при выздоравливанія от лихоралов в. Природа часто вдыхаєть охоту нь яствать в льнарствать приличныть бользин. Вдохновеніе природы въ бользиях гнилаго рода. Вездъ природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать в от холода, предпринимать тьлодвиженіе неутомляющее ихь и проч. Канія должны быть ихь яства? Имь надобно всть понемногу за разь но часто, Для чего? Правила въ пользованіи выздоравливанія. Примъромь представляются Свверные и Полуденные народы. Что должно разумьть подь словоть выздоравливаніе? Знаки, въ коихь познаєтья, что больной вступиль въ выздоравливаніе. Причины, по коимь люди вседневно сбманываются въ знанахь выздоравливанія.	79)
О пользавании встающих или выздоравливании от лихоралонь. Первое стараніе при выздоравливаніи от лихоралонь. Природа часто вдыхаєть охоту нь нетвать в льнарствать приличнымь бользи. Вдохновеніе природы вы бользихь гнидаго рода. Везды природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать я сть холода, предпринимать тьлодвиженіе неутомляющее ихь и проч. Канія должны быть ихь яства? Имы надобно всть понемногу за разы но часто, Для чего? Правила вы пользованіи выздоравливанія. Примыромы представляются Сьверные и Полуденные народы. Что должно разумыть поды словомы выздоравливаніе? Знани, вы коихы познаєтя, что больной вступиль вы выздоравливаніе. Причины, по коимы люди вседневно сбманываются вы знанахы вы	79)
О пользование встающих или выздоравливания от лихоралов в ледей от хорадовь. Первое стараніе при выздоравливанія от лихоралов в природа часто вдыхаєть охоту нь яствать и лихоралов в природа часто вдыхаєть охоту нь яствать и лихоралов в природа в в бользихь гнилаго рода. Вездь природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать я от холода, предпринимать тълодвиженіе неутомляющее ихь и проч. Канія должны быть ихь яства? Имъ надобно всть понемногу за разъ но часто, Для чего? Правила въ пользованіи выздоравливанія. Примъромь представляются Съверные и Полуденные народы. Что должно разумъть подь словомь выздоравливаніе? Знави, въ коихь познаєтся, что больной вступиль въ выздоравливаніе. Причины, по воимъ люди вседневно обманываются въ знанахъ вы злоравливанія. Настоящаго выздоровленія не бываєть, ежели еще не было перелюма.	79)
О пользовании встающих или выздоравливаний отв лихорадонь. Первое стараніе при выздоравливаній отв лихорадонь. Природа часто вдыхаєть охоту нь яствать в льнарствать приличным бользии. Вдохновеніе природы вь бользинх гнидаго рода. Вездь природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать я сть холода, предпринимать трлодвиженіе неутомляющее ихь и проч. Канія должны быть ихь яства? Имь надобно всть понемногу за разь но часто, Для чего? Правила вь пользованій выздоравливанія. Примъромь представляются Съверные и Полуденные народы. Что должно разумьть подь словомь выздоравливаніе? Знани, вь коихь познаєтя, что больной вступиль вь выздоравливаніе. Причины, по коимь люди вседневно обманываются вь знанахь вы злоравливанія. Настоящаго выздоровленія не бываєть, ежели еще не было перелюма. Что есть выздоровленіе посль бользни, льченнюй не прямо по льнарски	79)
О пользование встающих или выздоравливания от лихоралов в ледей от хорадовь. Первое стараніе при выздоравливанія от лихоралов в природа часто вдыхаєть охоту нь яствать и лихоралов в природа часто вдыхаєть охоту нь яствать и лихоралов в природа в в бользихь гнилаго рода. Вездь природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать я от холода, предпринимать тълодвиженіе неутомляющее ихь и проч. Канія должны быть ихь яства? Имъ надобно всть понемногу за разъ но часто, Для чего? Правила въ пользованіи выздоравливанія. Примъромь представляются Съверные и Полуденные народы. Что должно разумъть подь словомь выздоравливаніе? Знави, въ коихь познаєтся, что больной вступиль въ выздоравливаніе. Причины, по воимъ люди вседневно обманываются въ знанахъ вы злоравливанія. Настоящаго выздоровленія не бываєть, ежели еще не было перелюма.	79)
О пользовании встающих или выздоравливаний отв лихорадонь. Первое стараніе при выздоравливаній отв лихорадонь. Природа часто вдыхаєть охоту нь яствать в льнарствать приличным бользии. Вдохновеніе природы вь бользинх гнидаго рода. Вездь природа требуеть того, что ей нужно. Выздоравливающіе должны остерегать я сть холода, предпринимать трлодвиженіе неутомляющее ихь и проч. Канія должны быть ихь яства? Имь надобно всть понемногу за разь но часто, Для чего? Правила вь пользованій выздоравливанія. Примъромь представляются Съверные и Полуденные народы. Что должно разумьть подь словомь выздоравливаніе? Знани, вь коихь познаєтя, что больной вступиль вь выздоравливаніе. Причины, по коимь люди вседневно обманываются вь знанахь вы злоравливанія. Настоящаго выздоровленія не бываєть, ежели еще не было перелюма. Что есть выздоровленіе посль бользни, льченнюй не прямо по льнарски	79)

ГЛАВА 3

О перемежающихся лихорадкахъ.

	Participan
Разделение перемежающихся ликорадокъ.	- 84
Что разумъется чрезъ ежедневную ликорадку?	
Что такое перемежающаяся лихорадка?	
Что разумъется чрезъ тридневную?	8.5
— чрезъ четверодневную?	-
— трезъ двойную - тридневную?	-
— чрезъ двойную - четверодневную ?	-
— трезъ весеннія и осеннія лихорадки?	-
Свойство весенних в лихорадок в.	86
- осенних в лихорадок в	-
\$ 1.	
Причины перемежающихся лихорадокь.	-
§ 2.	
Признаки перемежающихся лихорадокь.	87
Признаив, извъщающій приступъ.	
Признакъ приступа.	-
Харантеристической или существенной признанъ.	_
Пище употребление для больных в лихорадкою.	88
Пищеупотребление во время приступа.	
Пишья должны бышь шеплыми.	-
Яства и питія между приступами.	_
Лауданамъ ликвидумъ предлагается какъ могущимъ умерить при-	
ступъ.	
Выгода от умъреннаго тълодвижения между приступами.	89
Сін лихорадни часто проходять безь лекарствь оть одного только	
пищеупотребления.	-
Когда надобно прибъгать иъ лъкаретвамъ?	90
	· ·
\$ 4.	
Пользование перемежающихся пихоралокь.	-
членъ 1.	
Образь пользованія для вэрослыхь.	_
В 2Добно измать со рвошныхЪ. Для чего? -	
Предпочишать надобно инекакуанту.	
Важность рвотных въ перемежающихся лихораднахъ.	91
Канимъ образомъ давать ее ?	-
Слабимельныя въ нихъ иногда бывають полезными.	92
Признани, поназывающие слабительныя во всёх в болезнях в.	-
	Они

	Cmpan
Они не стольно нужны, сколько рестиыл. Время, въ кое надобн	0
ихъ давать.	- 9
Образецъ такого лъкарства, пристойной въ сихъ случаяхъ.	
Кровопускание радко бываеть нужно вы перемежающихся ликорадкая	съ. 93
Для чего?	100
Его губительныя следствія въ сихъ ликораднахъ.	SAULT.
Brews Ph unwinder to the total to the total tota	И
накимъ образомъ?	- 94
- въ лихорадкъ ежедневной.	
— въ тридневной.	
— въ четверодневной и проч.	0.7
Сколько времени надобно принимать жину:	- 95
Потому что пользование всткъ сикъ видовъ ликоридокъ должно быт	
шзково же	Par Par
Хину надобно принимать по большому пріему, ежели желательно	
выдучиться	
Средство предупреждать возвраны.	
	- 96
Торькой настой, которой должно пить во время употребления жинь	
Многія туземныя растенія могли бы выльчивать перемежающілся ли-	to the same
Другой способъ предписывать кину.	97
Kanie over cia promovina	98
Канія суть сін растенія? — Три рода ихъ: способъ употребляти	1-86
	_
Большой нашшанникЪ; способЪ употреблять его.	99
Калинникъ; способъ употреблять его корку.	100
Ясень; способъ употреблять его корку.	-
Отваръ водиной и винной.	IOI
Терновникъ; способъ предписывать его корку.	_
Сін различныя норни надобно употребл ть тогда, когда не можно	h. tradi
имъщь хины; или она и есть, да щолько жуда.	102
что должно прибавить къ кинъ во время упорныхъ перемежающих-	
ел хихорадонЪ?	-
Ръдно надобно присоединять другія лъкарства къ жинъ.	
что надобно тогда дълать, когда жина слабить, или причинлеть	
понось ?	-
Вниманіе, наковое должно имёть въ осеннихъ лихораднахъ.	103
Бользии, въ нои перерам выплаченныя перемежающияся	
лихорадки.	
Смъшное людское мнъніе въ разсужденіи пользованія сихъ бользней.	
Единственный способь безопасно пользовать бользык.	104
Опасности от употребленія крвпких в напитков в в памереній выхв-	104
чить себя от перемежающихся лихорадокъ.	
Природа или нашура исцаляеть цалыя три четверии больчей.	
Что должно разуметь подъ словомъ больнь?	
Абкарства не иначе надобно предписывать, какъ по показанію	
Olimpian Chi Chi Chi	

)()(

CIH-

	cmpan-
виврашательные предметы, предлагаемые вмёсню лёкарсивав в	,
еихъ бользняхъ.	104
Хина ссть настоящее соб. твеннодъйствующее въ перемежающихся	
лихораднахт	
Предразсуждение простаго народа о жинъ.	
членъ п.	
Способь пользовать младенцевь страждущих перемежающи	RUCA
пихорадками.	106
Способь давать мину младенцамь.	
Лихораднопрогонящельная минетура, приличная младенцамъ.	-
Способъ давать соленую минстуру	107
пишье.	
— шраодвижение	
— воздухъ и яства.	-
Промывание изъ жины для взрослыхъ.	
— для младенцовъ.	
Аругія средства лічить младенцевь, больчых в перемежающимис	Я
лихорадками.	-
\$ 5.	
не надобно самаго себя линть вы перемеженощихся михо	
кихв, когда онъ непорядочны, или соединены св оплены	TO STRUCT
признак жи.	103
\$ 6.	
Средства предупреждать пер межающілся лихоредки.	109
Предохранительныя абкаротва от перемежающихся лихорадокъ.	
Безпреставное употребление техъ же ленарствъ не производитъ на	-
нанихъ дъйствій: и такъ надобно ихъ перемънять, ногда при	
нимаются вместо предохранительных в, да и въ продолжитель	
ныхъ бользилхъ.	IIG
\$ 7.	
Періодниескія т. е. въ извъстное время возвращ ющіяся бол	Бзни
кон тебують такого же пользованія, какого перемежены	STATE OF THE PARTY
	SEE FOR
ся лихорадки.	111
Винные или съ виномъ настои должны настриваться на холодъ.	1
Другія средства, ноими должны пользовать:я подсерженные перем	-
жак шимел лихерадиамъ.	-
ΓΛABA 4.	
	110
О лихоредко безперывной - острой.	112
Канія люди подвержены сей бользии?	• -
Что должно разумьть подъ словомъ дихорадки бевпрерывной-остро	
	ILY-

	Cm	ран.
Пусипое раздъление сей ликорадки. Въ накое годовое время она чаще бываетъ?		112
\$ 1.		
Принины лихорадки безпрерывной - острой.		
два шолько вида лихорадокъ острыхъ.		
§ 2.		
Приэнаки лихорадки безпрерывной сетрой.		114
Признани предшествующіе. — существенные. — опасные. — надобно давать помощь больному, канъ скоро окажемся бользнь.	TAR.	
vero?	1	
\$ 3.		7
Пище упо предление, котогое должно предписывать страж лихорадкою безпрерывною сстрою.	4 y u	116
Какія надобно исполнить поназанія въ сей бользин? Момротожидительныя питія поднисленныя. Номеранцовая сыворотна: способь приготовлять ее. Сл. бительной отварь. Всь питія должны быть ніснольно теплыми. Какі употреблть ихі: Для чего преднисываются многія танія же питія? Какія должны быть яства больнаго? Выгоды сті свіжаго возлуха; предосторожность, съ нановою на но его больному доставлять. Опасности оть кутінья. Влагорізуміе, съ нановымі надобно предписывать яства ві бользии. Каной тоть путеводитель, ноему надобно слідовать ві п писаніи ястві? Бланому корото время оть времени сидіть, или возвышать голо Способь прохлаждать номнату. — и роть больнаго.	сей	118
Биня или умовение рукъ и ногъ. Оботоятельства, кои показывають, что надобно прибавить ук въ сіи бини.	eyca -	120
Вольному надобно быть въ понов; чтобъ онъ не видълъ номи		-
Надобно, но только осторожно, поблажать внусу и желан	[MRI	=

- 000				
25.			۲.	
-30		64	9	a

5 4.
Авкарства, кон надобно предписые ть больный всякаго возра-
ст и ихоранкою безпрерывною - острою. 120
Важносить провопуснанія въ сей бользии.
Когда и сколько разъ надобно отворять кровь? 121
Ръдно случается, чтобъ потребно было болье трекъ провопусканій;
потому что не надобно пускать кровь дотоль, доколь погаснеть
лихорадна. Для чего?
Прохладительная минстура, ноторую должно предписывать, ногда
жэръ и лихорядна очень сильны 122
Пагубная мысль тъхъ, кои пущають кровь, чтобь изгнать больз-
нешворную влажность.
Что должно думать о ировопускания?
Что должно давать, ногда у больнаго есть поэмяв на расту? - 125
ВЪ чемЪ состоитъ трудъ Лъкаря при пользовании большей ч.епи ос-
трых Бользней
Бользни, въ коихъ нужно погашать лихорадку
Что должно давать, когда животь жестокь и заперть? - 124
День, въ которой бываетъ переломъ лихорадки: знаки хор шіе-
Худые 125
Время прикладывать нарывныя, т. е. шпанскія мухи
- горчицу съ пъстомъ.
— давать кръпительныхъ.
J 5.
Пользование выздоравливающихь отв лихорадки безпрерывной-ое.
трой.
Обстоятельства, поназывающія хину.
Время прочищ шь.
Пристойное явнарство въ семъ случав
Обынновенный сбразь, по ноему пользують, сопративоположенный
съ сбразомъ Г. Бухана.
Его правила суть правила Иппократовы 128
Способъ, по ноему следоваль Ошень Врачебной Науки въ острыхъ
до различных в степеней бользнахв
- въ бользияхъ до крайности острыхъ
ГЛАВА 5
О колотъв въ бокахъ настоящемъ и о ненастоящемъ, и о воспа-
ленін г, удобрющной перегородки называющейся діафрагмою. 129
S I.
о настоящемь колоть вы бокахы или о воспалении внутренней
грудной оболочки.
Опредъление настоящаго колотья.
Когда непорядочной ходъ нашуры возвъщаль опасность.
O6bi-

Cr	прано
Обынновенной иопецъ острыкъ бользией.	129
Признаки, по кош рамъ онъ давалъ рвотное, и въ кош рое время	
бользни даваль оное.	_
Онъ не во вебхъ острыхъ бользияхъ давалъ слабительное. Для	
vero:	-
Какъ оно раздъляется?	130
ВЪ какикъ бользилкъ прочищаль онъ и въ накое время ?	
Исключение на сіе всеобще правило.	-
Патубныя савдешвія невъденія Иппонратовых в правиль.	_
Кто наиначе подверженъ колотью?	151
Всв части твла покрыты оболочками. Имена ихъ.	-
Пері стеумъ или онолокостная оболочка.	-
Въ накомъ возрасть?	152
Кто от него освебождень?	
Возр сты онаго.	
Вь которое годовое время оно пристаеть?	-
The state of the s	
членъ і.	
Причины настоящаго колотья.	
uphinate ademonação as no nomen.	
членъ 11.	
Приэн ки настоящаго колотья,	
что въ простомъ кародъ называется: какъ шиломъ колемъ? -	_
Свойство крови въ колотъб.	-
членъ ії.	
Какое пищеупотребление илдобно предписывать страждущи.	мъ
оть настоящего колопья.	
Какимъ способомъ натура силител избыть спо бользнь?	154
Каніе должны мы употреблять?	
Чего должень избъгать больной?	156
Какое должно бышь его пишье?	-
Способъ готовить ячной отваръ.	
Пишья должны принимлемы бышь всегда въ моломъ количествъ	
за разъ и ибсколько шенлыми.	
	156
за разъ и нъсколько шенкыми	156
за разъ и нъсколько шенкыми. Повседневное умовение рукъ и ногъ. Ч Л Е Н Ъ 1V.	
за разъ и нъсколько шенкыми	
за разъ и нъсколько шенкыми. Повседневное умовение рукъ и ногъ. Ч Л Е Н Ъ 1V.	
за разв и нъсколько теплыми. Повседневное умовение рукв и ногъ. Ч Л Е Н В IV. Лъклоства противъ настоящаго колотья для всякихъ возрастовъ.	
за разв и нъсколько шеплыми. Повседневное умовение рукв и ногъ. Ч Л Е Н В IV. Лъкаоства противь настоящаго колотья для всяких возрастовъ. Нужла въ кровопускания.	
за разв и нъсколько теплыми. Повседневное умовение рукъ и ногъ. Ч Л Е Н В IV. Лъклоства противъ настоящаго колотья для всякихъ воэрастовъ. Нужла въ провопуснани. Перзое провопуснание должно быть обильно.	
за разв и нъсколько теплыми. Повседневное умовение рукъ и ногъ. Ч Л Е Н В IV. Авклества противь настоящаго колотья для всяких возрастовь. Нужла въ провопуснани. Перзое провопуснание должно быть обильно. Когда и сполько разъ надобно его повт рить:	

	Сшьзи.
Канимъ образомъ надобно поступать въ минуту перелома?	147
Минуша прочищать.	-
§ 2.	
0 колоть в ненастоящемы или ложномы.	-
Знаки или свойство сего вида	-
Кщо оному подвержень?	148
членъ 1.	
Признаки ненастоящиго колотья.	_
Какъ оно авуштея?	
Нужныя явнаренья, когда оно упорно.	
\$ 3.	
О воспаленін грудобующной перегородин, называющейся ді	
MOIO.	149
Сходешво, находящееся между сею бользнію и нолошьемъ.	
членъ п.	
Пользование сей бользии.	
Что наипаче надобно предотвращать въ сей бользни? -	- 150
Ну ида въ мягчительныхъ промывані хъ	
ГЛАВА 6.	
О разаниных видах воспаленія легких, называємаго	y
Врачей периписьтонісю.	-
§ 1.	
О настоящемь воспелении легкихь.	
Рав находится гавало сей больни?	
Кто наимаче сной подвержень? -	- 15I
Канъ она риздължением ?	
членъ і.	
Причины настоящ го выспиленія легкихь.	
Причины суть ит же, кои бывають въ колоть Когда называется она плевропериниевмониею?	
членъ п.	
Призники настоящиго выпиления легкихв.	152
ВЪ чемъ различествують от признаковъ колотья?	
Harris and A E H B 111.	
Пользование воспаления легких для всакаго возраста. Пользование есть то же, наное вы ноложья.	_
Аства должны бышь слабыя.	
	Важ-

Стран
Важность -сыворотки, ачнаго отвара, или настоя феникула еъ мо-
Паръ отъ теплой воды, впускаемый въ груди
Его дъйствія
слабляющь больнаго.
Канъ и ногда надобно отворять ировь?
Опасности от кровопусканія, когда больной жаркает удобно — Для чего?
Слабительныя и промыванія.
Савденый отъ остановии хариопинъ, имъющей произойти отъ
кровопусканія.
Есть много воспаденій легкихЪ, коихЪ надобно льчить безЪ крово-
Примъръ.
Средсява производить мокротохарканіе 5 - 155
Воспаление легкимъ, неуступающее лъкарствамъ, оканчивается абсцес-
Разные способы, по коммъ сей нарывъ моженъ выльчиться.
Знаки, извъщающие опасность, чтобъ сія бользнь не кончилась
чахопкою.
\$ 2.
О ненастоящемь или пожномь воспаленін пегкихь. 158
Свойство сего воспаленія легких .
Кто оному подверженъ:
чиень і.
Признаки ложнаго воспаленія легкногь. —
членъ п.
Пищеупетребление, каковсе надобно предписывать въ ложномъ воспалении легкихъ.
Какія должны быть яства?
Mamie?
членъ и.
Авкарства, кон надобно предписывать вы ложномы воспалении
nceknxb.
Когда надобно пуснать провь и прочищать.
Важность нарывныхъ, принладываемыхъ заблаговременно.
Кровопускание ръдко бываетъ нужнымъ въ сей бользии Ипекануанга чаще въ оной поназуется, такъ какъ славительныя п
премыванія.
LAY-

TAABA 7.

Оразаниных видах иахотки и о измождении или истощании. 160

S I.

О чахоткъ, собственно	такъ наз	ываемой.		_
Свойство чахотки; бользни, коихъ она е	сть сабдо	твіемЪ.		_
Сколько сія бользнь смершоносна,				-
Кто ей наиболъе подверженъ? -				IÓE
Чакошка обыкновениве въ Англіи, нежели	гдв пну	ды. -	1	-
членъ	I.			
Причины чах	comku:			-
Вст производящія воспаленіе легнихЪ.				
Бользни могущія причинить чахотку.	1			162
Особенныя причины.			-	
Воздукъ запершой, или нездоровой.				_
Сильныя страсти, скорби души.				_
Всякое непомърное выпоражнивание.				
Для чего употребляющие въ дъло мъдь	кудожники	и полвержени	T 45-	
хоткъ:				_
Остановка обыкновеннаго испражненія.				163
Случан, произшедшие от витшинх при	чинъ. При	мъръ.		
Остановка испарины.				_
Всякія излишества				_
Зараза				_
Нъкоторыя рукодълія и нъкоторыя должі	носши.			164
Холодъ и влажность.				
Яства соленыя и разгорячающія.				
Наслъдсшвенная порча.			-	_
членъ	II.			
77				
Приэнаки цах	omku.			-
Признаки начинающейся чахошки.				
- утвердившейся чакотии.				165
- жоельдияго сшепени чахошки.				
членъ	III.			
Поведение и пищеупотребление, которо	an anama	13 445 -10 × 41	me 4/12	
		t nauxnaai	ies was	
ные люді				166
Перемъна воздужа.	-	:	:	_
Тблодвижение, предпочтительно же верхог	12я Бэдг.	Для чего.		_
Правило, номорое должно наблюдамь въ	разсуждені	и верховой 1	зды.	_
)()()(ER

Ея важность и ел дъйствія, ногда она благовременна, ж. с. зара-	
нъс начинается,	166
Верховую взду вообще присовътывають очень поздо.	167
Холодность больных в но всему тому, что не называють ленар-	
ствомъ	-
Верховая бада собственнодъйствующее противъ чакотии, ежели	
она принимается вначаят и продолжается чрезъ немалое время.	
Время бользии, въ которое оно болье непригодно бываетъ.	0 -
Знаки, изъ которыхъ познается, что верховая взда полезна.	-
Часы дня, въ кои надобно садишься на лошадь.	-
Сухопушныя странствованія	168
Морскія путешествія полезны даже и тогда, когда чахотка дошла	
до последняго своего степени.	
Нужные запасы для чахошки въ морскихъ пущеществахъ.	-
Годовыя времена, въ нои они должны предпринимаемы бышь и нъ	
накимъ климанамъ.	169
Каная должна бышь дівша больнаго?	
Различные виды молока; молоко ослицы; сіе молоко должно состав-	
лять большую часть пищи больнаго.	170
Для чего оно редно производить те действія, ноихъ надлежало	
бы ожидать?	
Въ какую пору бользни надобно его предписывать?	
Сноль тепло и въ какомъ количествъ молоко ослицы должно быть	
предпринимаемо?	
Что должно дълать, когда оно слабить? -	171
Не надобно его пишь ни шеплымЪ, ни на постеля.	
Женское молоко.	1000
Примъръ превосходнаге дъйствія сего молока.	
	172
Подонки послѣ пахтанья молока. По накому прієму надобно ихъ употреблять? Больному надобно одни-	
ми ими питаться.	
Коровье молоко; средства двлать его легкимъ.	
Смъшныя предразсуждения о образъ, по коему надобно употреб-	
лять молоно женщины.	
Въ накую пору дня надобно сосать кормилицу?	779
Для чего молоко не всегда нравишся въ началъ его употребления?	***
Предосторожности, нановыя надобно предпринимать въ началъ упо-	
требленія молока	1
молоку надобно быть, сколько возможно, главною пищею больнаго.	
Remba.	
не надобно нипятить молока, ни пънить меда.	
надобно обращать внимание на пищу живопнаго дающаго молоко.	174
Ann vero?	314
Растенія, коими должень питаться скоть, имъющій доставлять	
молоко чахоткымъ.	10 100
Сіл расшенія находящся повсюду.	200
Каное пищеупотребление единственно употребльть надобно во время	
начинающейся чахошии.	175
	При-

	-	Стран.
Примъръ.		175
Пищеунотребление, когда силы и бодрость больнаго упали.	-	_
Ясшва и пишія должны принимаемы быть въ маломъ количе	emai	3
эа разъ.		
Для чего ?	1	
Выгоды ошъ веселости, музыки и проч. въ чакотит.		
- от употребленія устерсовь.	,	
членъ іу.		
Month of the way was to be a second for the second of the	313	7
Пользование, коему надобно последовать больнымь вы раз	RHH	ныхь
степеняхь чахотки.		-
Съ каною осторожностію надобно предписывать кровопусканіе	8%	
чакошкъ.		173
Аммонізческое молоко.		178
Болеутолительная минстура.		120
Опасности от лекарствъ масляныхъ и бальзамическихъ.		
Единственныя явкарства, кои должно давать противъ жест	OKO.	7597
сти камия.	a a	
Выгоды от кислых в растений.		
Настой съ горькими травами.		179
Пишье въ то время, ногда больной харкаетъ кровью.		1,19
Выгоды от роговой консервы, принамаемой по большому ко	WW-	
честву.	Au-	***
Хина.		180
СпособЪ принимать ее.		
Электурій изъ кины, ноторой надобно давать больному, ногда	XII.	
на въ порошит слабитъ.	2617	181
Способъ употреблять сей элентурій.		101
Настой хины въ холодной водъ, ногда больной не можеть о	HON	
принимать въ самомъ ед веществъ, т. е. въ порошиъ.	-	
Способъ дълать и пить сей настой.		182
Хина тогда бываеть противна, когда есть признаки воспакентя.		102
Даже и тогда, когда сложение больнаго расположено къ симъ п	nu-	
SHAKAM D.	Pm-	
Польза от Бонских водъ.		
Отвержение себя и теривливость со стороны больнаго.		70.
Обходительность со стороны Ленаря.		185
Нарывное и прижигание.	7	
Выгоды от сихъ двухъ лекарствъ.		
Что показываеть, что есть вы легких збенессь или нарывь?		
которои называется вомика.		
Что надобно тогда двлать, когда будеть извёстно, что въ	PHE	-
кихь есль нарывь :		*0-
Признаки нарыва или вомнии.		184
Случай, иногда происходящій при прорыва вомики.		105
Предосторожности, потребныя въ семъ случать.	1	185
)()()(2		Зна-
		AJ TETE

Cm	pan.
Внаин, которые дають ибноторую надежду къ выздоровлению	185
Пищеупотребление и абнарства, кои надобно больному предписывать,	
ногда онъ приближается нъ выздоровлению.	_
Что надобно дълать, когда вомина льется по впадинъ груди? -	-
ЧрезЪ скольно времени должно продолжаться пищеупотребление? -	-
Погръщ пости въ разсуждени сего чинимыя	-
Примъръ.	186
§ 2.	

О симптоматической чахоткв, т. е. о такой чахоткв, кото	pan
произошла отв доугой бользии.	187
ВЪ семЪ видъ чахотки надобно начать лъченіемъ той бользни, ко-	
торая произвела чахотиу.	-
что надобно тогда дълать, когда сія чахотка произошла отъ не-	
помърныхъ выпоражниваній?	
Совъщь машерямь, ношорыя впадающь въ сію бользив отв слиш-	
комЪ долговременнаго кормленія.	
Чахотка развъ весьма ръдно причиняется молококормленіемь Болъзни, на нои молококормленіе есть лънарство	188
Природа ниногда не предписываеть закона, которато бы не можно	
6MAO HCHOAHAMB.	
THE BUILDING	
\$ 3.	
Объ Аглинской нахоткъ.	189
Свойство сей болбони.	
Кто оной подверженъ:	
Польээванів сей больэни.	-
Пищеупотребление	
Атнарства: жина, стародубна, ромашка и проч.	
Купоросной элисниръ.	190
Стальное или желбзное вино.	-
Споссбъ его дълать.	_
Ero ynompedasms.	-
Важность увеселеній, верковой боды, путешествій и проч.	_
_ строжайшей воздержности.	
Первое аткарство въ какой нибудь болтони есть то, чтобъ избъ	
гать производящей оную причины.	191
y 4.	
Средства предохранять себя отв различных видовь чахотки.	-
Предохранительными средствами отъ сей бользии суть пълодви-	
женіе, хорошій воздукъ и презвость.	100

ГЛАВА 8.

О лихорадках выутренних или нервышхв.	192
Для чего сін лихорадки етоль ныих обыкновенны, и кто наипаче оным'ь подвержен'ь?	=
S I.	
Пришины лихорадоко внутреннихо нервныхо.	_
Удручающія страсти, труды духа, жудыя яства. « Воздухъ сырой и нездоровой	195
Непомърныя выпоражниванія.	-
Остановка испарины.	-
Непорядочность въ пищеупотребления.	-
Распупность съ женщинами, рукоблудіе.	
\$ 2.	
Признаки лихорадокь внутреннихь первныхь.	194
иризнаки жихорадоко опущерениями трениями	
Признаки предшествующіе.	
— существенные. — избавляющие благополучной переломъ.	A
— неблагополучные. • • • •	
\$ 3.	
Пищеупотребление, которое надобно предписывать твыв,	kon
страждуть лихорадками внутренними-нервными.	195
	a
Больнаго надобно держать на свъжемъ воздухъ и въ поков. Дл	
Надобно поддерживать и ласкать его надеждою выздоровленія.	-
Діята должна быть питательная и иръпительная.	_
Numie-	-
Важность вина въ сей бользии.	- 196
НэЪ винъ надобно предпочитать старое Бордосское вино,	
Не надобно слишкомъ разгорячать больнаго.	
\$ 4.	
Авкарства, кон надобно предписывать въ лихорадкахъ вн	утрен-
инжь - нервишжь.	197
Ипенануанга; когда надобно ее повторять.	-
Важность рвотных въ сей бользии.	
Слабинельное для птехъ, кои не похотять принять рвошнаго.	-
Способь оное двлашь.	9-
Сопрошивоположение пользования воспалительных лихорадов (гор	чекЪ)
)()()(s	,

	Стран
чекъ) съ пользованиемъ, которое пригодно къ ликорадкъ внуп	
ренной - нервной.	. 19
Кровопускание совершенно противно въ сей бользии, котя она и	24
жешся его поиззующею по накоторому виду.	4-15-
Новое доиззательство того, сисльно - то надобно быть осторожн	У
въ разсуждении карантеристическихъ признановъ бользней. Нарывныя въ ней нужны.	-
Гдв ихв прикладывать?	19
Ошибни шрхъ, въ нои ввергаеть нерадение о семъ правиль.	
Наблюдение.	-
Надобно содержать выпоражнивание от нарывных в пона больно	
будеть вит опасности.	206
Выгоды от нарывных въ сей болозни.	20.
ВЪ накое время больни надобно ихъ принладывать?	
Способъ, по коему дъйствують нарывныя.	
Что надобно дълать, ногда у больнаго запоръ?	201
— когда слабъ очень низомъ.	
Забобоны простонародія на щеть нарывныхь.	_
Когда случается на чечевицу похожая сыпь?	202
Лвигрешва кромъ нарывных и кръпительных в.	7 3 3 3 3 3
Болюсь или кашышекь, когда больной очень слабь.	-
Что должно дълать, когда у больнаго инота и проч. мускуст	205
Мускусъ, смъшиваемый съ канфарою и лешучею солью оленьято	1
Порошокъ въ томъ же случат.	
Когда лихорадна дълается перемежающеюся, то кина въ веществъ.	-
ВЪ изетов.	204
Во скольникъ видакъ ликорадонъ можно предписывать кину?	
Другой способь употреблять жину.	
The state of the s	No. 1 of A
ГЛАВА 9.	
О лихораявь элой, гнилой, пурпуровой или петехіальной.	205
Сія лихорадка можетъ названа быть лихорадкою язвительною Евро-	
пейскою. Для чего?	THE
Что должно разумать чрезъ лижорадку злую ?	
Кию наиболье оной подвержень? -	206
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
\$ I.	
Причины лихорадки элой, гнилой, пурпуровой или петехіальной	
Нездоровой воздухъ, отъ коего она обыкновенно бываетъ въ тюрь-	
махъ, гофшпишаляхъ, больницахъ и проч. Для чего даешся сіе наименованіе лихорадкъ гнилой, пурпуровой или	
петехівльной?	
Вещества живопныя, долгое время сберегаемыя?	207
	207 При-

	.mbsn.
Примъръ.	207
Испорченной жаббъ : стоячія воды.	208
Гніючіе трупы.	_
Heyu moma.	-
Спрасти души.	_
Главное мосто лиморадни гнилой находится въ нервакъ.	209
32pa32. 1000 - 1	
§ 2.	
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	A STONE S
Признаки лихорадки элой, гнилой, пурпуровой или петехіально	й. —
Признаки предшествующіе.	-
Одни токмо могущіє больному быть полезными должны из оному	L PRESS
приближаться.	-
Признани харантеристические или существенные.	-
что отличеть замя вихорадки от тъхъ, нои суть совершенно воспа	· Company
лишельныя?	211
- от в лихоридокъ внутреннихъ или нервныхъ.	-
Иногда сте различе весьма трудно сделать.	
Какъ надобно поступать въ семъ случав?	
Лихорадии воспалительныя и нервныя могуть превратиться въ злы	Я- —
Трудно назначить, сколько времени продолжаются лихорадки элыя-	212
Щастивые признаки.	-
ИхЪ продолжение относительно и возрасту.	247-1
	E TOP
Онъ не столь долговременны у стариновъ.	400
Долговременные, но не столь опасны у молодых в людей.	0.7.
Опасные признаки.	215
Смершельные признаки.	214
\$ 3.	
Пищеупотребление, каковое надобно предписывать больнымь,	стра-
ждущимь лихорадкою элою, гинлою, пурпуровою или пет	
хіальною.	
weight to to	
нам врение, ноторое должно имъть въ пользования сей бользии.	San Steel
Надобно больному сперва лоставить воздухъ чистой и свъжи,	-
Окроплашь комнашу, и кровать и проч. кислыми сонами.	215
Или двлать изв нихв парв.	
Давашь ихъ нюхашь больному.	_
Выгоды от сих паровъ.	
Польза от очень пахучих растеній.	
Больному надобно быть на свободъ и въ нокоз.	216
Нишья и детва должны быть подкисляемы. • • • • •	
Пишье, ногда больной очень обезсильть и имбеть понось.	-
— ногда у него запоръ.	
Настой съ ромашновыми цвътами поднисленной.	S To
Кавіл должны бышь ясшва :	Hy-

Стран.
Нужно почасту больному давать питье и яства.
что надобно дълать, когда у него бредъ?
Припарки изъ ромашковыхъ цаттовъ или хины; выгоды отъ нихъ
въ семъ случат.
\$ 4.
Авкарства, кон надобно предписывать въ лихорадкъ элой, гни.
лой, пурпуровой или петехіальной. 218
Рвошчыя визчаль; променвания и слабительныя — Нарывныя должны принладываемы быть въ одной тольно послъдней
крайносши.
Признани, которые показывають нарывныя.
чего надобно бояться от нарывных ?
ИзЪятіе на сіе правило.
Предосторожности, съ наковыми надобно давать нарывное 220
Ложное мибије о силв крвпительных в и алексифармаческих в лб-
каретвъ.
Изъ нихъ лучше всъхъ доброе вино.
Что должно думать о семъ илассъ лъкарствъ?
Сколько - то важна хина въ сей бользни? 221
Способъ ее предписывать.
Когда у больнаго нарочитой поносъ.
Польза от в инслых веществ в в сем случав
— когда оказывается нарывъ въ заушныхъ жельзахъ: — —
Авнарства, кои надобно предписывать для удобнейшаго излечения
вередовь, причиненных сею бользыю.
\$ 5.
Средство предупреждать и предохранять себя отв лохорадки
элой, гнилой, пурпуровой или петехіальной. —
Предохранительное пищеупотребление от лихорадии злой
Сколь нужно избътать заразы.
Канимъ образомъ надобно поступать, чтобъ больной не со-
общаль ее?
Что должиы дълать ть, нои боятся заразы:
Кровопусканія и слабительныя опасны въ семъ случать 225 Ложное митніе о предохранительныхъ.
Montage author o machowhammenhammen
TAABA 10.
о лихораявь съ мьлкою сыпью, или высыпной, у Врачей назы.
вающеюся чечевниеподобною.
Откуда сія янжорадна получила имя чечевицеподобной ?
Ято должно разуметь чрезь сей видь ленарешвь?

77000

- 4-21

	Спран.
Вемли, въ конхъ она чаще примечается.	- 226
Какого цайта пупырышки?	. 223
На которой части твла они высыпають? -	
Сія бользнь бываешь иногла существенною, но чаще симишомап	14-
чесною.	
Кшо болбе оней подверженъ ?	
Она обыкновенные бываешь у женщинь, а особливо послы родовы.	
\$ I.	
Прицины лихорадки высыпной цецевицеподобной.	-
Причины сей бользни у родильницъ.	. 228
6 2.	
Приэнаки лихорадки чечевицеподобной.	
Признаки предшествующіе.	- 229
существенные будущей высыпи.	
— у родильницъ.	
Признаки высыпи.	
Въ накое время бользни сыпь является и пропадаеть?	- 230
Признаки опасные.	
Знаки чечевицеподобных в прыщаков в у родильниць.	
\$ 3.	
Пище у потребление, которое надобно предписывать стражд	Joenna vol
лихорадкою высыпною исчевниеподобною.	ущимы
Цель, которую надобно предлагащь себь при пользовании всехь и сыпных в лихорадокъ.	bl-
Не надобно больнаго держать въ излишнемъ теплъ.	
Яства.	-
Пишье, ногда больной не обезсильть.	- 251
когда обезсильть	• -
— когда бользнь походишь на ликорадку гнилую.	• -
Что поиззуеть мягчительныя промыванія?	
The state of the s	- 252
S 4.	
Alkanomes has a refer	
Авкаретва, кон навобно предписывать больным в лихора,	akolo
иеиевицеподобною.	
Они мало нужны бывающь, когда пищеупотребление хороно.	
Важность въ умбренномъ пвщеупотребления въ сей бользни, до	ка-
занная опышомъ.	_
Обстоятельства, кои поназують крыпишельных и нарывныя.	- 255
Способь даващь вино; хину съ виномъ и кислыми веществами.	
наравия.	-
Кровопусканіе обыкновенно прошивно въ сей бользии, и даже	Po-
дильницамъ.	
Больные съ трудностію выносять выпоражниваніе. Для чего:	- 256
)(()()(Пред

Cr	пран
Предосторожности, коихъ требуетъ сія бользив при пользованій во-	
дильниць.	235
тто надобно двязть, когда бользны долго длится? Когда надобно прочищать?	_
	-
J. 5.	
Средства предохранять себя отъ лихорадки ченсвицеподобной.	_
Способь, какъ должны поступать беременныя женщины для избъ-	
Примъчание на средства предупреждать оную у родильницъ.	255
Погрѣшности, чинимыя при кожденій за родильницами, происко- дять оть ложнаго понятія о родажь.	
Важность содержанія поднавниць въ умъренной и прокладительной	236
	-
TAABA 11.	
О лихоралко отступной.	237
Почему названа сія лихорадною ошетупною.	-
Свойсніва отступной мижорадни.	-
§ 1.	
Причины лихорадки отступной.	238
мъста въ коихъ она часто бываетъ	750
Кто наипаче подверженъ ликорадиъ опетупной.	
\$ 2.	
T 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
Признаки лихорадки отступной.	-
Не возможно описать встав признаковъ по причинъ мрайняго ихъ различия-	239
Сія лихорадна часто оназывается подъ видомъ лихорадонъ желу-	
ныхъ, нервных о и злыхъ	-
А особливо, когда она непорядочна.	-
Отступная лихорадка порядочная подобна перемежающимся	-
one he ometine year at mograposited onactive.	
\$ 3.	
Пищсупотребление, коему надобно следовать вы лихораль	1-12
отступной.	
©но должно быть относительно къ припаднамъ	240
Во всъхъ случаяхъ надобно больнаго держать чисто, понойно, на	
свъжемъ воздужъ	241
Причины, для которых повторяющся толь часто ть же совыты-	_
	E .

Авкарства; кон должных принимать больные лихорадков	,
отступною.	241
Средешва двлать ходь сей лихорадии порядочнымъ.	
Кровопускание, только бы оно было дъльно показано.	_
Рвопное въ ней гораздо нужнъе.	_
Ипенакуанга- Рвошное пишье-	242
Промыванія и легкія слабительныя.	-
Разсуждение о рвотныхъ.	-
Причины, для которых в употреблять его тольке св ипекакуангою.	-
Ипенануанга безопасные.	-
Способъ употреблянь рвотное, когда обстоятельства его пребують	
Хина, ногда лихорадиа сдъявлась порядочною перемежающеюся.	
	243
\$ 5.	
Средства предохранять себя оть лихорадки отступной.	-
Предохранительныя средства.	
Хина въ шъхъ странахъ, гдъ сіл лихорадна повальна.	
Табанъ въ шаномъ же случат.	
TAABA 12.	
S 1.	
063 ocn b.	
	-
ТИ 2 ЛО ПАКИЖЪ ЛЮДЕЙ, которые бы оной не имъли.	244
Въ изное годовое время она чаще; ито оной наиболъе подверженъ? - Она раздъляется на раздъльную и сливную.	_
Что должно разумъть подъ сими словами?	-
Сін различіл суть тольно степени той же бользин.	-
Другое раздъление осны.	-
	246
ЧЛЕНЪ І.	
Принины оспы.	
Зараза есть обыжновенивищая причина осны-	
	-
членъ п.	
Приэнаки оспы.	
Признами предшествующие.	246
- будущей высыпи	245
Время, въ которое жемчужины начинають являться.	
arepane uxb shaku	
Что дългеть признаки благопрівтными:	242
Жодъ высыпи осны въ добру. Знаки жемчучинъ къ добру.	_
	-
)()()()(2	Зна-

	Cmpan
В наки опасные и нежаетные.	- 24
Худой знакъ, когда ихъ много на жидъ	
Лихорадна не покидаеть посла высыпи осны сливной и худаго свойст	пва. —
Опасивише признаки.	- 24
членъ ш.	
Пище употребление, кое надобно предписывать больным в оспоч	0. 249
Пагубной поступовъ людей въ первыхъ дняхъ оспы	_
Корчи у дъщей сущь признаки нещастливые.	
Что надобно дълать во время бывающей передъ высынью лихорада	ни? —
Сколько бы ни была благосклонна оспа, полько не надобно ее оспа	B-
лять прихотямъ больнаго.	- 250
Нещастія, от сего посавдующія.	
Опасности от оставления больнаго на постеля, от давания е	му
криштельныхъ	. 251
Дъйствія кръпительных в потогонительных в.	
Болтэни, въ ноихъ потогонительныя полезны.	
А въ прочихъ они опасны	
Для чего толь безразборчиво дають ихь въ оспъ? -	
Болбани, ими причиняемыя.	-
Заблуждение, на коемъ основывается разсуждение простонародия	,
относительно кЪ горячительнымЪ вЪ оспъ.	- 252
Одни олучан, въ ноихъ потъ полезень въ бользнахъ острыхъ.	
Кормилицамъ не надобно ложиться съ дътьми, кои въ оспъ.	-
Примерь бедетый от того происходищихь.	
Не надобно того терпъть, чтобъ многія дъти вмъющія оспу	
лежали выбешт	_
Нещастіе, от того происходящія.	25%
У больных в осною надобно часто переменять былье	• -
AM vero?	_
Скольно нечистота вредна въ оспъ.	254
Выгоды от повседневной перемъны бълья у больнаго.	-
Предразсудонъ простаго народа о горячительномъ содержания	
Примеры мого, что можно безопасно выставить на вольной воздух	ъ
больных в осною.	
Не надобно ихъ выносить или выводить на публичным гульбищ	2.
Для чего.	- 255
Канія должны бышь яства въ оспъ?	
Каное должно бышь пишье?	
членъ 1у.	
Авкарства, кон надобно предписывать больнымъ осною.	-
Надобно различать четыре времени въ осиб.	
Пользование перваго времени или времени лихорадки, бы	161
ющей передв высыпью	256
Что должно предписывать дъщьмъ въ семъ первомъ времени? -	-
Признаки, кои у взрослыхъ поназующь кровопускание.	/_
	/ 10

	тран.
Выгоды от промываній в в сем первом період в осны.	256
Польза от в провопуснанія, когда оно дельно показуется: обстоя-	
тельства, въ ноихъ надобно его повторящь.	257
Что надобно дъл ть, ногда есть позывъ на рвоту? -	
Какъ надобно помогать нагноснію, когда прыщи или жемчужины	
начинають появляться.	
Обсто, тельства, нои поназывають крвпительныя.	
Не надобно слишкомъ разгорачать больнаго.	258
Пользованія втораго времени или времени высыпи.	
Случан, въ ноихъ прохладительное содержание себя необходимо нужно-	-
Случан, нои показують болеутолительныя.	-
Для взрослыхъ,	-
Сь нанимъ благоразуміемъ должны они предписываемы быть въ оспа	. —
Что должно двлать въ случав остановни мочи.	259
Важность въ обильномъ течени урины во время осны.	_
Полосканье для очищенія риз и горла	-
Ежели въ живот запоръ, то надобно употребить магчительныя	
промыванія.	-
Безпорядки от болеу толительных в когда они даются не истан	и. —
Что должно дълать, ногда подвятся петехіи?	260
Подкисленная жина.	
ПріемЪ для младенца.	
- для взрослаго	_
Благополучныя следенный сего менарешва, ногда оно основащельно по-	
казано и дано по пристойному пріему.	_
Пишья и яешья, кои должны быть съ хиною.	261
Хина равно нужна въ оси в кристалловидной ?	-
Выгоды от в жины, когда жемчу кины остли и проч	-
Внезапное осъдание жемчужинъ ввергаеть въ велиную опасность	
больнаго.	
Ощъ чего сте наиначе происжодищъ?	262
Сіе состояніе не надобно ємъшивать съ сокрытіємъ осны чрезъ раз-	
pemenie.	_
что служить къ различение сихъ двухъ состояний?	-
Оспа, оканчивающаяся разрышениемь, не есть летучая оспа-	-
Внани сей послъдней бользни-	-
Признаки летучей оспы или осплики	-
Знаки прыщей.	-
Что должно двлать въ освдании или сокрытии прыщей.	263
Остающиеся по спадени прыщей следы	-
Пользование.	_
Кровопусканіе въ семъ случов можеть быть весьма полезнымъ.	264
Надобно всегда прикладывамь ив ногамь кашап паэмы, -	-
Предосторожности, коихъ требуетъ приназдывание нарывныхъ въ	
семь случать.	
Каніе признаки нужны и дъльному поназа і о оныхъ ?	
что надлежить предпочитать, когда ихъ нать: -	
)()()()(3	loab-

Cn	пран.
На Варварских в берегах в во многих в мъстах в Азін и Европы	275
Способ прививать оспу ве ьма пристойной и весьма благополучной,	
произшедшій от в крайняго обстоятельства.	-
- прививать оспу въ Англін	276
- прививать безъ настчин.	-
Для чего предлагается сей последній способь?	277
Его выгоды предъ производимыми посредствомъ настчекъ, кои мо-	
гуть имъть неприятныя слъдствия.	
Оснопрививание разат тогда тольно сдълается всеобщимъ, ногда про-	
изводимо будеть отцами и матерями.	-
Духовнымъ людямъ подсбаеть побуждать простой народъ къ осно-	
прививанию.	
Прим'тры шому.	Sec.
Сколько нужно опидамъ и этаптерямъ прививать оспу къ своимъ	
дъщимъ въ малольненвъ.	
членъ ц.	
Важных выгодых, ощутительно происходящія отв оспо-	
привы анія.	
	279
Описносити, кои сопровождають приставшую оть заразы осну, и нож	
предупреждаеть оснопрививание.	
Такъ на примъръ слуги и невольники.	280
Авкари, Хирурги, молодыя женщины.	200
Беременная женщина, нормящая своими грудьми и самой мил-	Sept mil
денецъ.	
Машь, коел младенець болень эспою.	Siles,
Примъръ	
Канъ осна есть новальная бользив, то надлежить только сдълать	
ее сколько возможно благошворною.	281
Сей выгоды можно ожидать полько от оспопрививания.	-01
Сношение умерших в отв натуральной осны и прививной.	
Возражение противъ оспопрививания.	28-2
Омерть.	202
ИзЪ тъхъ, коимъ привина осна, не умираетъ и одного изъ ты-	
CYAN	
ЧЛЕНЪ III.	
Wikin enercomen narohna vnomen hum.	
Какія средства надобно употребить для содыланія оспопри	H
ванія всеобщимь:	-
Надобно сперва предписать духовнымЪ, чтобъ они внушали просто-	
му народу оспонрививание какъ дъло благое.	
По томъ надобно самимъ Лъкарамъ прививати оспу даромъ къ дъ-	28 %
шямъ бъдныхъ людей.	
	K.B.

	Епран.
КЪ мому, имо бы никогда не имъль осны, не пристинен	пъ она
и от оспопрививанія.	- 285
это должно двлать правительство, чтобъ побудить на	родъ къ
оспопрививанию?	- 284
Возраженія прошивъ сего плана и отвъты на оныл.	
Сильно бы ежегодно людей спасало оспопрививание : -	- 286
Сильнъйшіе примъры не довольны нъ побужденію нъ оснопри Аругія средства предлагаются.	
И такъ надобно привлещи его приманною прибыли.	- 287
Первое препятещвіе, сопротивляющееся распространенію осп	
ванія.	- 28E
Свидъщельства, кои доназывають, что на всткъ людахь 6	
оспа, да и бываеть однажды въ жизни.	
Второе препятетьие, прошивополагаемое оспопрививанию.	- 289
Ужасная картина часто представляемая осною.	
Обыкновенныя следенный осны	- 290
Примъры доказывающие, что дъйствія оснопрививанія стель	легки,
чито оно едва заслуживаеть имя бользии.	
Единственное средство побъждать всъ затруднения.	- 291
Оспопрививание освобождаеть оть натуральной осны.	
Оспопрививание не дъйствуеть на тъхъ, на ноихъ была оспа	292
Возражение взятое изъ убытка оспопрививания: отвътъ.	- 29%
Причины, по коимъ думають, что къ тъмъ, къ коимъ п	ривища
была осна, можеть она опять пристать.	
Ежели ни одно изъ предложенныхъ средствъ не удзется,	mio om-
цамъ и машерямъ надобно прививать оспу самимъ иъ свои шамъ.	
Примъръ удебности, съ нановою производится сія операція.	- 294
Способъ, ноторой употребленъ былъ сочинителемъ надъ со	Forman
нымь сыномь.	
Сколько сей способъ сходенъ съ способомъ г. Троншеня.	- 296
Для возчувствованія встхъ выгодь оть оспопрививанія, надоб	HO emar
бышь всеобщимъ,	- 296
членъ іу.	
О пріуготовленіяхь кь оспопривнванію.	297
Годовыя тремена, въ кои надобно прививать оспу.	
Какой возрасть наиболье способень къ прививанию?	
Слабое и болъзненное шълосложение не должно бышь препято	maiow's
къ оснопрививанію.	misiem b
Какая должна быть дотская діэта предо оснопрививаніемь?	. 202
Предъ оспопрививаниемъ надобно прочищ ть два или три раз-	4.
Отъ чего зависитъ успъхъ оспопривив теля?	
Тогда нъть опасности, когда немного бываеть прыщей.	-
ВЪ чемъ состоить главный сенреть оспопрививанія? -	
	TAEHT
	YWITITE

членъ у.

Cingue.

Пользование, которое надобно употреблять во время оспо-	
прививанія.	99
©но должно быть таково же, каково въ натуральной оспъ	la'n
Важность въ чистительныхъ послъ оспопрививания.	-
Charles and the control of the contr	
the state of the s	
ГЛАВА 13.	
O kopu.	
The state of the contraction to the contract of the contract of	
Сходешво кори ев осново.	-
ВЪ которомъ годовомъ времени корь наипаче пристаеть?	
\$ T.	
Причины кори.	00
	CO
Зараза Корь раздълденися на благошворную и злошворную.	程 至6
Wolf have end a president the same accompanies to the same and the same accompanies to the same accomp	
\$ 2.	
Признаки кори:	
and the same of th	
Признаки предмествующе.	
Время больни, въ которое выходить высыть.	OI
Признаки кори злоппворной.	
Чъмъ различается и орь отъ осны?	
Время, въ которое уходитъ высыпь.	
Неблагополучные признаки, причиняемые горячимъ себя содержа-	E46
Обыниовенной признакъ кори злотворной.	02
Опаснъйшій день въ сей бользии.	
Влагопрівшивайшіе признаки.	
Неблагопріятные и опасные признаки.	-
\$ 37	
Tune verme of source and a second of the sec	
Пищеунотребление и содержание себя, которое надобно предпис	-10
вать больнымь корью.	-
Вль, которую надобно предполагать въ пользовании сей бользии.	-
годны въ оспъ. Для чего:	15 17
Канія должны быть питія!	05
огда живошъ запершъ.	1
)()()()() ₆	4.

8	-	
	A	

Авкарства, кои надобно предписывать больнымь корыю.	303
Обемоятельство, кое показываеть кровопускание.	-
	200
вода вода в протова вода она есии твенно обнаруживается.	304
что надобно двлать для упишенія нашля, сукости горла, трудно-	
сти въ лышанія?	
Когда лихорадка усиливается, а прыщи начинають блюдивть.	
Когда высыпь внезапно пропадешь.	305
Когла появящся пящны пурпуровыя или пещехізльныя.	203
об такительный кои показывающь болеу полительныя.	- ion
что надобно двлать, когда посль бользни продолжается упорном	A CHES
nonceb:	
\$ 5.	
Пользование выздоровления отв корн.	
тто должно быть нешвами и питіемъ ?	72.2
том возметь причинить холодной воздухв.	energy.
Что надобно дълать, когда въ сie время откроются признаки ча-	306
хошки:	300
ГЛАВА 14.	-1
о пихорадко кропивной.	10.00
Для чего сія лихорадна такъ названа?	
е пособы на это.	
Въ которое головое время пропивная лихорадна обынновения?	307
Кию оной подвержень?	
Канъ раздыльють сей видь лихорадки?	
S. Lower and Market an	
О лихорадкъ кропивной благотворной.	US OF
членъ 1.	
Приэнаки лихорадки кропивной благотворной.	
Сколько времени продолжается въ ней высыпь ?	
членъ п.	
Пользование лихорадки кропивной благотворной.	308
Абкарства въ ней не очень нужны.	1823
C - wanta cafe numbe.	-
Обстовне выства, кои показыван ть авкарства: мягчительныя пр)-
мыванія, селитру и регень.	
умовенія рукь и погь; болеушолишельных кь вечеру.	
Jacobenia Plan a more,	5 2

0 лихорадкы кропивной элотворной.	308
Гикорадна кропивная злошворная всегда опасна:	-
членъ І.	
Признаки, извлеляющие лихоралку к, опивную элотворную.	309
членъ П.	
Пользование лихорадки кропивной элотворной. Опасность от выпоражниваній въ семъ видъ лихорадки кропивной. Нужда въ кръпительныхъ и противутнильныхъ.	
ГЛАВА IS.	
0 лихорадкъ желиной.	310
Знаки сего вида лихорадни. Въ исторую пору она часта? Земли, въ ноихъ она обынновенна. Кто изиболъе оной подвержень?	
\$ t.	
Пользование лихорадки желиной, когда она безпрерывная	
Пищеупотребление и лъкарства.	511
§ 2.	
Пользование пихорадки желиной, когда она перемежающа или отступная.	яся
Пищеупотребление и авкарства. § 3.	
Пользование лихорадки желиной, относительно кв главни признакамь.	пмв —
Когда животь заперть.	
Когда поносъ.	
Когда кожа жгуча, одняко не поттетт.	-
Когда появятся признаки нервные, гнимые и проч.	
средства, кои надлежить употреблять для предупрежде	енія —
употребление жины, канъ предохранительное лънартиво.	
ynompeonenie Xundi, nand njedokpanimendioe using	

Стран.

Cr	пран,
Обстоятельства, неи требують умовений ногь, катаплазмовь изь	
луку, горчины съ тъстомь, мягчительныхъ промываній, селит-	
ры и ревеня.	520
— — чистительных в, даже сильных в, нарывных в.	3 2 I
Какъ и когда надобно поступать для произведенія нагноснія? -	-
Обешояшельства, въ ноихъ нужна хина.	
Ея важность въ семъ случат.	-
Она приназдывается даже снаружи въ катаплазмахъ, или въ	
припадкахТ.	-
Какъ надобно ноступать въ скорбутной рожь?	522
\$ 5.	
Средства предохранять себя отв рожн.	
оредетва предемранить ссои ото рожко	977
яства и питье.	-
должно избътать запора.	-
TAADA	
ГЛАВА 17.	
О сумазбродстви или воспаленій мозга:	323
	3
Сія бользнь чаще бываеть симптоматическою, нежели существенною.	-
Земли, въ ноихъ она обынновеннъе, и люди оной подверженные-	-
§ 1.	
Причины сумаэбродства или воспаленія мозга,	-
A CANAGO CA	
Сколько настоящее сумазбродство опасно, когда оно существенное?	
\$ 2.	
Признаки воспаленія мозгл.	
Aspasaan buchinenin mozea.	324
Признани предшествующие.	-
поназывающіе воспаленіе мозга.	-
различительные	326
опаеные,	-
- Благопрідшиме.	
Сія бользнь требуеть скорыхь пособій. Для чего?	326
\$ 3.	
Пищеупотребление и себя содержание, кои издобно предписыв	/ Jane
виавиный вы суманию нап вы воспаление монга.	THU
виавшимъ въ сумаэбродство или въ воспаление мозга.	
Канія суть поназанія, имъ представляемыя?	
Канія суть поназанія, имъ представляемыя? Удалять отъ больнаго все мегущее его потревожить; держать ни	-
Канія сушь поназанія, им'в представляемыя? Удалять от вольнаго все мегущее его потревожить; держать ни въ излишнемъ колодъ, развеселять, дер-	
Какія суть поназанія, имъ представляемыя? Удалять от больнаго все мегущее его потревожить; держать ни въ излищнемъ толодъ, развеселять, держать ни въ излищней темнотъ	-
Канія сущь поназанія, имб представляемыя? Удалять отб больнаго все мегущее его потревожить; держать ни въ излишнемъ колодъ, развеселять, держать ни въ излишней темнотъ. Не противоръчить, но еще и объщавать ему то, что нажешея	-
Какія суть поназанія, имъ представляемыя? Удалять от больнаго все мегущее его потревожить; держать ни въ излищнемъ толодъ, развеселять, держать ни въ излищней темнотъ	521

Cn	гран.
Наконецъ употребить все, что его забавляло въ состолнін здравія.	327
Наконевь употребить все, что его заставлять	_
Канія должны быть яства?	
\$ 4.	
	.7
Авкарства, кои надобно предписывать больнымь впавшимь	60
сумазбродство или воспиление мозга.	328
Выгоды от в кровотеченія из в носа.	
Споссбы производить оное.	
Кронопусканіе из в шейных в жиль.	
Обещовшельства, кои требують пілвиць къ вискамь.	-
Вожидонь въ почечуйномъ течении.	529
Средство производить оное: піявицы ; раздражательныя промыванія,	
CREUZ.	255
Надобно вызвать остановившіяся выпоражниванія, или вмісто их в	
CATARINE ADVISA.	-
Послаблять животь промываніями, чистительными и проч-	
Обришь голову больнаго, и опрыскивать ее уксусомь.	330
Класть ноги въ теплую воду, поощренную уксусомъ, и предписы-	
вашь цальныя бани.	
Обстоятельства, кои показывають нарывныя.	
ГЛАВА 18.	
	331
ГЛАВА 18. 0 различных видах воспаленія глазь или о глазной бользии.	331
о различных видах воспаленія глазь или о глазчой бользии.	331
о различных видахь воспаленія глазь или о глазчой бользии. § 1.	331
о различных видахь воспаленія глазь или о глазчой бользии. § 1.	331
о различных видах воспаленія глазь или о глазчой бользии. § 1. о воспаленіи глазь или бользии глазь существенной.	331
о различных видахь воспаленія глазь или о глазчой бользии. § 1.	331
о различных видах воспаленія глазь или о глазчой бользии. § 1. О восилленіи глазь или бользии глазь существенной. Титодо сей бользии.	331
о различных видах воспаленія глазь или о глазной во гв эни. § 1. О восигленіи глазь или вольэни глазь существенной. Титодо сей вользни	
о различных видах воспаленія глазь или о глазной во гв эни. § 1. О восигленіи глазь или вольэни глазь существенной. Титодо сей вользни	331
о различных видах воспаленія глазь или о глазной бользии. § 1. О восилленіи глазь или бользии глазь существенной. Титодо сей бользии. Ч Л Е Н В 1. Причним воспаленія глазь существеннаго.	333
О различных видах воспаленія глазь или о глазной бользии. \$ 1. О воспаленіи глазь или бользии глазь существенной. Титодо сей бользии. Ч Л Е Н Б 1. Причины воспаленія глазь существеннаго. Оно иногда бываеть бользнію повальною и заразительною.	
о различных видах воспаленія глазь или о глазной бользии. § 1. О восилленіи глазь или бользии глазь существенной. Титодо сей бользии. Ч Л Е Н В 1. Причним воспаленія глазь существеннаго.	333
О различных видах воспаленія глазь или о глазной бользии. \$ 1. О восилленіи глазь или бользии глазь существенной. Титодо сей бользии. Ч Л Е Н Ъ 1. Причины воспаленія глазь существеннаго. Оно иногла бываеть бользнію повальною и заразительною. Кто наиболье оному подвержень?	333
О различных видах воспаленія глазь или о глазчой бользии. \$ I. О восилленіи глазь или бользии глазь существенной. Титздо сей бользии. Ч Л Е Н Ъ І. Причины воспаленія глазь существеннаго. Оно иногла бываеть бользнію повальною и заразительною. Кто наиболье оному подвержень? Ч Л Е Н Ъ ІІ.	333
О различных видах воспаленія глазь или о глазчой бользии. \$ I. О восилленіи глазь или бользии глазь существенной. Титздо сей бользии. Ч Л Е Н Ъ І. Причины воспаленія глазь существеннаго. Оно иногла бываеть бользнію повальною и заразительною. Кто наиболье оному подвержень? Ч Л Е Н Ъ ІІ.	333
О различных видах воспаленія глазь или о глазной бользии. \$ 1. О восилленіи глазь или бользии глазь существенной. Титодо сей бользии. Ч Л Е Н Ъ 1. Причины воспаленія глазь существеннаго. Оно иногла бываеть бользнію повальною и заразительною. Кто наиболье оному подвержень?	333
О различных видах воспаленія глазь или о глазной бользии. § 1. О восилленіи глазь или бользии глазь существенной. Титодо сей бользии. Ч Л Е Н В І. Причним воспаленія глазь существеннаго. Оно иногда бываеть бользнію повальною и заразительною. Кто наиболье оному подвержень? Ч Л Е Н В ІІ. Признаки воспаленія глазь существеннаго.	333
О различных видах воспаленія глазь или о глазной бользии. \$ 1. О восилленій глазь или бользии глазь существенной. Титодо сей бользии. Ч Л Е Н В І. Причины воспаленія глазь существеннаго. Оно иногла бываеть бользнію повальною и заразительною. Кто нанболье оному подвержень? Ч Л Е Н В ІІ. Признаки воспаленія глазь существеннаго. Посльяєть воспаленія глазь, ногда оно тажко.	333
О различных видах воспаленія глазь или о глазной бользии. § 1. О восилленіи глазь или бользии глазь существенной. Титодо сей бользии. Ч Л Е Н В І. Причним воспаленія глазь существеннаго. Оно иногда бываеть бользнію повальною и заразительною. Кто наиболье оному подвержень? Ч Л Е Н В ІІ. Признаки воспаленія глазь существеннаго.	333

членъ III.

пищеупотребление и себя содержание вы воспалении глазы	
пище употребление и семь сопренномь.	334
	_
Канія должиы быть яетва?	_
Пишье. Надобно глаза больнаго прикрышь от всянаго свытящагося предмета,	
	336
надобно ему быть спокойну и техомъ и духомъ.	
членъ IV.	
	v7
Авкарства, кон надобно предписыв ть больчым имвющим	
воспаление гл. зъ существенное.	
	-
Вившина явкаренняя часть бывають болбе вредты, не кели полезны.	_
	356
	72
Польза от в пілвиць, припущентих в послаблящельных в лемаретвь. Важность мокротожидительных в и послаблящельных в	_
Gumo IL UNIA.	
Предп чиниельными мокрономид. Ул 6н й спос 65 выпускань нужи е количе изэ крови пілвицами.	232
Spuris F ACEV W Mbime ee X AOAnor Bodos.	
C. TRULY 2 A NI 82 III D ILA DOI DILDLA .	-
Оти обыкновенно удающся, изгда ихв чрезв немалое время держащт.	
то то тепины вр сей бользни.	
The state of the s	
Способь ее продергаваны и гда жарь и боль глазь весьма Что над бно тогда двлать, и гда жарь и боль глазь весьма	
	558
поназывающь сношворныя.	
TALLA TALLA TOUR PALAS HOLD & KIND CONDS & HPOLINA	-
налогия налогия спотования предписывания.	-
Осторожность, которую должно имъть во всаномъ воспалени	1
	359
TAID.	
§ 2.	
о воспачении гл. эв симптом тине к мв или происшедии: м	13
оть доугой бо выни.	
Оно упорио, когда происходить отв золотухи?	-
T carl cruult.	-
от при при призной бользии, зависьщий ощь золо	
тухи, должно опиносищь за но встыть симпиноманическим воспа	•
Ae liamb radb.	-
Хина есть присоднъйшее лънарешво.	540
Способь ее изготовалть.	
Прієм'в.	-
	Надоб-

	Стран
Надобно упомреблять ее чрезъ долгое время.	540
Минеральной евіопЪ; предосторожности, съ каковыми надобно пред	
писывать канъ его, такъ и всь другія мериуріальныя пріуго	-
товленія.	-
\$ 3.	
Средства предохранять себя оть воспаленія глазь.	341
Трижиганіе ,	0.1
Кровопускание и прочищение весною и осенью.	
Простад дізта.	_
	to Kanan
Г Л А В А 19.	
0 on a 6 t,	
Т. е. о воспаленін горла; о боль эняхь антоновоогненных в го	opra
или о элотворной жабь; о простой жабь или ненастояще.	й
Что сзначаеть жабу?	1962
Врачь обыкновенно называеть сію бользнь ангиною.	
\$ I.	6 EV
0 воспальтельной жабь.	342
ВЪ компорую пору она часта; и кто оной болбе подверженЪ?	24
Гитэдо воспалительной жабы.	
Какъ п емупать для узнанія гибэда сей бользии?	-
Частое разсматривание ничего не представалеть взору	-
членъ і.	
Раздъление воспалительной жабы.	343
Знаки перваго вида, занимающаго дыхательное горло.	
випораго вида, у и его гибздо есть начало дых тельнаго горла.	+
Третій видь занимаєть мышцы косточки гіондней и ларинкса	1 3 5
его знани. " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	-
Знаки жабы на язычки, на миндалинахъ, на задней части неба.	544
ноторая составляеть патой видь.	
жабы корчной; шестой видъ.	345
жабы корчной удушающей; седьм и последній видь.	546
членъ п.	
Причины воспалитлеьной жабы;	No. of Land
Ч Л Е Н Ъ III.	
Признаки воспалительной жабы.	347
Визки предшествующіе.	-
	Вна-

C	mpan
Энаки предшествующие крови и харкотины.	547
Ігризнани ушвердившагося воспаленія.	
- благопрідшине.	548
- нещастные.	-
емериные.	-
	4
членъ ту.	
Пище употребление п содержение себя для тыхь, кон больны	
	349
	242
Какія дохжны быть яства и питье?	manage"
Вольной долженъ быть въ поков, и говорить только голосомъ ти-	
XIMD.	-
Толова его должна быть возвышена.	and a
Что должно класть около шен для содержанія окой въ тепль :	-
Жорошія действія от в смородиннаго желе.	550
Выгоды от полосканья; способъ его дълать.	-
Превосходныя действія от умовенія ного и голеней.	-
Средства предупреждань опасность въ сей бользии.	-
H I P H H	
ЧАЕНЪ У.	1
Авкарства, кон надобно предписывать больным воспалительн	-
жабою.	010
JICHOOKO.	351
Когда и откуда надобно пускать кровь?	
Важность наружных в явкарств в в сей бользии.	-
Разсуждение о обильных в провопусканиях в и сильных в слабительных в	-
Легкія проносныя.	-
Понятіе о жабъ.	352
Рвошное, данное благовременно, можетъ быть спасительно.	-
Жорошія дъйствія отъ минеральнаго нристилла или счищенной се-	-
Aumphi Cuccoff Vicument same ee	
от Б летучей мази.	555
Рецептъ на успонсев: шельной пластырь, обнародованной Г. Шл-	-
мелемъ.	
Способъ упетреблять его.	-
HVWA2 sh accomb ununnin mer.	-
VENTAGE ETHANGERS NO VON NAME TO THE PROPERTY OF	554
молока и минища бълго жабба.	
Гванновая намъдь; спо объ употреблять ее.	-
ВЪ нарочетыхъ жабахъ надобно къ запылну приложить нарывныя.	-
Сиольно времени держать шечение изъ раны?	-
ято налобно дванть когда восположе	
(акъ надобно пишать больнаго, ногда не льзя ему глот ть?	55
Ma Warofino Moras attams Horse of Parist	
VVVVV	56
NA NANA	44

361

что

\$ 2.
О боли горла съ антоновымъ огнемъ и вередами, или вжабъ злой 356
жюди оной подверженные, и годовыя времена, въ кои чаще случаещся.
членъ І.
Причны жабы элой или жабы съ антоновымъ огнемъ и вередами.
Вараза вст причины лихорадовъ гнилыкъ 557
члень и.
Признаки жабы съ антоновымъ огнемъ и вередами.
Признани предшествующіе. Обыновенные признани у дѣтей. Признани во внутренности горла. Остбенные признани сей бользни. Признани, различающіе сію жабу оть воспалительной. — нещаетные. — опасные. — благопріятные.
остающеем по выздоровлении.
Пище употребление, кое надобно предписывать больным витоно- вымь огнемь.
Канія должны бышь яства и пишіл?
членъ іу.
Авкарства; гон надобно предписывать больным жабою съ антоновым огнем и везедами.
Снолько различно пользование сей жабы от пользования воспалитель- ной жабы? Качества, пстребныя въ лъкарештахъ. Что вначалъ надабно предписать, ежели у больнаго есть позывъ
на рвошу? Полссканье, исгла бользнь не опасна. Когда признаки бывають страшными.

Способъ употреблять.

Кары, кои надебно впускать въ горло-

	Cml	aMe
Что надобно предписывать, жегда бользнь находится на высоча	- No	
шемь степени элости:		161
Хину; способъ ее предписывать.		-
Нарывныя : гдб ижь надобно прикладывать ?		
Что надобно двлать, когда больной умучился рвотою?		562
— пеносомъ?		
— ногда пойдеть ировь изъ носа? — ногда случится трудность вы моченспусканіи?		-
Время прочищань.		-
Что надобно дълать, когда по излъчени бользни остается слабост	пъ	
уныніе и проча	-	
是是是是一种。 11世纪中华人的大学的		
\$ 3.		
О бользии горла простой или о ложной жабь.		
Свойства и знани боли горла простой.	-	365
членъ 1.		
Признаки боли горла простой.		-
To a suppose of the s	-	-
Признаки пред шествующіе	*	-
— Харантеристические.	-	564
Y A E H E II.		
Пользование простэй боли горла:		365
обстоящельства, кои показывають кровопускание		_
что игдобно двлать для опущения провопуснания:	•	_
Нерадъпіе о началь сей бользни и вськь другикь.		
Что надобно дълать, когда боль не сильна?		
- ногда есть ибноторые знаки воспаленія?		366
\$ 4·		
Средства предохранять себя ств различных видовь ж	a600	K
болей горла.		
Строгая дізта.		-
Или частыя промыванія.		-
Польза ств содержанія шен и ногь въ тепль.	-	567
что надобно дълать, когда по прошестви воспаления жельзы о	cma	
ются распухамий?		
)()()()()(2		TAA"

ГЛАВА 20.

О насморкь; о различных видахь кашля и о удушьь.	368
\$ I.	
Онасморкъ.	_
Понятіе, накое должно имъть о простудахь. Никто от насморка не избътаеть: он бываеть во всъх наима-	-
членъ і.	_
Признаки насморка:	369
членъ п.	
Пнице употребление и содержание себя, кои надобно предписыва получившимь насморкь.	me
Яства.	-
Въ чемъ долженъ состоять ужинъ?	-
Вольной должень лежать вы постели и теплы.	570
Польза от пара шеплой воды; способъ употреблять его.	-
Надежныя средства предупреждать сабдетвія насморна, ежели бу-	
дуть только наблюдаемы.	371
Чему подвергающся шт, кои презирающь?	
ми напишками.	
ТерьяномЪ.	-
Нещастими последствія, производимыя насморном'в въ рабочих в лю-	
дяхь, кои не кстять изскольно дней успоновться ств работы.	372
Или нои это презирають, почитая насморнь бользнію очень легною.	-
насморив шанія же производять следствія вы путешественникахь по темь же причинамь.	
Опасности от в излишней от в насморка боязни.	378
Съ діятою надобно соединять умъренное тълодвижение.	-
Польза от умовенія ного; степень теплоты потребный въ сей	
Сонращение того, что надобно делать въ простомъ насморкъ.	
членъ п.	
Авкарства, кон надобно предписывать больным насморкомь которой не уступаеть діять.	374
Боявани, проиеходящія от упорнаго насморна.	-
Обстоятельства, кои показывають кровопускание.	-
	04-

Обстоянельства, нои поназывающь нарывнов.	574
членъ IV.	
Надежния средства предохранять себя от насморка.	375
Ошибия штхъ, кои сидять въ излишней шеплошт для предупрежде-	
ніл насморка.	-
Ваблуждение простаго народа, насательно до пользования насморна. Изтъ исилючительнаго явнаретва для той или другой бользии; при-	
знаки сущь показащеми менарешав.	-
S 2:	
О различных видах в кашля.	
членъ І.	
О грудноть; т. е. происходящемь изв легких в кашль.	376
Приэнаки груднаго кашля.	-
сколь долго продолжается грумина	577
Канія от в него нещастими происходять следствія, ногда он в упорень?	
Пользование груднаго кашля соединеннаго съ михорадкою.	178
Признани, нои пеназывають кровопускание.	
Aioma.	-
Умовение ногъ.	-
Прометваніе.	-
the state of the s	cb
мокротохарканіемь густымь и вязкимь.	
Солюція, т. е. распущеніе аммоніаческой камъди.	-
Сцаллитическія явкарства.	37.
Грудной разбивательной сиропъ.	-
Авнарства усладительныя и масляныя.	-
Пшизана.	-
Парегорической эликсиръ	
HIGHOR CD MILERCRUM B COROMB.	580
Пользование груднаго кашля безь лихорадки, но соединеннаго	c3
Солодновой совь, ячмень съ самаромъ, бальзямическій ивпешечки,	
шилиской сокв, ичмень св сахаромв, бальзамическия ивпешечки,	
Одинъ польно случай, которой показываеть ленарства масляныя и	
сканэнстыя.	-
)()()()()(s	1115-

Cmpak.

Cr	гран.
Ошибки, чинимыя въ употреблении сихъ лъпарствъ.	580
Рожаныкъ нружновъ, ячменя съ сакаромъ.	
Масляная эмульсія съ прибавленіем въ оную парегорическаго элик-	
сира, или тебанческой тинктуры, т. е. лаудана ликвида	-
Пользование кашля безь лихорадки, но содержимие мократ	AMR
	381
Абкарства способствующія монрошохарнанію и прижиганіе.	10 mm
Пластырь изъ Бургонской смолы.	
Польза от него во встх нашляхь, исилючая, ногда вередь въ	
Для полученія от в него пользы надобно носить его долгое время.	_
Какъ пособлань зуду, отъ него происходящему.	582
Предосторожности, нои надобно взять при оставления его-	-
членъ п.	
О желу дочном в кашль.	-
The area of the ar	
Признаки желудочнаго кашля.	583
чъмъ различается желудочной нашель от груднаго?	_
Онь обыкновенень нъжнымъ женщинамъ и проч; его причины.	
Пользование желудочнаго кашля, произшедшиго отв скопа A.	рянн
въ семъ перевъ (желудкъ.)	384
показаніе.	-
Слабое рвошное и горькое чистительное.	-
Священия шинктура.	
Способъ ее пріугошовлять.	
Примъчаніе.	-
Польэование желудочнаго кашля, происходящаго отв слабо	сти
Monto obanie meny avenue neery 4ka.	385
	20115
Хина.	
Желуднонръпительной порошонъ.	386
YAEHD III.	
О кашть нервномь.	-
кто полверженъ нервисму нашлю ?	587
намь онь различествуеть от желудочиль	
C cen's WWWIIIE	
Пользование нервнаго каших у ворос выхо и у жили	
Пишеупотреблене.	
Умовеніе рукв и негв.	
Волеутолительных.	Ч ЛЕНЪ

	Cmpan.
членъ IV.	Steel Tall
о симптоматическом в кашлво	388
О кашив, слъдствін проръзыванія зубовь.	
Надобно послабить животь и надобинуть десны. Что такое надобнание? Польза от в него.	: =
минута оное производить.	389
О кашав, саваствін ганств.	309
О кашав, савдствін беременности.	
О кашав, предшествующемь признакь подагры.	
Способъ его вылъчить состоить въ томъ, чисбъ возбудить и	- 390
\$ 3.	
О удушь в или о кашль съ удушьемь.	-
Младенцы болье всего подвержены удушью. Для чего?	: -
членъ 1.	
Пище употребление, кое надобно предписывать вы удуч	ubb
Цёль въ пользования.	
Пишье. Перемена воздуха есть лекарство въ удушье. Оно прилипчиво.	: =
членъ п.	
Авкарства, кон надейно предписывать въ удущов.	392
Когда и сколько разъ должно пускать кровь?	
рвошныя въ оном'в полезны. Для чего:	
Способь давать ипекануанту младенцамь	. 393
Имъ надобно быть легкимъ.	
Сиропъ, или тинктура ревеневая.	
Пріємы для малольшных в дъшей. Для вэрослейших в.	: -
лачной способъ послаблять живсть темь, кои упрямятель	sero? 394
Авнарства масляныя, грудныя не годится вы сей бользии. Для	- 594
Клонорты; способь ихъ употреблять.	Подь

Стр	211
No 1532 cm b Muhens sky ro wanters	
Канъ надобно его давать?	5 9 1
Wanted the Control of	9!
Чесночная мазь, ноею мереть подошны ногъ и употреблять выбото	
Hazemerna.	-
Эбстоятельства, въ ноихъ она противна.	_
Умовение ногъ, и пластыра изъ Бургонской смолы.	-
Динушной энстранть ничемь не лучше опіума:	
Нарывное.	91
Время давать хину и горечи.	
Пріемъ для младенца.	Angello.
Пріемъ для взрослаге.	-
Аткарсиво, кое можеть одинь полько Лекарь предписать.	-
Бобровая струя съ киною.	-
Прієм'в для младенца.	-
Сокращение пользования удушья.	97
TARRA	
ГЛАВА 21.	
О воспаленін желудка и других в черевь подбрюшіх	-
Сін бользин опасны и пребующь скорыхь пособій. Для чего:	
mpeof some enopolis mocostis, And dela:	
\$ I.	
О воспаленін экелудка.	
O by this heart such y Arias	
членъ І.	
Manuscript more the	
Причины вогналенія желудка.	
Общія причины.	-
Особенныя причины	-
членъ ц.	
Признаки воспаленія желудіс.	
Хараншеристические признаки.	9
Желудочная колика часто бываеть предвозвъщающимъ признаномъ.	-
Признаки опасные.	-
TAEHD III.	
Пищеупотребление, кое надобно предписывать въ воспаления	
желу дка.	
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
Опасности от кръпительных въ сей бользии.	4
Обыкновенная причина малоуспёшности въ пользования сей болёзни. 400	
Outscheduly out beoutspress	-

Cimpania
400
Пишья.
членъ IV.
Авкарства, кон надобно предписывать въ воспалении желудка. 40 г
Важноеть въ кровопускания.
Припарки.
Имъ надобно быть ни слишкомъ жолоднымъ, ни слишкомъ горя-
AAA Tero?
Тренія впадины желудна. поветом в по
Умовение ногъ, горячие кирпичи, или катаплазмы къ ногамъ.
Теплая баня.
Польза от нарывнаго на больномъ месть.
Промыванія.
Сколь они полезны въ сей бользни? Не надобно скоро покидать лъкарства, но надобно продолжать пище-
употребление и по выздоровления.
AND A COURT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF
S 2.
О воспаленін книсокв или нижних вистей брюха. 403
Болёзнь весьма сильная и опасная.
членъ 1.
Причины воспаленія кишокь.
Различныя имена сей бользии, какь - по илическая боль, энпери-
писъ, воспалишельная колика, мизерере, вольвулюсь и проч.
членъ п.
Признаки воспаленія кишокв.
Признаки особениме.
- харантеристические.
олагоприлиные.
опасные.
смершельные,
членъ ІІІ.
Пищеупотребление, кое надлежить предписывать тыв, кон боль
not socnaneniemb knutkb.
Таное же, какое въ воспалении желудка.
членъ іу.
Льк рства, кон надобно предписывать въ воспаления кищокъ. —
Нужаз въ провопуснания нъ больчому мъсту 406
)())()()()()()F

	тран.
Припарки и слабительныя промыванія.	406
Умогение ногъ и проч.	-
Какъ должны составляемы быть промыванія ?	_
Когда бользыь не уступаеть лькарствамь, то надобно давать чи	
стительныя съ болеу толительными.	407
Прежде чистительных в надобно употреблять масляныя тренія.	-
Способъ употреблять ихъ.	-
Надобно употреблять и цвльныя бани.	_
Чистительное, составляемое изъ горькихъ солей.	408
Рецептъ.	
ПріемТ.	-
ПріємЪ на болеутолительное, даваемое тогда же.	-
Что должно дълать для остановления рвоты:	200
— ногда больной ничего не можеть удержать въ желудив?	181-2
Чистительное въ пилюляхъ.	409
Пріемъ.	_
Цвявная шеплая баня.	_
Покусительное средство, когда не надъются выпорознить больнаго.	-
Сырой меркурій, т. е. ртупь.	-
Полезенъ когда нъшъ причины болться антонова огня.	410
Что надобно делать, когда воспаление нишокъ произошло стъ грыж	из-
Сколь нужно сперва изследывать, неть ли у больного грыжи? -	_
членъ у.	
Средства предохранять себя оть воспаленія книшокь.	4 K %
THE PARTY WE IN COMMENT AND THE PARTY WAS THE PARTY OF TH	
Избътать запора. Для чего?	-
 неспълыхъ плодовъ, вътротворныхъ напитиовъ. 	_
простуды от сырости.	-
5 3.	
O The second to the second sec	
О различных видахь коликы	
Энаки и пользование коликъ вообще.	-
	412
членъ 1.	
О коликь вытряной, т. е. происходящей от вытровь.	-
Свойство колики вътряной.	
Denugues to the okmanyor	-
Причины колики вытраной.	Ale and
Опредъление слова колика; чио должно разумъть чрезъ сие слово?	SHEET.
	JAN E
Кию оной подвержень:	при-
	as pro

Страно

YAEHD III.

2011-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	
- O kozukb ucmepuneckok.	419
Вользив свойственная женщинамь.	
Надобно прогонать желчиую нолику, какъ скоро она обнаружится.	
AAR Tero?	-
Примъръ.	-
Кто изъ нихъ ей подверженъ?	426
Признаки колики истерической.	-
Признаки характеристические	-
Time to the second	
Пользование истеринеской колики.	1
Всякой видь выпоражниванія въ сей бользни противень.	
Тто должно дълать, ногда рвота нарочита?	421
Давать вонючих в пилюль.	_
— шинишуры бобровой етрун, Перуанскаго бальзама, прошиву-	1 - 2.
истерическаго пластыря.	-
мущины ипохондрики подвержены почти такой же коликъ.	
членъ іу.	
О коликь нервной.	-
Кто оной болбе подвержень, и въ накой земль она чаще!	
Признаки колики нервной.	422
Признаки предшествующие.	
- харантеристические.	
Различныя имена сего вида колики	423
	4 %
Пользование нервной колики.	
СпособЪ антифлогистичесной или Католической.	THE RESERVE
Масло изъ 6 бровой струи.	424
ВарЪ принимаемой внутрь.	1
ГріємЪ	-
Снаружи въ треніи	
Сильной методъ; способъ пользованія въ Парижской гофиципали	
Милосердія.	
Промыванія изв густаго вина и орбховаго маска.	428
Чистительное промывание сильное.	
Рвошное, шерьянь и мауданумь.	
Чистительное во многихъ рюмкахъ.	
что должно аблать, когда больной слабъ по излъчени колики? -	426
Болеу толительная и потогонительная птизана.	7
Кремительное питье.	
Hpiemb.	TO THE
Чиснишельные болюем или нашышин.	-
Когда больянь менчилась параличемь.	427
	Ko.

Страно
Когда надобно пускать провь? 402
Элентризація, при ветом се ветом вет
Яспра жирныя и масляныя:
— жидкі».
Вых дишь на воздужь и избътать запорть -
Канимъ образ мь ошь оной предостверегающся въ Западныхъ Индіяхъ: -
членъ у.
разсуждение о пользовании колико вообще.
Пособія равно полезими во всякомъ видъ коликъ.
\$ 4.
О воспаленін почекь (боли вы поясниць), и о почечной
konukt. 429
Есть два вида боли въ ноясницъ: настоящая и наменная.
членъ І.
Причины воспаленія почекь и почечной колики.
Ame onomy nodsephend:
членъ И.
Признаки воспаленія почекь и почечной колики.
Общіе признаки двумъ видамъ, и боли въ поясницъ и почечной
Знани . различающие ихъ отъ желиной колики.
Особенные признами воспаленія почекъ или настоящей боли въ
поленицъ.
— почечной колики или колики каменной.
членъ III.
Пищеупотребление, кое надобно предписывать въ воспаления
поцекь и вы поченной коликь. 43%
Acmes.
Humbe.
Выгоды от в мокротожидительных пиний, выпиваемых в вели-
комъ количествъ, но помалу за разъ
членъ іу.
Авкарства, кои надобно предпусывать въ воспаления почекъ и
поченной коликь.
Кровопускание вначаль; гдв надобно его производишь?
Піявиды.
Припарки
Тренія въ случав хрица или намая; легія м чегонишельныя.
Т Блодвижение.
)()()()()()()() 6 CATA-
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

ЧЛЕНЪ

	Стран.
	446
Признаки смеријельные.	
Особенныя бользни въ холеръ - бользни монрой.	
въ холеръ - больни сухой	2 447
Чъмъ различается колера - бользив отъ желчнаго и крововато поноса	
членъ Ш.	
Пользование, каковое должно употреблять вы холерь - бользн	и. —
Показаніе.	-
Пыплячья или шелячья вода по большимъ рюмкамъ, да и часто,	и
вь промываніяхь чрезь каждой чась.	444
Средства остановлять рвоту: хльбная вода; накъ она пріугото)-
вляется?	
Соленой юлепъ и лауданумъ	
Не надобно спъшить останавливань рвоту, естьли от оной не сбе	3-
силья больной.	
Сыворошка съ кръпкимъ виномъ.	449
Умовенія ногь; пренія ногь, кои надобно держать въ тепль; спирт	
ныя припарки къ желудку.	-
Надобно продолжать употребление лаудана въ винъ.	
Ясшва и тълодвижение.	
11 Блыныя бани и декокть изъ тамариндовъ.	
Настой съ жиною или съ чемъ другимъ въ поднисленномъ винъ	450
fortant orways we no sofue ph Hen omys	A-
ваться.	rg on
Примъръ шому.	
\$ 2. while he had a	
O M DE M B.	-
мышь не всегда бываешь бользнію.	
Когда овъ требуеть дізты?	-
Пользование мыта.	451
Horosocante muima.	43-
Пишье.	
Промыванія.	
Gampa.	
Сколь долго продолжается мыть: когда принимаеть оны на сее	R
имя поноса?	-
\$ 3.	
0 поносв.	-
Поносъ раздъляется на желчной, проливной, сущесывенной, симпи	0-
- " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
въ семъ в будетъ толковаться только о поносажъ, кои могут	пъ
Въ семь у оудения полнования	. 452
быть существенными.	
Признаки поноса.	4
Случайной поносъ столь же не опасень, как в мыть.	MARRIE
	ЧЛЕНЪ

членъ і.

Пользование поноса произшединого отв простуды или остановки
испарины. 453
Теплота, мокротожидительной отварь, умовение рукь и ногь, фла-
нель на ножь и проч.
членъ и.
Пользование поноса произшедшаго от излишества мокротв. —
Нужда въ рвошныхъ въ семъ случат.
Ипекануанга.
Ревень.
Яства и питье.
членъ III.
Пользование поноса произшедшаго отв остановки какого нибудь
обыцайнаго еыпоражниванія. 454
Кровопусканіе; и ногда оно не довольно, що сразмърныя выпораж-
ниванія остановившимся.
членъ іу.
Пользование періодических в поносовь.
Сей видъ поноса никогда не надобно останавливать.
Для чего?
Примъръ 455
Періодической поносъ младенцамъ во время зубопроръзыванія полезенъ.
Онъ тогда только требуеть лекарствь, когда причиняеть резъ.
ЧЛЕНЪ У.
Пользовачие поноса, произшедшиго ото страстей или душевныхъ
пораженій. 456
Сей видъ требуетъ великой предосторожности, и не имъетъ нуж-
ды ни въ рвошныхъ, ни въ чистищельныхъ.
Болеу толительныя и антиспазмодическій лекарства наиболее при-
годны.
Нужда въ веселости.
ЧЛЕНЪ VI.
Пользование поноса произшедшаго отв ядовитых проглощенных
веществъ.
Надобно произвести рвоту и выпоражнивание низомъ: наними сред-
етвами?
Болеуноли шельных.
ЧЛЕНЪ VII,
_ ·
Пользование поноса произиндии со оть непорядонной подагры. 457
Припарки и нашаплазмы.
Y A E H D VIII.
Пользование поноса произшедии го и содержимаго глистами.
Оловянный порошокь, масло де пальма Христи, ревень и каломелась.
)()()()()()()()()(
NN NN NN N N N N N N N N N N N N N N N

HAEHT

членъ ін.

Пользование реоты произшенией отв поднявшейся вверхв подагры	2
и остановки какого нибуль обышлинаго выпоражниванія. 46:	
	4
Припарки, катаплазмы и проч-	•
Кровопусканіе, нарывное, или прижиганіе	-
Кровопусканія, прочищенія, умовенія рукъ и ногь, прижиганіе,	
щешина, нарывное и проч	5
членъ іу.	
Способь, kakb пользовать рвоту произшедшую отв	
беременности.	•
Малыя кровопусканія и легкія слабительныя.	4
чей, завтракъ на постели.	4
Выгоды от ксфе.	
Спокойствіе тъла и души, часто повторяемыя ясшва, колодиля	
вода простая, или съ небольшимъ количествомъ водии, корич-	
невой воды.	1
	•
членъ у.	
Пользование рвоты произисацией отв славости желудка	-
Хина въ винъ съ ревенемъ	
Желудионрыштельной порощокъ.	
Купоросной элискиръ.	
Выгоды от устерсовъ.	
The same of the sa	
	•
HAEH'D VI.	
Пельзование рвоты произшенией отв кислотв. 46	5
Пользование рвоты произшедшей от кислоть. 46.	5
YAEHD VII.	5
Ч А Е Н Б VII. Пользование реоты, пронэшедией отв сильных страстей. —	5
Ч Л Е Н Ъ VII. Польэование реоты, произшедшей отв сильных страстей. — ни реотное, ни чистательное.	5
Ч Л Е Н Ъ VII. Поль эрвание реоты, пронэшенией отв сильных страстей. — ни рвотное, ни чистительное. Ч Л Е Н Ъ VIII.	
Ч Л Е Н Ъ VII. Пользование реоты, пронэшедшей отв сильных страстей. — Ни рвотное, ни чистательное. Ч Л Е Н Ъ VIII. Пользование реоты пронэщедшей от нетерических в принагков.	
Ч А Е Н Ъ VII. Пользование реоты, пронэщедшей отв сильных страстей. Ни рвотное, ни чистительное. Ч А Е Н Ъ VIII. Пользование реоты пронэщедшей отв нетерических принадковъ. Антиспазмодичесния лвиаретва: мускусъ, бобровая струя.	
Ч А Е Н В VII. Пользование рвоты, произшедшей отв сильных страстей. Ни рвотное, ни чистительное. Ч А Е Н В VIII. Пользование рвоты произшедшей отв истерических принадков. Антиспазмодичесния явиаретва: мускусь, вобровая струя. Настой сь корицею или мнтою.	
Ч Л Е Н Ъ VII. Польээвание рвоты, произшедшей отв сильных страстей. Ни рвотное, ни чистательное. Ч Л Е Н Ъ VIII. Польээвание рвоты произшедшей отв нетерических припадков. Антиспазмодичесния лвиарства: мускусь, бобровая струя. Настой съ норицею или мятою. Треніе противъ желудна этеромъ или водою.	
Ч А Е Н В VII. Пользование рвоты, произшедшей отв сильных страстей. Ни рвотное, ни чистительное. Ч А Е Н В VIII. Пользование рвоты произшедшей отв истерических принадков. Антиспазмодичесния явиаретва: мускусь, вобровая струя. Настой сь корицею или мнтою.	
Ч А Е Н Ъ VII. Пользование рвоты, пронэщедшей отв сильных страстей. Ни рвотное, ни чистительное. Ч А Е Н Ъ VIII. Пользование рвоты пронэщедшей отв исторических принадков. Антиспазмодическия явиарства: мускусь, бобровая струя. Настой съ корицею или мятою. Треніе противъ желудна этеромъ или водою. Принарки, полубаня теплая.	
Ч А Е Н Ъ VII. Пользование рвоты, пронэщедшей отв сильных страстей. Ни рвотное, ни чистительное. Ч А Е Н Ъ VIII. Пользование рвоты пронэщедшей отв исторических принадков. Антиспазмодическия явиарства: мускусь, бобровая струя. Настой съ корицею или мятою. Треніе противъ желудна этеромъ или водою. Принарки, полубаня теплая. Ч А Е Н Ъ ІХ.	- 6
Ч А Е Н В VII. Поль эрвание рвоты, произшедшей отв сильных в страстей. Ни рвотное, ни чистительное. Ч А Е Н В VIII. Поль зование рвоты произшедшей отв нетерических в припадков в. Антиспазмодичеснія лвиарства: муснусь, вобровая струя. Настой сь норицею или мятою. Треніе против желудна втером в или водою. Припарки, полубаня тепхая. Ч А Е Н В ІХ. Надежныя средства выльчить рвоту, отв какой бы она причины	- 6
Ч А Е Н Ъ VII. Пользование рвоты, пронэщедшей отв сильных страстей. И А Е Н Ъ VIII. Пользование рвоты пронэщедшей отв нетерических принадковд. Антиспазмодический ядиарства: мускусь, вобровая струя. Настой съ корицею или мятою. Треніе противъ желудна втеромъ или водою. Припарки, полубаня тепхая. Ч А Е Н Ъ ІХ. Надежныя средства вильчить своту, отв какой бы она причинени пронуходила, когда только нужно остановить се.	- 6
Ч А Е Н В VII. Пользование рвоты, пронэщедшей отв сильных страстей. Ни рвотное, ни чистительное. Ч А Е Н В VIII. Пользование рвоты пронэщедшей отв нетерических принадковь. Антиспазмодичесния явиаретва: муснусь, бобровая струя. Настой сь норищею или мятою. Треніе противь желудна этеромь или водою. Принарки, полубаня теплая. Ч А Е Н В ІХ. Надежныя средства выльшить рвоту, отв какой бы она причины ин пронэходила, когда только нужно остановить се. Соленое питье.	- 6
Ч А Е Н В VII. Пользование рвоты, произшедшей отв сильных страстей. Ни рвотное, ни чистительное. Ч А Е Н В VIII. Пользование рвоты произшедшей отв нетерических принадковь. Антиспазмодичесния лычарства: муснусь, бобровая струя. Настой сь норицею или мятою. Треніе противь желудна втеромь или водою. Припарки, полубаня теплая. Ч А Е Н В ІХ. Надежныя средства вильшить рвоту, отв какой бы она причние ни произходила, когда только нужно остановить ее. Соленое питье.	- 6
Ч А Е Н В VII. Пользование рвоты, произшедшей отв сильных страстей. Ни рвотное, ни чистительное. Ч А Е Н В VIII. Пользование рвоты произшедшей отв истерических принадковь. Антиспазмодичесния явиарства: мускусь, вобровая струя. Настой сь норицею или мятою. Треніе противь желудна этеромь или водою. Припарки, полубаня тепязя. Ч А Е Н В ІХ. Надежныя средства вильчить своту, отв какой бы она причинени произходила, когда только нужно остановить се. Соленое питье. Устерсы. Примъръ.	- 6
Ч А Е Н Ъ VII. Польэование рвоты, пронэщедшей отв сильных страстей. И А Е Н Ъ VIII. Польэование рвоты пронэщедшей отв нетерических принадковь. Антиспазмодическия лвиарства: мускусь, бобровая струя. Настой сь норицею или митою. Треніе противъ желудна этеромъ или водою. Припарки, полубаня теплая. Ч А Е Н Ъ ІХ. Надежныя средства вильчить своту, оть какой бы она причине ни пронэходила, когда только нужно остановить се. Соленое питье. Устерсы. Примъръ.	
НА ЕН В VII. Пользование рвоты, пронэщедшей отв сильных страстей. И Л Е Н В VIII. Пользование рвоты пронэщедшей отв истерических припадковь. Антиспазмодическия лвиаретва: мускусь, бобровая струя. Настой сь норицею или мятою. Треніе противъ желудна втеромъ или водою. Припарки, полубаня тепляя. И Л Е Н В ІХ. Надежныя средства выльшить своту, отв какой бы она причины ни пронэходила, когда только нужно остановить се. Соленое питье. Устерсы. Примъръ. Способъ составлять соленое питье.	
На ЕН Б VII. Пользование рвоты, пронэщедшей отв сильных страстей. На рвотное, ни чистительное. Ч Л Е Н Б VIII. Пользование рвоты пронэщедшей отв нетерических принадков в. Антиспазмодический явнарства: мускусь, бобровая струя. Настой съ норищею или мятою. Треніе противъ желудна втеромъ или водою. Принарки, полубаня теплая. Ч Л Е Н Б ІХ. Надежныя средства выльчить рвоту, отв какой бы она причине ин пронзходила, когда только нужно остановить се. Соленое питье. Устерсы. Примъръ. Способъ составлять соленое питье. Ч Л Е Н Б Х.	
Ч А Е Н В VII. Пользование рвоты, пронэщедшей отв сильных страстей. И А Е Н В VIII. Пользование рвоты пронэщедшей отв истерических припадковь. Антиспазмодический лвиарства: мускусь, бобровая струя. Настой съ норицею или мятою. Треніе противь желудна втеромь или водою. Припарки, полубаня тепхая. Ч А Е Н В ІХ. Надежныя средства выльчить рвоту, оть какой бы она причны ин пронэходила, когда только нужно остановить ее. Соленое питье. Устерсы. Примърь. Способь составлять соленое питье. Ч А Е Н В Х. Разсужденіе о различных вадах рвоты по пользованін имя	
Ч А Е Н Ъ VII. Пользование рвоты, произшедшей отв сильных страстей. И А Е Н Ъ VIII. Пользование рвоты произшедшей отв истерических припадков в. Антиспазмодичесния явиарства: мускус в, вобровая струя. Настой с в норицею или мятою. Треніе противъ желудна втером или водою. Припарки, полубаня теплая. Ч А Е Н Ъ IX. Надежных средства выльчить рвоту, отв какой бы она причины ин произходила, когда только нужно остановить се. Соленое питье. Устерсы. Примър В. Спосов в составлять соленое питье. Ч А Е Н Ъ Х. Разсуждение о различных в видих рвоты по пользовании ими требуемом в.	
Ч А Е Н Ъ VII. Пользование рвоты, произшедшей отв сильных страстей. Ки рвотное, ни чистительное. Ч А Е Н Ъ VIII. Пользование рвоты произшедшей отв истерических припадков. Антиспазмодическия лвиарства: мускусь, бобровая струя. Настой сь норицею или мятою. Треніе противъ желудна втеромъ или водою. Припарки, полубаня теплая. Ч А Е Н Ъ ІХ. Надежныя средства выльчить рвоту, отв какой бы она причине ин произходила, когда только нужно остановить ее. Соленое питье. Устерсы. Примъръ. Способъ составлять соленое питье. Ч А Е Н Ъ Х. Разсуждение о различных видих рвоти и о пользовании ими требуемомь. К: ве всёхъ рвотакь надобно предписывать лънгрешвое.	
Ч А Е Н Ъ VII. Пользование рвоты, произшедшей отв сильных страстей. И А Е Н Ъ VIII. Пользование рвоты произшедшей отв истерических припадков в. Антиспазмодичесния явиарства: мускус в, вобровая струя. Настой с в норицею или мятою. Треніе противъ желудна втером или водою. Припарки, полубаня теплая. Ч А Е Н Ъ IX. Надежных средства выльчить рвоту, отв какой бы она причины ин произходила, когда только нужно остановить се. Соленое питье. Устерсы. Примър В. Спосов в составлять соленое питье. Ч А Е Н Ъ Х. Разсуждение о различных в видих рвоты по пользовании ими требуемом в.	

Стране.
Кантя суть рвоты, въ ноторыхъ бы они были пагубны?
Абнарства, тогда, только пригодны, когда рвета нарочито разслаб-
ляеть больнаго
Рвета отъ беременности обыкновенно перестаеть сама собою на
четвертомъ мъсяцъ или на четвертомъ съ половиною.
Въ ней нужна польно дізпа.
Рвоша, произшедшая от слабости: желудка, требуетъ только го-
речей.
членъ хг.
Средства предупреждать возврать рвоты. 469
Aibma.
Дешва.
ГЛАВА 23.
О непорядочномь теченін мони, у Врачей называемомь діабе-
тесомь (diabetes); о немоче держанін, о остановко и застов
mcuu.
S. I.
О непомьрномь течении мочн или діпветесь.
Кто наипаче оному подверженЪ?
членъ 1
Причины непомврнаго теченія мочні
минеральныя воды часто его причиняють 470:
AM vero?
ч. л Е н ъ. п.
Признаки непомврнаго теченія мочи.
Признаки представляемые мочею; больным в.
Признаки предшествующие.
Когда и въ комъ сія бользнь можеть приключиться?
Ч. Л. Е. Н. Ъ. III.
Пище употребление и содержание, каковое надобно предписывать.
тьмь, кон страждуть непомьрнымь теченіемь мочне
Питье;
Яства.
Устерсы.
Бристольская вода.
Известновая вода съ дубовою норкою.
Бълой деноить съ рыбымъ илеемъ.
Умъренисе шълодвижение.
Постеля больнаго должна быть, жесткая.
Воздухъ сухой и теплой.
Щешки для кожи.
Фланель.
Крвпительной пластырь ив снинв.
Опо

	Страна
\$ 5.	
О остановат монп.	4.7
Раздъление остановни мочи.	4.6
	-
членъ 1.	
Признаки остановки и задержки мочи.	478
Признани почечной искуріи или остановии м.чи.	
- харантеристические.	-
пузырной искурія или задержин мочи.	-
- харантеристическіе.	
- коими различествують сін двь бользин.	
YAEHB II.	
Причины остановки и эадержки мочи.	479
членъ III.	
Пользование остановки и задержки мочи.	
Когда сін причины суть воспалительныя ?	480
Кровопускание; польза от снаго въ сихъ случаяхъ.	No.
Піявяцы въ заднему проходу.	
Мягчишельныя принарки.	- 48I
Мягчительныя растенія, принладываемыя ив подбрюшію.	
Теплыл полубани.	_
Пользованіе, когда задержна мочи произошла стъ долговременна	0.0
держанія въ себь мочи, или ошь излишняго любострастія с	Ъ
женщинами	-
Опъ истерическихъ и ипохондрическихъ припадковъ.	
Причины, к и вывсто магчительных требують поощрятель	482
ныхъ, спириныхъ мазей, нарывныхъ мечегонишельныхъ.	482
Причины, кои пребующь контрексевильских водь.	
Пользование задержки мочи произшедшей отв беременности.	
От скипъвшейся матеріи въ калоиззергательной кишив.	485
Kamemepb.	_
Свъчка.	-
YAEHB IV.	
Общіх средствя, кон надобно употреблять протнев оста	HOB km
и задержки мони, какая бы оных принина ни была.	_
Легија чистительныя; мягчительныя промыванія.	_
Яства и питье.	
членъ у.	
Средства предохранять себя ств отновки и задерж	kn
Moun.	484
Яства легиія, питіе мокрожожидишельное.	-
	TAA-

	ubsn.
ГЛАВА 24.	
0 пескв, хрящь и камив.	484
Что такое есть песонъ ?	485
\$ I.	
Причины песка и камия:	-
Кто наипаче сей бользии подвержень?	-
6 2.	
Приэнаки песка и камил.	6 1962
Особенные признани пеена.	-
Особенные признаки камия.	486
Харантеристической признанЪ.	
Одинъ только натетеръ можетъ увърить о существовани камия. Искусство потребное въ опускани натетера въ пузырь.	
менусство потреоное вы опускани катепера вы пузырь.	7
\$ 3.	
The succession for the the transfer of the same wet will be	F-
Пнщеупотребление, коему должны послёдовать имъющие у песокъ и камень.	
A - CONTRACTOR OF THE CONTRACT	487
яства, от в коих воздерживаться, и кои должно употреб-	
лашь.	
Пишье.	
Умъренное пълодвижение	
причинъ, что она была у ихъ опацовъ и матерей.	
Сему содержанію надобно быть не очень слабительному.	
AAR vero?	488
мочь надобно шечи обильно; но и живошу не слинномъ быш	
запершу.	-
Средства на сіе.	_
Какъ надобно пользовать больнаго въ приступъ песна?	489
Известновая вода, дълземая изъ ножуриновъ устерсовъ или рано-	4
винокЪ.	-
Контренсевильския воды.	-
Пользованіе, ногда камень составился въ пузыръ.	490
Треческое мыло и известновая вода.	
ПріємЪ,	-
Бонскія и Барежскія воды.	
Впоричизя и прешичная известиновая вода.	601
Жгучій алкали или щолокъ мыльниковъ.	
ВЪ накомъ пишъв его давашь? .	-
что разумъется чрезъ вторичную известновую воду?	
	ну-

	Cı	пран.
Нужда доходить до пріема известновой воды постепенно.		491
		492
Способъ составлять сей щолокъ.	-	-
Другія лънарства.	-	-
Пастарнакъ съ медомъ, деноитъ изъ нежженаго нофея съ нъсно.	иь-	
кими каплями спирта очищенной селитры.	-	-
Примечание о силахъ сего щолока.	-	_
Толоннянии.	-	493
Способь принимать сіе явкарство.	-	-
ПріемЪ.	-	-
что должно думать о упомянутых в вкарствахв?	-	-
Они не суть настоящія намнеразбивательныя.	-	-
Лвнарства надежнъйшія да и безопаснъйшія.		-
Свойство толокиянки.		494
Разбивательное собственнод виствующее Г. Перри.		-
Одинъ телько Аткарь можеть предписывать сін аткарства.		495
Операція намиевыр взыванія понын в остается единственны	мЪ	
средствомъ освободиться отъ наменной бользии.	rn er	-
Для чего она не всегда удается?	-	-
Средства предохранить себя от песка и камия.		4.9%

ля 2 81 946 Кингохранилище Куйбышевского прав

SMNFNHEOROPHUR SMNFNHEOROPHUR ANA







